



RS                      Li, Shih-chên  
180                      Kokuyaku honzo komoku  
C5L4519  
1929  
v.7

East Asia


PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---







頭註

國譯本草綱目

第七冊

春陽堂藏版



原著

明 李 時 珍

監修・校註

理學博士 白井光太郎

顧問

木村 博 昭

考定

理學博士 牧野富太郎

考定

理學博士 脇水鐵五郎

考定

岡田 信 利

考定

矢野 宗 幹

考定

木村 康 一

譯文

鈴木 眞 海





頭註國譯本草綱目 第七冊

目次

本草綱目穀部第二十二卷

穀部第二十二卷目錄

麻麥稻類

胡麻(油麻)	一
亞麻(壁澁胡麻)	二五
大麻(麻蕒)	二六
小麥	四一
大麥	五四
穞麥	五九

雀麥(燕麥).....六二

蕎麥.....六九

苦蕎麥.....七〇

稻(糯米).....八〇

粳.....八八

秈.....

# 本草綱目穀部第二十三卷

## 穀部第二十三卷目錄

稷粟類.....九一

稷.....九七

黍.....一〇四

蜀黍.....一〇六

玉蜀黍.....一〇八

粱.....

栗	一二四
稗	一二〇
稗	一二三
稗	一二五
狼尾草	一二六
東磨	一二八
菰米	一二九
蓬草子	一三三
茵草	一三四
薊草	一三六
薏苡仁	一四四
罌子粟 (御米、麗春花)	一四五
阿芙蓉	一五〇

## 本草綱目第二十四卷

穀部第二十四卷目錄

菽豆類

大豆	一五二
大豆黃卷	一六九
黃大豆	一七一
赤小豆	一七二
腐婢	一八一
綠豆	一八四
白豆	一九二
稽豆	一九四
豌豆	一九五
蠶豆	一九八
豇豆	二〇〇
藊豆	二〇二



刀豆 ..... 二〇七

黎豆（蠶豆） ..... 二〇七

# 本草綱目第二十五卷

穀部第二十五卷目錄 ..... 一

造釀類 ..... 二二三

大豆豉 ..... 二二三

豆黃 ..... 二二三

豆腐 ..... 二二三

陳廩米 ..... 二二三〇

飯 ..... 二二三〇

青精乾石饌飯 ..... 二二三五

粥 ..... 二二三〇

麴 ..... 二二三〇

饊 ..... 二二三〇

糴	二四三
寒具	二四三
蒸餅	二四五
女麴	二四八
黃蒸	二四八
麴	二五〇
神麴	二五四
紅麴	二五六
蘗米(麥芽、穀芽)	二五八
飴餠	二六二
醬	二六七
榆仁醬	二七〇
燕荳醬	二七一
醋	二七二

酒.....二九九

燒酒.....三〇三

葡萄酒.....三〇六

糟.....三〇九

米糲.....三一三

春杵頭細糠.....三一三

## 本草綱目菜部第二十六卷

菜部第二十六卷目錄.....一

### 葷辛類

韭.....三一五

山韭.....三二七

孝文韭

葱.....三三九

蒼葱.....三四四

胡葱	三四五
薤(薤子)	三四八
藜藿	
蒜	三五六
山蒜	三六三
蒟(大蒜)	三六五
五辛菜	三七九
藟藟(油菜)	三七九
菘(白菜)	三八五
芥	三九〇
白芥	三九七
蕪菁(蕪菁)	四〇一
萊菔(蘿蔔)	四一三
生薑	四二六




乾薑	四三八
天竺乾薑	
同蒿	四四六
邪蒿	四四七
胡荽	四四八
胡蘿蔔	四五四
水蘄(芹菜)	四五六
葶(旱芹)	四六〇
紫葶	四六二
馬薊	四六四
穠香(茴香)	四六六
蒔蘿	四七三
蜀胡爛 數低 池得勒 馬思答吉	
羅勒(蘭香)	四七五

白花菜	四七九
蔞菜	四八〇
草豉	四八二

本草綱目穀部

第二十二卷





## 本草綱目穀部目錄第二十二卷

李時珍曰く、太古の人民は穀物を營養にするといふことがなかつたから、動物を食ひ、その血を飲んでゐたのであるが、神農氏が出て、始めて植物を食餌しやくじすることを実験し、穀物なるものを區別して、一般人民に耕作、種植の方法を教へ、また植物食餌の實驗に依り藥物を區別して、一般人民の疾病しつびつ、横死を救はれ、軒轅氏が出て、更に食物に對しては適當なる煮熟こやく、調理の方法を教へ、藥物に對しては病源、病證に適應する方、劑を正確ならしめられた。それ以來、一般人民は始めて身體、生命を完全に營養する方法を得たのであつて、その後、周の時代の制度には、  
 (一)五穀、(二)六穀、(三)九穀などの名目があり、詩人の歌詠には、(四)八穀、百穀などの言葉があるほどで、穀物なるものの種類もまことに數多いことである。素問には『五穀を養となし、麻、麥、稷、黍、豆を以つて肝、心、脾、肺、腎に配す』とあり、夏の時代の職方氏の官は、九州それぞれの耕作地の穀物を區別し、地官はその土地の地味、氣候に因る種おくて、種むねの適否を明にして、種蒔き、取入れ、植付け、刈立ての

(一)五穀ハ周禮ノ註ニ麻、黍、稷、麥、豆ナリトアリ。  
 (二)六穀ハ周禮ノ註ニ黍、黍、稷、粱、麥、彫胡ナリトアリ。  
 (三)九穀ハ黍、稷、粱、麥、小麥、大麥、小菽、麻ナリトアリ。

(四) 八穀ハ九穀ヨリ  
麻ヲ除キタルモノヲ  
云フ。

(五) 五方ハ東、西、  
南、北、中央。

(六) 九州、禹貢ニハ  
冀、兗、青、徐、揚、荆、  
豫、梁、雍トス。周制  
ニハ幽州、并州ヲ置  
キ、徐、梁ヲ削ル。

適法を教へたといふ。いづれも人民の天とする食糧問題を甚だ重大視されたわけである。(金) 五方には氣に差があり、(さ) 九州には生産に差があり、百穀それぞれにその性を異にするのであるが、吾人は常にこれをつて居るのである。その物の有する氣味、その氣味に因つて人體に受くる損益、それ等に關し十分な智識を缺くことは然るべきことであるまいと思ふ。ここに草の實の食料に供し得べきものを集めて穀部とし、凡て七十三種を、麻麥稻類、稷粟類、菽豆類、造釀類の四類に分けて記述した。舊本の米穀部は三品共に五十九種であるが、今ここには、九種を併入し、一種を菜部に移し入れ、草部より一種を此の部に移し入れた。

神農本草經七種 梁の陶弘景註。

名醫別錄十九種 陶弘景註。

唐本草二種 唐の蘇恭。

藥性本草一種 唐の甄權。

本草拾遺十一種 唐の陳藏器。

海藥本草一種 唐の李珣。

食療本草三種 唐の孟詵。

開寶本草二種 宋の馬志。

嘉祐本草三種 宋の掌禹錫。

圖經本草二種 宋の蘇頌。

日用本草一種 元の吳瑞。

本草補遺一種 元の朱震亨。

救荒本草一種 周憲王。

食鑑本草一種 明の壽原。

食物本草三種 明の汪頴。

本草綱目十五種 明の李時珍。

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁

蕭炳四聲

孫思邈千金

南唐陳士良食性

蜀韓保昇重註

宋寇宗奭衍義

金張元素珍珠囊

元李杲法象

王好古湯液

明王綸集要

汪機會編

陳嘉謨蒙筌

穀の一 麻麥稻類十二種

胡麻 本經 即ち油麻。

亞麻 圖經 即ち壁虱胡麻。

大麻 本經 即ち麻糞。

小麥 別錄

大麥 別錄

穞麥 別錄

雀麥 唐本 即ち燕麥。

蕎麥 嘉祐

苦蕎麥 綱目

稻 別錄 即ち糯米。

粳 別錄

秬 綱目

右附方 舊七十三、新百六十六。



穀の一 麻麥稻類十一種

胡麻 (本經上品)

和名 コウマ  
學名 Sesamum orientale, L.  
科名 セリ科(胡麻科)

校正

今ここには沈存中、寇宗奭の二説に據つて、本經の青裏、及び嘉祐に新に一條を立てた白油麻、胡麻油を併せ入れて一條に記載した。

(一) 牧野云フ、胡麻ハ熱帶地ノ原産デ、我邦デハ舊ネグ之ヲ栽培シ其種子ヲ食料ニ供シテキル、種子ノ白キチしろごまト云ヒ、其黒キチくろごまト云ヒ、又其黃色チ帯ビタモノチきんごま一名あぶらごまト稱ヘル第一、第二ノ品ハ普通デアリサ第三品ハ偶マニ見ラル。

釋名

巨勝(本經) 方莖(吳普) 狗虱(別錄) 油麻(食療) 脂麻(衍義) 俗

に芝麻シマと書くは誤である。葉を青裏と名ける。裏の音は箱(サウ)である。莖を麻マと名ける。麻の音は皆(カイ)である。また稽カイとも書く。時珍曰く、按ずるに、

沈存中の筆談に「胡麻とは今の油麻のことで、更に議論の餘地はない。古代に中國にあつたのはただ大麻だけで、その實を糞フンといつたのである。漢の時西域に使した張騫が始めて大宛タワンから油麻の種を持つて來た。それで胡麻と名けて中國の大麻と

(二) 大宛トハ古ノ國

名、今ノ嶺南中央亞細亞ノブルハノ州ノ地ナリ。

(三) 方勝トハ兩斜方形ノ互ニ相聯合スルモノヲ云フ。

(四) 大業ハ煬帝ノ年號、四年ハ西曆六〇八年。

(五) 上黨ハ石部長石ノ註ヲ見ヨ。

(六) 中原トハ邊境、及ビ蠻夷ノ地ニ對シテ中國ヲ指スノ語ナリ。今ノ河南、及ビ山東ノ西部、河北、山西ノ南部、陝西ノ東部ヲ古ニ中原ト稱ス。

區別したのである」とある。寇宗奭の衍義もやはり此の説に據つて胡麻に註釋してあるから、ここには油麻を此の一條中に併入した。巨勝とは胡麻の角が巨大で、方勝のやうなものをいふので、別に一種のものがあるのではない。方莖とは莖に就いて名けたもの、狗鱗とは形に就いて名けたものである。油麻、脂麻は脂油が多いといふ意味を表したものだ。張揖の廣雅に、胡麻一名藤弘とあるが、弘といふもやはり巨なるの意味である。別錄に、一名鴻藏とあるは藤弘の誤だ。又、杜寶の拾遺記には「隋の(四)大業四年に胡麻を交麻と呼ぶことに改めた」とある。

### 集解

別錄に曰く、胡麻は一名を巨勝といひ、(五)上黨の川澤に生ずる。秋季に採收する。青囊は巨勝の苗であつて、(六)中原の川谷に生ずる。

弘景曰く、胡麻は八穀の中に於て特に優良なもので、純黒のものを巨勝と名ける。

巨とは大なるの意味だ。もと大宛に生じたものだから胡麻と名ける。又、莖の四角なるを巨勝といひ、圓さを胡麻といふ。

恭曰く、角の八稜になつたものを巨勝といひ、四稜のものを胡麻といふ。すべて色の黒いものが良く、白いものは劣る。



○説曰く、肥沃ひさくの地に種うゑたものは八稜、山の畑に種うゑたものは四稜になる。その土地の關係でその差異を生ずるのだが、功力の點では同じである。

敦曰く、巨勝は、七稜あつて色が赤く、味の酸すく澀いものが眞物である。八稜のもの、兩頭の尖つたもの、色の紫黒なものや烏油麻をみな胡麻と呼ぶは誤だ。

頌曰く、胡麻は處處に種うゑてあるが、稀には野生のものもある。苗梗は麻のやうで葉が圓く鋭く光澤があり、嫩やわらかい時は蔬さにして食へる。道家で多くこれを食べふ。本



胡麻  
一脂

經には、胡麻一名の巨勝といふと脂あり、陶弘景は、莖の方圓で區別し、蘇恭は、角の稜の多少で區別してあり、仙方には、胡麻と巨勝

と服餌ふくじの方法に二様あつて、功用を少し別にしてあるところから、皆これを二種のものとして居るのである。しかしまた、當今の油麻はもと胡中に生じたもので、形體が麻に類するものだから油麻と名けたのだ。八穀のうちで特に最も勝すぐれたものだから巨勝と名けたのであつて、一種の物に對する二様の名稱だともいふ。かかる次

(七) 白井曰ク、此文  
 黃麻ノ花實ヲ説クニ  
 似タリト雖モ、此處  
 黃麻ヲ説ク必要ナク  
 且黃麻ノ果實ハ胡麻  
 ニ似ズ甚ダ疑フ可  
 シ。

第であつて見れば、これは一物に二種あるのでてんぐ天雄、ぶし附子などの類のやうなものである。故に、葛洪が『胡麻のうちの一片に兩尖あるものが巨勝である』といひ、別錄の序例に『細麻、即ち胡麻である。形の扁扁たるものだ。その莖の四角なものを巨勝と名ける』とあるがその事である。今一般に用ゐてゐる胡麻は、葉はじん在のやうで狭く尖り、莖の高さは四五尺、花は黄色で、房になつたせ胡麻角のやうで小さい子を生ずる。嫩いうちは食へる。甚だ甘く滑かなめで、大腸を利するものだ。皮はやはり大麻のやうに布に作れるが、色が黄で脆もろい。俗にこれを黃麻ともいふ。その實は色黒く、きうじ韭子のやうで粒が細かく、味は膽のやうに苦く、杵いて末にしても存外膏油がない。その説はまちまちだが、これが服食家の要藥だとするは何たる差誤であらう。果してそれで効果を期待きたいし得るであらうか。

宗奭そうしやく曰く、胡麻に就ては諸説まちまちで一定せぬが、要するにこれは今一般にある脂麻である。更に議論の餘地はない。種が大宛から來たといふところから胡麻と名けたのだ。現在胡地に産するものは皆肥大であつて、紋がじやく鵲のやう、色が紫黒で、油がやはり多く取れる。嘉祐本草の白油麻はこれと同一物だが、ただ色の點をいへ

ば、胡地の麻に比してやや淡く、全白でないだけである。今は一般に二者通じてこれを脂麻と呼ぶ。故に、二箇條の記載を見ると、主たる治療の功が大體同一なのである。川大黃、上黨人參といふやうなもので、特に適する土地に生じたところからその名稱が存するのだ。單に生産する土地の相違を以て、その物に二種の區別を置



〔時 珍〕

くべき道理があらうか。

時珍曰く、胡麻、即ち脂麻である。遅い種類と早い種類とあり、

黒、白、赤の三色の別はあるが、

その莖はいづれも四角で、秋白色の花を開く。また紫に艶のある花のものもある。節節に角を結び、その角の長いものは一寸ほどのものもある。四稜、六稜のものは房が小さいから子の數も少く、七稜、八稜のものは房が大きく、随つて子の數も多い。それはいづれも土地の肥、瘠から生ずる結果である。蘇恭は、四稜を胡麻とし、八稜を巨勝として、ただその房が勝れて巨大だとだけ説明してあるが、これは莖は高いものは三四尺で、ただ一本

の莖が上に伸びるものもありそれは角が纏まつつて子が少い。枝が四方に廣がるものもあり、それは角が多くて子が多い。これは皆苗がこゝで生えるとまばらに生えるに因る結果である。その葉にも、本が圓くて末の鋭いものがあり、本が圓くて末が三丫さんあに分れ、鴨の掌のやうな形のものもある。葛洪の説明に、一枚の葉に兩尖のあるものが巨勝だといふはこれを指したのだ。が、やはり烏麻にも白麻にも皆二種の葉のあることは知らなかつたやうだ。按ずるに本經には、胡麻、一名巨勝とあり、吳普の本草には、一名方莖とあり、抱朴子、及び五符經には、いづれも巨勝、一名胡麻とあつて、えの説は甚だ明あきらだ。しかるに、陶弘景に至つて、始めて莖の方、圓を區別し、雷斅はまた、赤麻が巨勝で、烏麻は胡麻でないと主張し、嘉祐本草にはまた、白油麻なる一條を掲げて胡麻と區別を立てた。いづれも、巨勝とは胡麻のうちの一葉があり、巨おほいさが勝まされ、子の肥えたものことだといふことを知らなかつたのだ。故に誤から誤に傳へて、かやうに疑の端を開くに至つたのである。ただ孟詵が、四稜、八稜は土地の肥、瘠の關係だといひ、寇宗奭が、沈存中の説に據つて、斷然脂麻を胡麻なりと主張したのは、以つて諸家の誤を證するに足りる。又、賈思

繩の齊民要術にある胡麻の栽培、收穫法は、現今の脂麻を栽培し收穫する方法そのままだ。これはその一物なることを證明する尤も有力な根據といへるのである。今では藥種商が、莖に方圓の區別があるなどの説に故事付けて、遂には莞蔚の子を偽つて巨勝といひ、黄麻子や大藜子を偽つて胡麻といつてゐる。誤も更に大なる誤だ。莞蔚子は長さ一分ばかりもあつて三稜があるものだ。黄麻子は黒く細韭子のやうで味が苦いものだ。大藜子は形狀が壁蝨や酸棗核仁のやうで味が辛く甘いものだ。いづれも脂油がない。餘程判別に注意する必要がある。梁の簡文帝の勸醫文には『世間には誤つて灰滌菜子を胡麻として居るものがある』と注意されてゐる。して見れば胡麻なるものに對する訛は、かなりに古くからあつたものと思はれる。

慎微曰く、俗間の言ひ傳へに『胡麻は夫婦で蒔くとよく繁茂する』といふ話があるので、本事詩に『胡麻は好種なれども人の種るなし、正に是れ歸る時君歸らず』とある。

### 胡麻 修治

弘景曰く、胡麻を服食するには、黑色のものを取り、九蒸九暴し、熬り搗いて餌ふものである。穀食を斷ち、長生し、飢を充たす。まことに手近なものだが、學者はそれさへ常服が出来ぬのだから、況や他の藥を服することは覺束



ないことだ。これは蒸して熟せぬものを食へば髪が落ちる。その性は茯苓と適合するものだ。俗方には用ゐることが甚だ稀で、時に湯、丸に合せる位のことである。

穀曰く、凡そこれを修治するには、水で淘つて浮くものを去り、晒し乾して酒を拌ぜ、午前十時から午後十時まで蒸して取出し、攤いて晒し乾して臼で舂き、粗皮を去つて薄皮を留め、小豆と對して拌せて共に炒り、豆が熟したとき豆を去つて用ゐる。

氣味 【甘し、平にして毒なし】 士良曰く、初めて食つたときは大、小腸

を利するが、久しく食へばそれが無くなり、新陳代謝を盛にする。○鏡源に曰く、

巨勝は丹砂を煮得る

主治

【傷中虛羸に五内を補し、氣力を益し、肌肉を長

じ、髓腦を填てる。久しく服すれば身を軽くし、老衰せぬ】(本經) 【筋骨を堅くし、

耳目を明にし、饑渴に耐へ、天年を延べる。金瘡に痛を止め、また傷寒、溫瘧の大

吐後の虛熱、羸困を療す】(別錄) 【中を補し、氣を益し、五臟を潤養し、肺氣を補し、

心驚を止め、大、小腸を利し、寒暑に耐へ、風濕氣、遊風、頭風を逐ひ、勞氣、産

後の羸困を治し、分婉を催し、胞衣を落す。細研して塗れば髪を長くし、白蜜で蒸

して餌へば百病を治す】(日華) 【炒つて食へば風病が起らぬ。風疾の人が久しく食へ

(ハ) 木村(廉)曰く、食用トシテハ本邦各地ニ栽培セラルレドモ、胡麻油ヲ製スル原料トシテハ多ク滿洲ヨリ輸入セラル。(成分) 種子ハ四五—五五%ノ脂肪油ヲ含有ス。胡麻油ノ脂肪酸組成(%)ハ油酸四八・一、リノール酸三六・八、パルミチン酸七・七、ステアリン酸四・六、アラジン酸・(四・四)リノセリン酸〇・〇四、尙食物化學、澤村

眞)ニヨレバ、白胡椒ハ養分總量ノ%ハ水分六・九三、粗蛋白質二〇・五四、粗脂肪五一・五七、可溶性無窒素物一二・六〇、灰分八・三六、黑胡椒ノハ水分六・六五、粗蛋白質一九・六五、粗脂肪四四・一五、可溶無窒素物一九・四三。  
(藥用)胡麻油ハ軟膏ノ基礎劑トシ「アムモニア」擦劑、樟腦軟膏、單軟膏等ヲ製ス、ソノ他食用油トシテ多量ニ消費セラル、又人造牛酪ヲ製造ス。(邦產藥用植物學)

ば歩行が正しくなり、言語が寒らぬ(李延壽)【生で嚼んで小兒の頭瘡に塗り、湯に煎じて惡瘡、婦人の陰瘡を浴すれば大いに效がある】(蘇恭)

### 白油麻(嘉祐) 氣味

「甘し、大寒にして毒なし」宗奭曰く、白脂麻は世間

一般に一日も缺くべからざるものとして用ゐられてゐるもので、一向に大寒といふやうな結果は現れて居らぬ。原曰く、生のものは性寒にして疾を治す。炒つたものは性熱にして病を發す。蒸したものは性溫にして人體を補す。○詵曰く、久しく食すれば人の肌肉を抽く。その汁は久しく置いたものを飲めば霍亂を起す。

### 主治

「虚勞を治し、腸、胃を滑し、風氣を行き、血脈を通じ、頭上の浮風を

去り、肌肉を潤す。食後に一合を生で噉ひ、終身輟めぬがよし。又、乳母に與へて服まざすれば孩子が永く病を起さぬ。客熱には飲汁に作つて服するがよし。生で嚼んで小兒の頭上の諸瘡に傳けるが良し」(孟詵)【仙方では蒸してこれを用ゐ、辟穀の法を行ふ】(蘇恭)

### 發明

甄權曰く、巨勝なるものは仙經に於いて重要なものとなつてゐる。白蜜と等分を合せて服するを靜神丸と名け、肺氣を治し、五臟を潤すにその功甚だ多



(九)大觀ニ骨ニ作ル。

い。また能く糧食を休止して生活するの資となり、人の<sup>元</sup>精髓を填て、男性に有益である。患者の甚しく虚して吸吸たるものにこれを加へて用ゐる。

時珍曰く、胡麻は、油を取るには白いものが勝り、服食には黒いものが良く、胡地  
のものが就中妙である。その黒なる色が入つて腎に通じて能く燥を潤す特長に依る  
のである。赤いものは形状が老<sup>ろう</sup>茄の子のやうで、殻が厚く、油は少く、ただ食料に  
なるだけで、服食の價値はない。しかし、ただ錢乙の小兒の痘瘡が黒く變じて腎に  
歸するを治する百祥丸だけに赤脂麻を用ゐ、煎湯にして送下するとある。これはや  
はりその解毒<sup>げどく</sup>の力を應用するだけである。五符經には、巨勝丸といふがあつて『即  
ち胡麻である。これはもと大宛に生じたもので、<sup>(一〇)</sup>五谷の長である。中絶すること  
なくこれを常服すれば、萬物を知り、神明に通じ、世と與<sup>とも</sup>に常に存し得るものだ』  
とある。參同契にも『巨勝は延年すべし、還丹にし口中に入る』とある。かく古代  
には胡麻を仙藥としたのであるが、近代では用ゐることが稀である。或はしかく神  
明に通ずると吹聴するほどに神驗のあるでもないからであらう。ただ久しく服す  
れば益があるものには相違ない。劉晨、阮肇<sup>げんてう</sup>の二人が天台に入つて仙女に遇つた

(一〇)五穀ハ五穀ト解  
シテ可サラン。

とき、胡麻飯といふを食はされた。やはり胡麻を米と共に飯に炊いたもので、仙家の食品だといふことである。又、按ずるに、蘇東坡が程正輔に與へた書に『凡そ痔疾には、酒肉と鹽酪えんらく、醬菜の厚味のもの、及び粳米飯を斷たねばならぬ。ただ淡麪一味、及び蒸した胡麻を食ふがよし。こは黑脂麻のことで、皮を去つた茯苓ぶせりやうと共に少量の白蜜を入れて麪にして食ふのだ。これを試ること久しきに互れば、氣力が衰へず、あらゆる病が自ら去り、痔も漸次に退く。この方法は長生の要訣であるが、ただ知り易くして行ひ難いだけだ』とある。この説に據れば、胡麻の脂麻なること動かすべからざるものだ。この方法に茯苓を用ゐたのは、陶氏が胡麻に註解した説に本づいたものである。近頃世間では、脂麻すずを搗り爛して滓を去り、綠豆粉を入れて豆腐にして食つてゐる。その性は平にして潤、最も老人に益がある。

#### 附方

舊十五、新十六。

#### 【胡麻の服食法】

抱朴子には『上黨の胡麻三斗を淘淨して飢で蒸し、氣を全部に廻らせて日光で乾し、水で淘つて沫を去り、再び前の如くして蒸す。かく九回繰返してから、湯けて皮を脱むき去つて簸ふるひ淨め、香しく炒つて末にし、白蜜、或は棗膏で彈子大の丸にし、一日三回づつ、一丸を溫酒に溶して服す。

毒魚、狗肉、生菜を忌む、百日まで繼續して服すれば、能く一切の痼疾を除き、一年にして身體、顔面が光澤になり、飢えず、二年にして白髪が黒に返り、三年にして齒の落ちたものが生え更り、四年にして水火も害すること能はず、五年にして奔馬にも追ひ付くやうになり、久しく服すれば長生する。若しこれの下さんとするには葵菜汁を飲む』とある。○孫真人は『胡麻三升を用ゐ、黄褐色のものを去つて三十回蒸し、微し炒つて香しくして末にし、白蜜三升を入れ三百杵搗いて梧子大の丸にし、毎早朝五十丸を服す。四十歳以上を過ぎた人でも、久しく服すれば目が明になつて物を洞視し、腸が柔かで筋のやうになる』といつてある。○仙方傳には『魯女生は胡麻を服し、朮を餌ひ、穀を絶つこと八十餘年にして甚だ少壯であつた。一日に三百里の道を行き、麋、鹿にも走り付くほどであつた』とある。【巨勝の服食方】五臓の虚損を治し、氣力を益し、筋骨を堅くする。巨勝を九蒸九暴して貯へ、二合づつを湯に浸し、布に裹んで皮を掇み去り、再び研つて水で濾し、その汁を煎じて飲み、粳米に和して粥に煮て食ふ。○時珍曰く、古は胡麻、巨勝の二様の服食法があつたが、その方は同一人の考案に出たものでないところから二法になつたの

（二）温、大觀ニ頓ニ  
作ル。

で、その實は一種の物を用ゐたのだ。【白髪を黒に返す】烏麻を九蒸九晒しやして研末し、棗膏さうかうで丸にして服す。（千金方）【腰脚の疼痛】新胡麻一升を香しく熬り、搗いて末にし、日毎に一小升を服す。一斗まで服すれば永く瘥える。温酒、蜜湯、姜汁きやうじのいづれで服してもよし。（千金方）【手脚の酸痛】微し腫れたるには、脂麻を熬つて研り、五升を酒一升到一夜浸して隨意に飲む。（外臺）【水に入つて四肢の腫れたもの】痛むには、生胡麻を搗ついて塗る。（千金）【偶然風寒を感じたるもの】脂麻を炒り焦し、熱に乗じて酒に搗すつて飲み、煖に臥して微し汗を取るがよし。【中暑毒死】救生散——新胡麻一升を微し炒つて黒くし、攤ひいて冷して末にし、新汲水で調へて三錢を服す。或は彈子大の丸にして水で服す。（經驗後方）【嘔おう吐たんの止まらぬもの】白油麻一大合を清油半斤で煎じて三合を取り、麻を去つて（二）温服する。（近效方）【牙齒の痛腫】胡麻五升、水一斗を汁五升到煮詰め、それで含漱がんそうして吐く。二劑に過ぎずして神效が現れる。（肘後）【熱淋莖痛】烏麻子、蔓菁子各五合を黃に炒り、緋袋ひたいに盛つて井華水三升到浸し、毎食前に一錢づつ服す。（聖惠方）【小兒の下痢】赤白を下すには、油麻一合を搗き、蜜湯に和して服す。（外臺）【胎毒を解し下す】初生兒に生脂麻を嚼

み綿に包んで嘔<sup>す</sup>はせる。その毒は自ら下る。【小兒の急瘡】油麻を嚼んで傳ける。

〔外瘻〕【小兒の軟癰<sup>なんきつ</sup>】油麻を炒り焦し、熱に乗じて嚼み爛<sup>らん</sup>らして傳ける。〔譚氏小兒方〕

【頭部、面部の諸瘡】脂麻を生で嚼んで傳ける。〔普濟〕【小兒の瘰癧<sup>れんぎ</sup>】脂麻、連翹<sup>れんぎょう</sup>等

分を末にして頻頻と食ふ。〔簡便方〕【疔腫惡瘡】胡麻を灰に焼き、針砂と等分を末に

し、一日三回、醋で和して傳ける。〔普濟方〕【痔瘡風腫】痛むには、胡麻子の煎湯で

洗へば消く。【二三<sup>ご</sup>坐板瘡<sup>はんどうが</sup>疥】生脂麻を嚼んで傳ける。〔筆峯雜興〕【陰痒で瘡の生じた

もの】胡麻を嚼み爛して傳るが良し。〔肘後〕【乳瘡腫痛】脂麻を炒り焦して研末し、

燈窩油<sup>とうくわあぶ</sup>で調へて塗れば安になる。【婦人の乳少きもの】脂麻を炒つて研り、鹽少量を

入れて食ふ。〔唐氏〕【湯火傷灼】胡麻を生で泥のやうに研つて塗る。〔外臺〕【蜘蛛の咬<sup>かう</sup>

瘡<sup>さう</sup>】油麻を研り爛して傳ける。〔經驗後方〕【諸蟲の咬傷】同上。【蜘蛛<sup>くさね</sup>の耳に入りたる

とき】胡麻を炒つて研り、袋に入れて枕にする。〔梅師〕【二三<sup>ご</sup>穀賊<sup>し</sup>尸咽<sup>しえん</sup>】喉中の痛痒

するものである。これは誤つて穀物の芒や檜刺<sup>くわいし</sup>を呑んだことに因するもので、その

爲めの痒痛である。谷賊は咽に屬<sup>ぞく</sup>き、尸咽は喉に屬くものだから、その區別を誤つて

はならぬ。脂麻を炒つて研り、白湯で調へて服す。〔三因方〕【癰瘡<sup>ようそう</sup>の合はぬもの】烏

二三此症夏日日曬ノ  
几癢ニヨリ、或ハ  
久坐陰濕ノ地ニヨリ  
テ、暑濕熱毒ニ感シ  
發スル臂腿間ノ疥疥  
ニシテ、形黍豆ノ如  
ク色紅ニシテ癢ク、  
甚シクレバ則チ熾痛  
シ、谷道ニ延及シ勢  
火燎ノ如キモノト云  
フ。  
二三證候下文ニア  
リ。



麻を黒く炒り、搗いて傳ける。(千金) 【小便尿血】胡麻三升を杵いて末にし、東流水二升到一夜浸して翌早朝汁を絞り、熱して頓服する。(千金方)

胡麻油即ち香油 弘景曰く、生で搾つたものが良し。蒸したものの、炒つたものは、

ただ食用にし、または燈火用に供するだけで、薬に入れては用ゐない。宗昉曰く、炒熟し熱に乗じて壓出した油を生油といふ、燈火に用ゐるだけのものだ。それを再び煎鍊したものが熟油であつて、始めて食料になるが、これは燈火用にはならない。まことに異なるものである。鐵なども火中から出したものを生鐵といふが、この油を生油といふも同じ意味である。時珍曰く、薬に入れるには烏麻油が上位にあり、白麻油はこれに次ぐ。自ら搾つて用ゐるが良し。商人の手に在るものは、已に蒸、炒を経たものであるばかりでなく、雜ぜ物もあれば偽物もある。

氣味 【甘し、微寒にして毒なし】

主治

【大腸、産婦の胞衣の落ちぬものを利す。生油を腫に摩る。禿髪を生ず

る】(別錄) 【頭部、面部の遊風を去る】(孫思邈) 【天行熱悶、腸内の結熱に主效がある。

一合を服し、通じのつくを度とする】(藏器) 【瘡癰に主效があり、(二)五黄を殺し、三

(二)五黄ハ五疸ニ同  
シ。黄汗、黄疸、穀  
疸、酒疸、女勞疸、  
是ナリ。

焦の熱毒氣を下し、大小腸を通じ、くわいしんろう 蛇心痛を治す。一切の惡瘡、疥癬に傳け、一切の蟲を殺す。一合に雞子二箇、芒硝ぼうせう一兩を和して攪かきませて服すれば、少時して熱毒を瀉下する。甚だ良いものである。【孟詵】陳油を煎じた膏は、肌を生じ、肉を長じ、痛を止め、癰腫を消し、皮裂を補す。【日華】癰疽、熱病を治す。【蘇頌】熱毒、食毒、蟲毒を解し、諸蟲、蠅ろう、蟻を殺す。【時珍】

### 燈臺殘油

#### 主治

【能く風痰、食毒を吐し、癰腫、熱毒に塗る。又、狂犬の咬傷を治するに、瘡口に灌そそぐが甚だ良し。】（時珍）

#### 發明

藏器曰く、大寒なもので、常に用ゐては冷疾を發し、精髓を滑し、臟腑の渴を發し、脾臟を困くるめ、人體を重くし、聲を損ぜしめる。士良曰く、牙齒の疾、及び脾、胃の疾のある人は絶対に食つてはならぬ。飲食物を調理するには、必ずその日毎に熬り熟して用ゐねばならぬ。一夜置いたものを用ゐるならば氣を動ずる。劉完素曰く、油は麻から取るのだが、麻は溫で油は寒だ。質は同じだが性が異ふのである。震亨曰く、香油なるものは、炒熟せうじやくした脂麻から取れば食つて美味であり、且つ疾を起さない。若しこれを甚しく煎煉するならば火と同様の作用を顯はす。



時珍曰く、張華の博物志に『百石に満つる大量の油を貯へれば自然に發火する』とあり、陳霆の墨談には『衣服や絹物に油のあるものを蒸熱すれば火の星が出る』とある。して見れば油と火とは性を同じうするのであつて、これを用ゐて食物を煎煉すれば、尤も能く火を動し、痰を生ずるものである。陳藏器はこの物を大寒なりといつてゐるが、余の考ではさうではない。ただ生で用ゐれば燥を潤し、毒を解し、痛を止め、腫を消する功力に、如何にも寒に似た點があるだけのことだ。且つ香油は能く蟲を殺すものだが、(二五)髮癥の患者は油を嗜む。油を煉れば能く自ら焚えるが、氣が盡れば反つて冷える。これは又、物の玄理である。

#### 附方

舊十、新二十六。

『髮癥で油を飲むもの』外臺に『髮癥の患者は油を飲み

(二五)髮癥ハ食物中ニ毛髮ヲ混ジタルモノ、胃ニ入り化シテ蟲トナリテ發スルモノト云フ。

(二六)香澤ハ香油ヲ指ス。

(二七)濃菜ハアチミドロヲ云フ。

たがるものだが、これには、酒一升に(二六)香澤を入れて煎じ、それを患者の枕邊に置いて、口、鼻からその氣を入れる。これを飲ませてはならない。すると疲れが極めて睡眠し、蟲が口から出て来るものである。その時急に石灰を手に粉し、その蟲を捉ひて抽き取る。取つて見るとそれは盡く髮であつて、初め出たときは流れぬ水の中に(二七)ある濃菜のやうな形だ』とある。○又、胸から喉の間を癥蟲が上下するやう

に覺え、常に葱、豉、香氣ある食物などの香を嗅ぎたがるものは髮癩の蟲である。これには、二日間絶食し、口を開いて横臥し、油で煎じて香しくした葱、豉をその口の邊に置くと蟲が出るものだ。それを物を以て引き抜き去れば必ず癒えるといふ。

【髮癩腰痛】南史に『宋の明帝のお局が腰が痛んで心に牽き、發作すると氣絶するのであつたが、徐文伯が診て、これは髮癩といふ病だ』といつた。油を灌ぐと髮のやうなものを吐いたので、それを引き出して見ると、長さ三尺あり、頭は已に蛇に成つてゐて動き出したが、それを高く懸けて液を滴し盡させて見ると、それはただ一本の髮であつた』と記載してある。【蠱毒を吐解す】清油を多く飲んで吐かす。(嶺南方)【河豚の毒を解す】その場合倉卒で藥のないときには、急に清麻油を多く灌いで毒物を吐出させれば癒える。(衛生易簡方)【砒石の毒を解す】麻油一碗を灌ぎ込む。(衛生方)【大風熱疾】近效方に『婆羅門僧が大風疾、竝に熱風で手足不遂のものを治し、丹石熱毒を壓するに、硝石一兩、生烏麻油二大升を共に鐺に入れ、土壑で口に蓋をして紙と泥で固濟し、細火でこれを煎じる。初めには氣が、鯉いが、藥が熟すれば香氣が發する。その時更に生脂麻油二大升を入れて和合して煎じ、注意して適度を

(二)土壑ハ未ダ燒カザル塼瓦。  
(三)鯉ハ腥ト通ズ。

二〇五心詳ナラズ、  
兩手足ノ心及頂心ノ  
五心歟。

量り、最も適當と信ずるとき、それを透滲せぬ器に貯へて置き、大風患者の場合に患者を紙帳の中に坐らせ、その紙壁の外で火を焼いて發汗させ、日毎に一大合を服ます。強壯の者には一日に二回服させる。かくて二十一日間繼續すると、頭部、面部の皰瘡は皆消滅する』とある。(圖經) 【傷寒發黃】生烏麻油一盞、水半盞、雞子白一箇を和し攪きませて全部を服す(外臺) 【小兒の發熱】その原因の風寒なると、飲食物なると、時行、痘疹なるとに拘らず、いづれもこれを用ゐるがよし。葱涎に香油を入れ、それに手の指を納れて油を醃け、その小兒の二〇五心、頭部、面部、項部、背部の諸處に摩擦する。最も能く毒を解し、肌を涼するものである。(直指) 【痘毒の豫防】外臺には『時行で、甚だ暖くして痘瘡を發する恐あるときは、生麻油一小盞に水一盞を少しづつ傾け入れながら、柳枝でよく攪きませて蜜のやうに混和させ、蜆殼で二三酌づつ——大人は二合——を就寢時に服す。三五服で大便が快く通じ、瘡は自から生じなくなる。これは扁鵲の油判法といふものだ』とある。○直指では、麻油、童尿各半盞を前記の方法の如くして服す。【小兒の初生】大小便の通ぜぬには、眞香油一兩、皮硝少量を共に煎じ滾らし、よく冷ましてから徐徐に口中に灌ぎ入れる。そ

(二) 飯久トハへ食頃、  
小半時間サドイフホ  
ドノ時間經過チイフ  
カ。

れを嚥下すれば通じがつく。(蘭氏經驗方) 【卒熱心痛】生麻油一合を服するが良し。(肘  
後方) 【鼻衄の止まぬもの】紙條に眞麻油を蘸けて鼻に入れ、嚏をすれば癒える。  
ある者が一夕盆に盈るほど衄血したが、この方を用ゐて效があつた。(普濟方) 【胎  
兒死亡】清油と蜜等分を湯に入れて頓服する。(普濟方) 【漏胎難産】血が乾き澀るに  
因るものである。清油半兩、好き蜜一兩を共に煎じ、數十沸して溫服する。胎が滿  
ちて分身する。他藥で效果なき場合には、この方を用うれば血を助けて效を擧げる。  
(胎産須知) 【産腸の收らぬもの】油五斤を煉熟して盆に盛り、その盆の中に婦人を坐  
らせて(二) 飯久し、先づ皂角を炙き皮を去り研末して少量を鼻に吹入れ、嚏をすれば  
立ちに産腸が收復する。(斗門) 【癰疽發背】初期にこれを服すれば毒氣をして内攻せ  
しめない。麻油一斤を銀器で煎じ、二十沸して醇醋二椀を和し、五回に分けて一日  
に全部を服す。(直指) 【腫毒の初期】麻油で葱を煎じて黒色にし、熱いまま手を休め  
ず圓を描くやうに廻して塗れば自ら消える。(百一選方) 【喉痺腫痛】生油一合を灌げ  
ば立ちに癒える。(總錄) 【丹石の毒發】發熱するものだから熱物を食つてはならぬ。  
火で暖を取つてもならぬ。ただ厚く衣類寢具を著て暖に臥し、油一匙を取つて含み

(二二) 竹子割リテ作り  
シ薪材。

嘸み、十四日間怒を愼む。<sup>つつし</sup>○枕中記には『丹石を服した人は、先づ麻油一升の中へ薤白<sup>かいびやく</sup>三升を切つて納れ、微火で黒く煎じて滓を去り、酒に合せて三合づつを服す。百日にして氣血が回復して旺盛になる』とある。【身體、面部の瘡疥】方は上に同じ。【梅花禿癬<sup>はいいんのかくれん</sup>】清油一椀を、(二二)小竹子に火をつけて燃えつつある中に入れて煎沸し、それに豬膽一箇の汁を瀝して和勻し、頭髮を剃つて擦り込む。二三日で癒える。日光に晒さぬやうにする(普濟方)【赤禿で髮の落ちたもの】香油、水等分を銀釵で攪き和して日毎に擦る。髮が生えたら止める。(普濟方)【髮が落ちて生えぬもの】生胡麻油を塗る。(普濟方)【髮を長く黒くする】生麻油で桑葉を煎じ、滓を去つて髮を沐する、數尺の長さになる。(普濟方)【耳に滴して聾を治す】生油を日毎に三五回づつ滴し、耳中の塞つたものが出るまで試れば癒える。(總錄)【蜘蛛の耳に入つたとき】劉禹錫の傳信方に『胡麻油で作つた煎餅を枕にして臥せば須臾にして自ら出る。李元淳尙書が河陽にゐた頃、蜘蛛が耳に入つて如何ともする方法がなく、腦悶<sup>なうもん</sup>し、聲が聞え、終には頭を門柱に撃ち付けるほどに苦んだ。その危困の狀態を朝廷に奏上したので、特に御醫を遣されて治療を加へたが、それでも效驗を舉



げなかつた。ところが偶然ある人がこの方を進め、それに依つて癒えた』とある。(圖經)【蜘蛛の咬毒】香油に鹽を和して摻る。(普濟方)【冬季の唇裂】香油を頻頻と抹する。(相感志)【身體、面部の白癬】酒で生胡麻油一合を服す。一日三服づつ五斗まで服すれば瘥える。百日間は生、冷の物、猪、雞、魚、蒜等を忌む。(千金)【小兒の丹毒】生麻油を塗る。(千金)【打撲傷腫】熟麻油に酒を和して飲み、火で焼いて地を熱し、その上に臥して眠り、覺めれば疼きと腫と共に消く。松陽の住民共は、殴り合をして後この方を用ゐるので、後に官憲がその身體を檢べても全く痕迹がない。(趙葵行營雜錄)【虎爪の傷瘡】先づ清油一盃を飲んでから、油を瘡口に淋して洗ふ。(趙原陽濟急方)【毒蜂の螫傷】清油を塗るが妙である。(同上)【毒蛇の螫傷】急に好き清油一二瓊を飲んで毒を解し、然る後に藥を用ゐる。(濟急良方)

麻枯餅 時珍曰く、これは油を搾り去つた麻滓のことである。また麻料とも名ける。——料の音は辛(シン)である——凶作の歳には一般人もこれを食ふ。魚を養ふ飼糧になり、田畑の肥料になる。周禮に『(三)草人は強堅にして糞を用う』とあるはやはりこの意味である。

(二三)草人ハ草ヲ戕  
ル職、土地ノ堅強ナ  
ル場所ヘハ麻糞ヲ肥  
料トスルト云フ意ナ  
リ。

附方

新二。

【牙に揩<sup>す</sup>つて鬚を黒くする】麻枯八兩、鹽花三兩を、生地黃十斤から取つた汁と共に鑊<sup>たべ</sup>に入れて熬り乾し、鐵で蓋をして鹽泥で塗り固め、赤く煨<sup>や</sup>いて取り出して研末し、それを日毎に三回づつ牙に揩り、揩り畢つてから薑茶を飲む。先づ眉から始まつて一箇月で皆黒くなる。(養老書) 【疽瘡の蟲あるもの】生麻油の滓を貼り、綿で裏んで置く。蟲が出るものである。(千金方)

(二四) 胡麻ノ苗葉ヲ云フ。

青蘘

蘘は音種<sup>(ジャウ)</sup>である。(本經上品) 恭曰く、草部より移<sup>うつ</sup>して此に附す。

釋名

【夢神、巨勝の苗である。中原の山谷に生ずる】(別錄)

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【五臟の邪氣、風寒濕痺。氣を益

し、腦髓を補し、筋骨を堅くする。久しく服すれば、耳目が聰明になり、饑<sup>う</sup>えず、老衰せず、壽命を増す】(本經) 【傷暑熱に主效がある】(思遠) 【湯にして頭を沐すれば、風を去り、髪を潤ほし、皮膚を滑にし、血色を益す】(日華) 【崩中血の凝注<sup>ぎやうちゆう</sup>するものを治するに、生で一升を擣き、熱湯で絞つた汁半升を服す。立ろに癒える】(甄權) 【風を祛<sup>さ</sup>り、毒を解し、腸を潤ほす。又、飛絲が咽候に入りたるを治するに、これを嚼めば癒える】(時珍)



## 發明

宗奭曰く、青蘘、即ち油麻葉である。湯に浸して良久すれば稠くして黄色の涎が出る。婦人はこれを用ゐて髪を梳くが、日華子の湯にして髪を沐するとある説に合致して居る。して見れば胡麻が脂麻であることは疑ない。弘景曰く、胡麻葉は甚だ肥え、滑かで頭を沐するによいものだが、これを服するといふは如何にするものか判らない。仙方にはいづれも用ゐない。これはやはり陰乾して丸、散にするものなのであらう。時珍曰く、按ずるに、服食家には、青蘘を栽培し菜にして食ふ方法といふがある。それは秋期に巨勝の子を取つて畦に蒔き、生菜を栽培する方法のやうにして苗の出るを候つて食ふのであつて、滑で美味なることは葵に劣らぬといふ。して見ると本草の記述もやはり茹蔬としての効果をいふので、丸、散の薬に入れることではないのである。

## 胡麻花

思邈曰く、七月に最上の梢端のものを採り、陰乾して用ゐる。藏器曰く、陰乾して漬けて汁を<sup>(二五)</sup>取り、麪を<sup>ひた</sup>漉して食ふ。至つて<sup>じんくわつ</sup>靱滑である。

## 主治

【禿髪を生ず】<sup>(思邈)</sup>【大腸を潤ほす。身體上に生じた肉丁には、これを擦れば癒える】<sup>(時珍)</sup>

(二五) 取ノ字、大觀ニ據リテ補フ。

(三六) 彌哆、詳ナラズ、  
哮ハ喘息ノ一名。

(二) 牧野云フ、本種  
ハ今廣ク世界ノ諸處  
ニ作ラレテキルガ、  
元來ハ蓋シ亞細亞ノ  
原産デアアラウトノ事  
デアル、支那ニハ尙  
Linum perenne, L.  
(シヨク、ハム、あま) ナ  
見ル處ガアルガ此レ  
ハ元來歐洲ノ原産品  
デアアル、植物名實圖  
考、卷ノ二ノ山西胡  
麻ハ蓋シ是レデアラ  
ウト思フ。  
(三) 兗州ハ水部井泉  
水ノ註ヲ見ヨ。  
(四) 威勝軍ハ宋ニ置

附方

新一。

【眉毛の生えぬもの】烏麻花を陰乾して末にし、烏麻油に漬けて

日毎に塗る。(外臺秘要)

麻稽 主治

附方

新二。

【灰に焼いて痣に點け、惡肉を去る方の中にに入れて用ゐる】(時珍)

【小兒の(三六) 鹽哮】 脂麻稽を瓦の内で焼いて性を存し、火毒を出

して研末し、淡豆腐に蘸けて食ふ。(摘玄方) 【聾耳の膿の出るもの】 白麻藹を刮り取

つて一合、花胭脂一枚を末にし、綿で裹んで耳中を塞ぐ。(聖濟總錄)

(二) 亞 麻 (宋圖經)

學名 あま、(わめい)ホ  
Linum usitatissimum, L.  
科名 あま科(亞麻科)

釋名

鵝麻(圖經) 壁虱胡麻(綱目)

集解

頌曰く、亞麻子は(三) 兗州、(三) 威勝軍に産する。苗、葉は共に青く、花



〔子麻亞〕

は白色である。八月上旬にその實を採つて用ゐる。時珍曰く、今は陝西地方でもこれを種ゑる。即ち壁虱胡

ク、今ノ山西省沁縣  
ソノ舊治ナリ。

麻である。その實はやはり油を搾つて點燈し得るものだが、氣が悪くて食料にはな  
らぬ。その莖、穂は頗る莞蔚じやうぶに似てゐるが、子は同物でない。

### 子 氣味

【甘し、微温にして毒なし】

### 主治

【大風、瘡癬】（蘇頌）

チン（一〇・八八％）、粘液（六〇）、脂肪油（三〇―四〇％）、分解ニヨリ青酸チ生ズル「リナマリン」等チ含有ス、粘液ハ「ベントザン」及ビ「ヘキソザン」ヨリナリ加水分解ニヨリ葡萄糖「カラクトーゼ」、「アラビノーゼ」、「キシローゼ」等チ生ズ。脂肪油ハ「イソリノレン」酸（三四％）「リノール」酸（二六％）、油酸（一八％）「リノレン」酸（一〇％）等ノ「グリセリド」ヨリ成ル。  
（藥用）亞麻仁ハ粘液チ含有スルチ以テ煎劑トシ、内用ニハ包攝藥トシ又灌腸料トス、又毳布トナシテ外用ニ供ス。種子チ壓搾シテ得タル亞麻仁油ハ軟膏ノ基礎劑トシ、又「カリ」石鹼「クレゾール」石鹼、亞麻仁油紙等ノ原料トス。  
（應用）亞麻仁油ハ乾性著シキナ以テ塗油、印刷インキ等ニ用キ、又「リノリウム」製造ニ缺ク可ラザルモノナリ、又本植物ノ纖維ハ「リンネル」原料タリ。

## 大 麻 （本經上品）

和名 あや  
學名 *Cannabis sativa, L.*  
科名 くは科（桑科）

### 釋名

大麻（日用） 黃麻 俗の名稱である。漢麻（爾雅翼） 雄を 臬麻（詩疏）

牡麻と名ける。（同上） 雌を 苴麻（同上） 苧麻と名ける。苧の音は字（ジ）である。花

を 麻蕒と名ける（本經） 麻勃 時珍曰く、麻の字は兩の朮おに従ひ戸の下おに在く、屋

下にて（三）麻を派する形を形容したもので、朮は音派（ハ）戸は音儼（ケン）である。その

（一）牧野云フ、大麻  
ハ中央亞細亞ノ原生  
ナレドモ今ハ諸方ニ  
廣ク栽培セラレテキ  
ル、主トシテ其皮ノ  
纖維チ用キ又其實チ  
食用トスル。

（二）麻ヲ派スルト  
ハ、纖維チ分派スル  
コトナラン。

(三) 木村(康)曰ク、大麻草ハ二家性ノ一年草ニシテ素ト真印度ノ産ニシテ、ソノ纖維(麻)ヲ利用スルノ目的ヲ以テ、現今諸國ニ栽培シ本邦マタ亦ト稱シ之ヲ培養ス、東印度ニ培養ス。大麻ハソノ植物學的ノ形狀ニ關シテハ、歐洲、本邦等ニ培植スルモノト特ニ差異ヲ見ザレドモ、ソノ雌性植物ハ夥シク樹脂ヲ分泌シ大ニ麻酔性ヲ有ス、印度大麻ノ麻酔性ヲ有ス。ハ印度及支那ニ於テハ太古ヨリ世ニ知ラレ、ソノ麻酔藥タル藥用ハ回教徒ニ始マレトイフ、而シテ製造ニ於テハ一六〇〇年始メテ之ヲ藥用

他は下記の註を見よ。漢麻と呼ぶわけは胡麻と區別したにある。

(三) 集 解

正 誤

本經に曰く、麻ま蕒ふん、一名麻勃ぼつは麻花の上のぼつ勃勃たるものである。七月七日に採るがよし。麻子は九月に採る。土に入つたものは人體を損ずる。太山の川谷に生ずる。



〔大〕 黄 麻  
— 麻 —

弘景曰く、麻蕒、即ち牡麻である。牡麻とは實が無いことで、今世間で布、及び履物を作るに用ゐるものである。

恭曰く、蕒とは麻の實のことで花のことではない。爾雅に『蕒は臬實しじつなり』と

あり、儀禮に『苴麻しよまの蕒あるもの』とあり、その註に『子のある麻を苴しよといふ』と

あつて、いづれも子を謂つて居る。陶氏は蕒を麻勃だといひ、勃勃然たるを花のやうなものと思つたと見え、更に重複して麻子の一條を掲げたのは誤である。既に蕒は米穀じやうはんの上品となつてゐるではないか。花が食料となるべきわけがあるまい。

藏器曰く、麻子は、早春に種ゑるを春麻子といひ、小さくして毒がある。晩春に種

ニ供セリ。日本藥局方ニイフ印度大麻草ハ、即チ印度大麻ノ葉及果本ヲ果實稔熟ノ時期ニ採集セルモノナリ。印度地方ニ於テはしし Hashish ト唱フルモノハ、印度大麻ヲ調和シテ製出セル喫烟料、嗜好品等ノ通稱ナリ。

(同) 勃勃ハ盛ナル貌。  
(五) 毛羅島トハ即チ毛利人ノ島ノ意カ。  
毛利人種ハ南洋ニユ一ジラランドノ土人ナリ。

(六) 上郡ハ秦ニ置ケ今ノ陝西省榆林道、及ビ内蒙古鄂爾多斯左翼ノ地ナリ。膚施ニ治ス。今ノ陝西省綏德縣ノ地ナリ。

ゑるを秋麻子といひ、藥に入れるに佳し。壓搾した油は物に塗る油として用ゐる。宗奭曰く、麻子は、海東の毛羅島から來るは大さ蓮實ほどで、最も勝れてゐる。それに次ぐは上郡、北地の産で大さ豆ほどある。南地のものは子が小さい。

頌曰く、麻子は處處で栽培する。その皮を續いで布を織り得るものだ。農家ではその子の黒い斑文のあるものを擇つて雌麻といふ。これを種ゑれば結ぶ子が多いのであるが、他の子ではさほどに多く結ばないのだ。本經の麻蕒と麻子との主效に關する記事は同一であり、また麻花は食料たり得るものでない點から考へると、蘇恭の論が至當のやうである。ところが本草の朱字で記載した部分には『麻蕒は味辛し、麻子は味甘し』とある。これでは二物の區別があるやうでもある。そこで本草と爾雅、禮記とではその稱呼が不同なのではなかつたかとも疑はれる。ところが、藥性論には、又『麻花を用ゐる。味苦し、諸風、月經不利に主效がある』と書いてある。此うして見ると、蕒といふもの、子といふもの、花といふもの、それぞれの三種に區別したものかも知れぬ。

時珍曰く、大麻、即ち今の大麻で、また黃麻ともいふ。處處で栽培してゐる。麻



を剥いて用ゐ、子を取收めて用ゐ、雌があり、雄があつて、雄を梟しといひ、雌を直そといふ。科が太く、油麻ほどあつて、葉は狭くして長く、その形狀は益母草やくもそうの葉のやうで、一本の枝に七枚、或は九枚の葉がある、五六月に細かい黄色の花が穂になり、順次に實を結ぶ。その實の大きさは胡荽子こすゐしほどで、油も取れれば、その皮を剥いて麻にも作る。その稽かひは白くて稜があり、輕虚なもので、燭の心に用ゐられる。齊民要術に『麻子は放勃した時に雄なるものを抜き去れ。また放勃せぬ先に抜いては子が成らなくなる。その子は黒くして重く、搗ついて修治し燭に用ゐ得ると』あるはこの物のことだ。本經に麻蕒、麻子の二條を掲げてあるが、蕒とは麻勃のことで、『麻子の土に入つたものは人を殺す』とある。蘇恭は、蕒は麻子のことだ。花ではないといひ、蘇頌は、蕒、子、花の三物だらうといひ、疑問の範圍を脱し切らなかつた。しかし謹んで按ずるに、吳普の本草に『麻勃、一名麻花、味辛し、毒なし。麻藍、一名麻蕒、一名青葛、味辛く甘し、毒あり。麻葉は毒あり、これを食へば人を殺す。麻子中の仁は毒なし、先に地中に藏したものを食へば人を殺す』とある。この説に據れば、麻勃は花のこと、麻蕒は實のこと、麻仁は實の中の仁のことだ。普は三國時代の人

〔全〕木村(唐)曰ク、

(成分)印度大麻草ノ  
臭氣ハ甚ダ少量ニ存  
セル揮發油ニ係ル、  
而シテ其麻痺性ノ起  
因スル成分ハ樹脂ト  
ス、坊間ニ「カンナビ  
ン」又ハ「ハージン」  
ト稱スルモノハ、催  
眠ノ效ナ有スル樹脂  
體ヨリ成レル混合物  
ニシテ、「カンナビリ  
ン」ハ又催眠ノ效力  
アル油狀體トス。又  
印度大麻草中ニハ  
「カンナビニン」ナル  
「アルカロイド」ヲ含  
有スルトイフモノア  
レドモ、確實ニ發見  
セラレタルハ「ムス

で、古を去ること遠からぬ時の人だ、その説は甚だ明快である 神農本草經の、花を以て糞となし、土に藏し土に入つたものを以て人を殺すとある記事には、その文章にいづれも傳寫の誤脱があつたのだ。陶氏、及び唐、宋の諸家が、いづれも考證、研究に徹底を缺いて、疑似の臆測のみを事としたのは疎漏なものだ。今ここには吳氏に依據して、改めて下記の如くに正して置く。

麻勃 善曰く、一名麻花。時珍曰く、齊民要術の放勃した時に雄なるものを抜き去れとある文を觀れば、勃とは花であることが明かである。

### 氣味

〔辛し、溫にして毒なし〕 甄權曰く、苦し、微熱にして毒なし。○

牡蠣を畏れる。 血を行らす藥に入れるには麤蟲じやうちうを使として用ゐる。

### 主治

〔二百二十種の惡風 黒色になつて全身が癢く苦しむもの。諸風、惡血を逐ひ、婦人の月經不通を治す〕〔藥性〕 〔健忘、及び金瘡内漏を治す〕〔時珍〕

### 發明

弘景曰く、麻勃は方藥には用ゐることが稀だが、術家では人參と合せて服し、未來のことを豫知する。時珍曰く、按ずるに、范汪の方に健忘を治する方があつて、七月七日に採取した麻勃一升、人參二兩を末にし、蒸して氣を全部に廻めぐ



カリシ、トトリゴネリン、及ビ「シヨリン」ナリ。大麻ニ關スル研究文獻甚ダ多ク五十餘種アリ。食物化學ニヨレバ麻實ノ養分總量ハ水分九・九八、粗蛋白質二一・一八、粗脂肪二四・五六、粗纖維二九・三三、可溶無窒物一二・九〇、灰分二・〇五。

(ハ)木村(庚)曰ク、(應用)内用ニハ鎮靜藥及ヒ催眠藥トシテ應用ス、〇・五―三・〇ヲ散劑或ハ丸劑トシテ與フ、外用ニハ熏烟劑及ビ卷烟草トシテ喘息等ニ吸引セシム、藥局法ノ製品ハ印度大麻丁癩、印度大麻越幾斯ナリ、尙ホ實チ大麻仁ト稱シテ緩和藥トシ、又乳劑ニ之ヲ附加シ

らせ、毎就寢時に一刀圭づつを服すれば、能く四方の事を盡く知るとある。これは健忘を治するので、服すれば能く四方の事を記憶するわけだ。陶氏の、未來の事まで豫知するは言ひ過ぎてある。又、外臺に『疔腫を生じた人は麻勃を見ることを忌む。見れば死亡するものである。その時は胡麻、針砂、燭燼を末にし、醋で和して傅ける』といつてある。麻勃が何故にかく疔と相忌むのか判らぬが、やはり漆を見れば瘡を生ずる者があるやうなもので、その理由は一向明瞭でない。

## 附方

舊一、新二。

【瘰癧の初期】七月七日に取つた麻花、五月五日に取つた艾葉等分を炷にして灸を百壯する。(外臺祕要)【金瘡内漏】麻勃一兩、蒲黃二兩を末にし、晝三回、夜一回、酒で一錢ヒづつ服す。(同上)【風病の麻木】麻花四兩、草烏一兩を炒つて性を存して末にし、煉蜜で調へて膏にし、三分づつ白湯で調へて服す。

麻蕒 善曰く、一名麻藍、一名青葛。時珍曰く、これは確かに殼のままの麻子といふのである。故に周禮に『朝事の簋に蕒を供すとあり、月令に、食麻と大麻とは食ふべく、蕒は供すべし』とあつてやや區別がある。それは殼には毒があるが仁には毒がないからである。

又食用トス、ソノ他  
ソノ纖維ヲ麻トシテ  
廣ク利用セラルル事  
ハ知ラルル如クナ  
リ。

(九) 五臟ヨリ寒氣ヲ  
利シ迄ノ一句ハ本經  
ノ文ニ屬ス。

(一〇) 久服以下モ本經  
ニ屬スル文ナリ。

(一一) 芽ヲ出サセト云  
フハ膨脹セシメテ、

肉子ヲ露出セシムル  
コトカ。

(一二) 大觀ニ三上ニ須  
字アリ。

# 「氣味」

「辛し、平にして毒あり」善曰く、神農は辛しいひ、雷公は甘しいひ、岐伯は毒ありといふ。○牡蠣、白微を畏る。

## 主治

「五勞、七傷、多く服

すれば人をして鬼を見て狂走せしめる」(本經) 説曰く、鬼を見やうとするときは、生麻子、菖蒲、鬼臼等分を杵いて彈子大の丸にし、毎朝日に向つて一丸づつ服し、滿百日に達すれば鬼を見る。『(五臟、下血、寒氣を利し、積を破り、痺を止め、膿を散ず。久しく服すれば神明に通じ、身體を軽くする)』(別錄)

# 附方

舊一。『風顛百病』

麻子四升を水六升を猛火で煮て(二)芽を出させ、滓を去つて二升に煎じつめ、空心に服す。或は發作し、或は發作せず、或は言葉が多くなつても怪しむに及ばぬ。ただ別の人にその手足を摩らせて置けば、少頃して鎮靜する。三劑まで服ませれば癒える。(千金)

# 麻仁 修治

宗奭曰く、麻仁は極めて殻を去り難いものだ。殻を去るには、

帛で包んで沸湯中に浸し、冷えてから取り出して井中に水に着かぬやうにして一夜間垂れて置き、翌日の日中に曝乾し、それを新瓦の上で揔んで殻を去り、簸ひ扇いで仁を取る。それで粒がみな完全に取れるものだ。張仲景の麻仁丸は、即ちこの大

麻子の中の仁である。

氣味

【甘し、平にして毒なし】説曰く、微寒なり、普曰く、先に地中に貯藏したものを食へば死亡する。士良曰く、多く食へば血脈を損じ、精氣を滑し、陽氣を痿す。婦人が多く食へば直ちに帶疾を發す。○牡蠣、白微、茯苓を畏る。

主治

【中を補し、氣を益す。久しく服すれば肥健にして老衰せず、神仙となる】（本經）【中風で汗の出るを治し、水氣を逐ひ、小便を利し、積血を破り、血脈を復す。乳婦、産後の餘疾。沐すれば髪を長くし潤ほす】（別錄）【氣を下し、風痺皮頑を去る。人をして心を歡ばしむるには、香しく炒つて尿に浸し、その絞汁を服す。婦人の倒産には、十四粒を吞めば胎兒の姿勢が正しくなる】（藏器）【五臓を潤ほし、大腸の風熱結燥、及び熱淋を利す】（士良）【虚勞を補し、一切の風氣を逐ひ、肌肉を長じ、毛髮を益し、乳汁を通じ、消渴を止め、難産に分娩を催す】（日華）【汁を取つて煮た粥は五臓の風を去り、肺を潤ほし、關節不通、髮落を治す】（孟詵）【婦人の經脈を利し、大腸下痢を調へる。諸瘡癰に塗れば蟲を殺す。この汁を取つて煮た粥を食へば嘔逆を止める】（時珍）

## 發明

弘景曰く、麻子中の仁は、丸藥に合せ、竝に酒を醸すに大いに善し、但し性は滑利である。劉完素曰く、麻は木穀であつて、風を治するは風と木と同氣相求むる結果である。好古曰く、麻仁は手の陽明、足の太陰の藥である。陽明の病は汗多く、胃熱し、便通困難になるもので、この三種の證候はいづれも燥だから、これを用ゐて通潤するのである。成無已曰く、脾は緩を欲する。急に甘を食つてこれを緩にする。麻仁の甘は脾を緩にし燥を潤ほす。

## 附方

舊二十、新十八。【服食法】麻子仁一升、白羊脂七兩、蜜臘五兩、白蜜一

合を和して杵き、蒸して食ふ。饑えず、老に耐へる。【食療】「耐老、益氣」久しく服すれば饑えず。麻子仁二升、大豆一升を香しく熬つて末にし、蜜で丸にして日毎に二回服す。【藥性論】「大麻仁酒」骨髓の風毒疼痛で運動不能なるを治す。大麻仁を水に浸し、沈むもの一升を取つて曝乾し、銀器に入れて廻しながら慢かに炒つて香しく熟し、木臼に入れて一萬杵搗き、白粉のやうに細になつた時止め、平均に十帖に別けて、その一帖を家釀の無灰酒と共に砂盆に入れ、柳梔で搗つて殼を瀝し去り、半減するまで煎じて空服に一帖を溫服する。病の輕いものは四五帖で效が現はれ、

甚しきものも十帖以内で必ず苦痛がなくなる。その效は言葉に盡せない（蘇中<sup>ちゅう</sup>方）  
【麻子仁粥】風水で腹大し、腰臍が重痛して轉動し得ぬには、冬麻子半斤を研り碎き、水で濾して汁を取り、粳米二合を入れて稀粥<sup>きしゆく</sup>に煮、葱、椒、鹽、豉を投じて空心に食ふ（食醫心鏡）  
【老人の風痺】麻子で前記の粥を煮て食ふ【五淋の澀痛】麻子で前記の粥を煮て食ふ（同上）  
【大便不通】麻子で前記の粥を煮て服す（肘後<sup>ちうご</sup>方）  
【麻子仁丸】脾約で大便が秘し、小便の頻數なるを治す。麻子仁二升、芍藥半斤、厚朴一尺、大黃、枳實各一斤、杏仁一升、これを熬つて研り、煉蜜で梧桐子大の丸にし、一日三回づつ漿水で十丸を服す。反應のないときは再加する（張仲景<sup>ちやうけい</sup>方）  
【産後の秘塞<sup>ひさく</sup>】許學士は『産後に汗多ければ大便が秘難になる。これに用うべき薬としては、ただ麻子粥だけが最も穩<sup>おだやか</sup>である。これはただ産後に服するによきのみならず、凡そ老人の諸虛風秘にはいづれも具合の好いものである。大麻子仁、紫蘇子各二合を洗淨して研細し、再び水で研つて汁一盞を濾し取り、二回に分けて粥を煮て啖<sup>すす</sup>る』といつてある（本事方）  
【産後の瘀血<sup>あけつ</sup>】下り盡きぬには、麻子仁五升を酒一升到一夜間漬け、翌早朝滓を去つて一升を溫服する。瘥えぬときは一升を再服する。吐きも下し



〔三〕大觀ニニチニ  
作ル。

〔四〕大觀ニ仁下ニ三  
兩ノ二字アリ。  
〔五〕大觀ニ常ヲ皆ニ  
作ル。

〔六〕大觀ニ大便數少  
トアリ。

もせぬものだ。これを服したならば一箇月間は男子と同衾してはならぬ。初の通りに攝養する（千金方）【胎兒死亡の爲めの腹痛】冬麻子一升を杵き碎いて香しく熬り、水二升で煮てその汁を分服する（心鏡）【妊娠心痛】煩悶するには、麻子仁一合を水〔三〕二盞に研り、六分に煎じ滓を去つて服す（聖惠）【月經不通】或は兩三箇月、或は半年、或は一年に達するものには、麻子仁二升、桃仁二兩を研勻し、熟酒一升に一夜間浸し、一日に一升を服す（普濟）【嘔逆の止まぬもの】麻仁〔二〕を杵き熬つて水で研つて汁を取り、少量の鹽を添へて喫すれば立ろに效がある。李諫議は〔二〕常に用ゐて極めて效を擧げた（外臺）【虚勞内熱】下焦が虚熱し、骨節が煩疼し、肌肉が急し、小便が利せず、大便が〔六〕頻數となり、少氣で吸吸となり、口が燥き、熱淋するには、大麻仁五合を研り、水二升で煮て半分に煮詰め、四五劑を服すれば瘥える（外臺）【下を補し、渴を治す】麻子仁一升、水三升を煮て四五沸し、滓を去つて一日二回づつ半升を冷服する（藥性論）【消渴飲水】やがて一日に數斗の水を飲むやうになり、小便の赤澀するには、秋麻子仁一升、水三升を煮て三四沸して汁を飲む。五升到過ぎずして瘥える（肘後方）【乳石發渴】大麻仁三合、水三升を二升到煎じて



（七）大觀ニ藥上ニ蜜字アリ。

時時に呷ふ（外臺）『飲酒咽爛』口舌に瘡を生ずるには、大麻仁一升、黃芩二兩を末にし、蜜で丸にして含む（千金方）『脚氣腫渴』大麻仁を香しく熬り、水で研つて一升を取り、再び水三升を入れて一升到煮詰め、赤小豆一升を入れて煮熟し、豆を食ひ汁を飲む（外臺祕要）『脚氣腹痛』大麻仁一升を研り碎き、酒三升到三晝夜間漬けて溫服するが大いに良し（外臺）『血痢の止まぬもの』必效方には、麻子仁汁で綠豆を煮て空心に食ふが極めて有效だとある（外臺）『小兒の痢下』赤白を下して身體の衰弱甚しきには、麻子仁三合を香しく炒り、研つて細末にし、一錢づつを（七）漿水で服すれば立ろに效がある（子母祕錄）『腸が截れる怪病』大腸の端が一寸餘ほど出て痛み苦み、乾けば自ら落ちて又出るものを截腸病と名ける。それで腸が盡されば不治である。ただ初めて截れたことを自覺したとき、器に脂麻油を入れてそれに坐りて浸し、大麻子汁數升を飲めば癒える（夏子益奇方）『金瘡の瘀血』腹中に在るには、大麻仁三升、葱白十四本を搗き熟し、水九升で一升半に煮詰めて頓服する。血が出盡きぬときは再服する（千金）『腹中の蟲病』大麻子仁三升、東に伸びた萊菔根八升を水に漬け、早朝二升を服す。その夜に至つて蟲が下る（食療）『小兒の疳瘡』

（ハ）諸ノ字ノ音ハ除  
（ジヨ）ニシテ徐ニ同  
ジト集韻ニアリ。此  
ノ文字ハ瀦ノ字ノ誤  
用ニ非ザルカ。麻汁  
ヲヨドマシタルモノ  
ノ意ナラン。

一日六七回づつ麻子を嚼かんで傳ける。（秘錄）【小兒の頭瘡】麻子五升を細かに水に研り、その汁を絞つて蜜を和して傳ける。（千金）【白禿無髮】麻子を炒り焦して研末し、豬脂ちゆうしに和して塗る。髮の生えるまでを度とする。（普濟方）【髮が落ちて生えぬもの】黃麻子汁ふんまじじふで粥を煮て頻に食ふ（聖濟總錄）【聾耳ていじの膿の出るもの】麻子一合、花胭脂くわえんし一分を研りませ、挺子にして綿で裹んで塞ぐ。（聖惠方）【大風癩疾】大麻仁三升を淘つて晒し、酒一斗で一夜浸して研り、白汁を取つて濾して瓶に入れ、重湯で數沸煮て取り收め、その汁一小盞かで茄根散かこんさん、乳香丸を兼ね服して效を取る。（聖惠方）【毒箭に射られたもの】麻仁數汁の杵汁しゆじふを飲む。（肘後）【射罔しやうまうの毒を解す】大麻子汁を飲むがよし。（千金）【溫疫の辟禳ひじやう】麻子仁、赤小豆各十四粒を十二月末日の夜に井中に置き、その水を飲むが良し。（龍魚河圖）【赤遊丹毒】麻仁を搗いて末にし、水に和して傳ける。（千金方）【濕癬肥瘡】大麻ハ、瀦ハを傳ければ五日で瘥える。（千金方）【療疽出汁へうそしゆつじふ】手足、肩背に生じ、癰膿ようのうとして赤豆のやうな狀態となりたるには、剝むき淨きよめた上へ大麻子を炒り研末して摩る。（千金方）

## 油 主治

【黒く熬り、油を搾つて頭に傳ければ髮の落ちて生えぬを治す。煎

〔九〕戸咽、病源ニ云、  
腹内ノ戸蟲上ツテ人  
ノ喉咽ヲ食テ瘡ヲ生  
ズ、其狀或ハ痒ク或  
ハ痛ミ甘蠶ノ候ノ如  
シト。

〔二〇〕四時ノ瘡瘻ニヨ  
ツテ、顔面耳項ノハ  
ルル證ナリ。

〔二〕攝字、未詳。

熟して時時に吸すれば硫黃毒發の身熱を治す〔時珍〕○千金方、外臺祕要に記載がある。

### 附方

新一。〔二〕ちし戸咽痛痒えんつやう〕麻子を燒脂して服す〔總錄〕

### 葉氣味

【辛し、毒あり】

### 主治

【搗汁五合を服すれば虻蟲くわいちゆうを下す。搗

爛らんして蝸毒に傳ける。俱に效がある】〔蘇恭〕【湯に浸して髪を沐すれば長く潤ひ、白髪が生えなくなる】甄權曰く、葉一握と子五升を共に搗き和して三日浸し、滓を去つて髪を沐す。

### 發明

時珍曰く、按ずるに、郭文の瘡科心要に『烏金散——癰疽ようそ、疔腫ちゆうしゆ、〔二〇〕時毒、惡瘡を治す——の方の中に、火麻頭を麻黃諸藥と共に用ゐて汗を發す』とある。葉は毒があつて毒を攻めるのだといふことが判る。普濟方には『これを用ゐて瘡ざやくを截る。尤も推奨すべきものだ』とある。

### 附方

新二。

【瘡の止まぬを治す】火麻葉を生と枯たるとを間はず鍋に入れ、

文武火で慢やうやかに炒つて香くし、〔二〕攝起して紙で蓋ひ、汗を出盡さして末にし、發作の直前に茶或は酒で服ませ、その患者を原眠もろねつた床に臥させる。さながら酔ふたものの如くなり、醒めればそれで癒えてゐる ○またある方では、火麻葉を前記

の方法のやうにして末にし、一兩に縮砂、丁香、陳皮ちんぴ赤各半兩を加へ、酒糊で梧子大の丸にし、五七丸づつを酒、茶の任意のもので服す。諸瘡を治し、元氣を壯にする。(普濟方)

黃麻(二二)

【主治】血を破り、小便を通ずる。(時珍)

【附方】

新二。

【熱淋脹痛】麻皮一兩、炙甘草三分を水二盞で一盞に煎じ、一日

二回づつ服して效を取る。(聖惠方) 【跌撲折傷】疼痛するものに對する接骨方は、黃

麻の燒灰、頭髮灰各一兩、乳香五錢を末にし、三錢づつを溫酒で服す。立るに效がある。(王仲勉經驗方)

麻根

【主治】

【搗汁、或は煮汁を服すれば、瘀血、石淋に主效がある】(陶弘景)

【産難で胞衣の出ぬもの、破血、壅脹、帶下、崩中の止まぬものを治するに、水で煮て服するが效がある】(蘇恭) 【熱淋で下血の止まぬを治するに、二十七箇を取つて洗淨し、水五升で三升に煮詰めて分服する。血が止まること神驗がある】(藥性) 【根、及び葉の搗汁を服すれば、毆打の瘀血で心腹が滿し、呼吸短きもの、及び腕折骨痛の忍び難きものを治し、いづれも效がある。この物がないときは麻の煮汁を代用す

(二二)麻ノ下ニ皮字ヲ加フベシ。

る【蘇頌】○韋宙の獨行方に記載がある。

### 漚麻汁

【主治】

【消渴を止め、瘀血を治す】【蘇恭】

### 小

### 麥

（別錄中品）

和名 こむぎ  
學名 Triticum aestivum, L.  
科名 禾本科

### 校正

拾遺の麥苗を此の條に併せ歸す。

### 釋名

### 來

時珍曰く、來は稜とも書く。

許氏の説文に『天瑞麥を降す、一

來二麤芒刺の形に象る。

天の所來なり』とある。

足で歩行して來たやうなといふので、麥の字を來に従ひ久に従ふ

（二）鈴木曰く、李氏

ノ引ク所説文ニ合ハズ、説文ニハ、周所

受瑞麥來麤也。二麥

一條、象其芒束之形。

天所來也。故爲行來

之來。詩曰。詒我來

麤。トアリ。



【麥】小

て書くのである。久は音緩（スギ）足の歩行する形である。詩に『我に來牟を貽る』とあるがこれである。また『來はその實の形

容、久はその根の形容だ』ともいふ。梵書には麥を名けて迦師錯といふ。



(二) 木村(康)曰ク、

小麥ハ子粒ヨリ小麥澱粉、麩、小麥油ヲ製シ又之ヲ粉末即チ小麥粉トナシ、麵麩、麩、素麩、饅頭、菓子類等ヲ製シ、又子粒ハ醬油、味噌(素)ケルイタミン酸モノナトリウム)等ヲ製スル原料ノ一トス、而シテ小麥莖モ大麥莖ト共 麥莖トシテ、大小工業用トシテ要用ナリ。

(三) 木村(康)曰ク、(成分) 莖ニハ「ベントザン」(内)キシラン「一六%」(二)シニ二四%ヲ含ミ、灰分中(三)一七%の甲、六〇一七〇%ヲ占メ、他ニ  $\text{K}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{Na}_2\text{O}$ 、 $\text{P}_2\text{O}_5$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$  等ヲ含ム。穀粒ニ

### (三) 集 解

頌曰く、大、小麥は、秋種<sup>〇</sup>ゑて冬長じ、春秀<sup>〇</sup>でて夏實<sup>〇</sup>る。四時中和の氣を具ふるものだ。故に五穀中の貴重なものとなつてゐるのである。氣候の暖い土地では、やはり春種<sup>〇</sup>ゑて夏になつて收穫することも可能であるが、しかし秋種<sup>〇</sup>ゑたものに比すれば四氣が不足なので毒がある。

時珍曰く、北方地方では、麥の種を蒔くに一面に散らして撒く、南方地方では撮んで撒く。北方の麥は皮が薄く麩が多いが、南方の麥はその反對だ。或は、麥を貯藏するに蠶沙を和すれば蠹を辟けるともいひ、或は、立秋前に蒼耳を剉み碎いて共に晒して貯藏しても蛙が付かぬ。しかし秋後になれば已に蟲が生えて了ふといふ。蓋し麥の性は濕を惡む。故に久雨があつて潦水に浸れば多くは熟さなくなる。

### 小 麥

#### (四) 氣 味

『甘し、微寒にして、毒なし』少陰、太陽の經に入る。甄權曰く、平にして小毒あり。恭曰く、小麥で湯を作るには皮が裂けるやうにしてはならぬ。裂ければ性が溫になつて消熱、止煩の功力がなくなる。藏器曰く、小麥は秋種<sup>〇</sup>ゑて夏熟するので、四時の氣を完全に受けて寒、熱、溫、涼を兼ね有する。故に麥は涼、麩は溫、麩は冷、麩は熱であつて、は當然の現はれである。河、渭以西の



ハ水分一三・四％、含窒素物一、脂肪一・六五、無窒素抽出物七〇、粗纖維二・一、灰分一・九二ニシテ澱粉最も多ク五三一七〇％（乾燥物質中五八・七六）及糖二一七・デキストリン二一〇、其他「アスブラギン」ハ之ヲ缺ケドモ少量ノ「アルギニン」ヲ有ス。糖ハ蔗糖、デキストローゼ、ラフィノーゼ等ナリ。澱粉ハ即チ小麥澱粉稱スルモノニシテ「アミロペクチン」六七・五％、「アミロロゼ」三二・五％ヨリナル、又穀粒ノ凡ソ一・四三％ヲ占ムルトイハルル芽胎中ニハ「トリチコメクレイン」酸、糖、蛋白質、脂肪、無窒素物、灰分

白麥麴が涼であるのは、やはり春種多るために秋、冬の二氣を缺く結果である。時珍曰く。新麥は性が熱であり、陳麥は平、和である。

### 主治

【客熱を除き、煩渴、咽燥を止め、小便を利し、肝氣を養ひ、漏血、唾血を止め、婦人を妊娠し易くする】（別錄）【心氣を養ふ。心病にはこれを食ふがよし】（思遺）【湯に煎じて飲めば俄かに劇しき淋を治す】（宗爽）【熬つて末にして服すれば腸中の蛭蟲を殺す】（藥性）【陳きものを湯に煎じて飲めば虚汗を止める。燒いて性を存し、油で調へて諸瘡、湯火傷灼に塗る】（時珍）

### 發明

時珍曰く、按ずるに、素問に『麥は火に屬す、心の穀なり』とあり、鄭玄は『麥には孚甲ふかふがあり、木に屬する』といひ、許慎は『麥は金に屬す。金、王にして生じ、火王にして死す』といひ、この三説はそれぞれ異つてゐるのであつて、別錄に『麥は肝氣を養ふ』とあるは鄭氏の説に合致し、孫思邈が『麥は心氣を養ふ』といふは素問と合致してゐる。しかしその功力の點を公平に觀察するに、煩を除き、渴を止め、汗を收め、溲そうを利し、血を止めるは皆心の病に關するものだ。これは素問が論據として正しいものといはねばならぬ。蓋し、許氏は時を中心としていひ、

等ノ他「ゲイタミン」  
A及ビBヲ含ミCヲ  
缺クト。

(四) 麴ハ麴ニ同ジ。

(五) 麴ハ小麥ノ屑皮  
ナリ。

(六) 麴ハ麥粉ナリ。

(七) 河ハ黃河、渭ハ  
渭水ヲ指ス。

(八) 大觀ニ客字ナシ。

(九) 大觀ニ煩ヲ疎ニ  
作ル。

(一〇) 大觀ニ燥ヲ乾ニ  
作ル。

(一一) 本經逢原ニ王ヲ  
訛ニ作ル。

(一二) 眉毛中ニ蒼ヲ生  
ズルヲ眉鍊瘡ト云  
フ。

鄭氏は形を中心としていひ、素問は功性を中心としていつたので、それ故に立論が異つたに過ぎぬのである。

震亨曰く、饑饉の際小麥を穀の代用とするには、晒燥して少量の水で潤し、春いて皮を去り、煮て飯にして食ふやうにする。さうすれば麴の熱の悪影響を被らない。

### 附方

舊三、新四。

【消渴の心煩】小麥で飯、及び粥を作つて食ふ。(心鏡)

人の五淋】身熱し、腹滿するには、小麥一升、通草二兩を水三升で一升到煮て飲め

ば瘥える。(奉親書) 【項下の癭氣】小麥一升を醋一升到漬け、晒し乾して末にし、海

藻を洗つて研つた末三兩と和しませ、一日三回づつ、酒で方寸匕を服す。(小品) 【二眉

鍊頭瘡】小麥を焼いて性を存して末にし、油で調へて傳ける。(儒門事親) 【白癧風癰】

小麥を石の上に攤げ、焼いた鐵物で壓搾して出した油を搽る。甚だ效がある。(醫學

正傳) 【湯火傷灼】まだ瘡とならぬには、小麥を黒く炒つて研り、膩粉を入れて油で

調へて塗る。冷水に觸れてはならぬ。必ず爛れるものである。(袖珍方) 【金瘡の腸出】

小麥五升を水九升で煮て四升を取り、木綿で濾して汁を取り、極めて冷えるを待ち、

患者を席の上に臥させ、その汁を含んで嚙きかければ腸は漸次に入る。その背に嚙

(二三)浮麥ハ、シヒナ  
ムギ、皮アリテ肉ナ  
キ空穀ヲ云フ。

のであつて、決して患者本人にその薬を知らしめ、また多くの傍にある人人に物を言はせてはならぬ。腸が入らなくなるものである。腸が入つたならば、その席の四隅を擡もちげて軽く揺り腸を自から入らしめる。その後十日ほどの間はなるべく美食を攝とるやうにする。決して本人を驚かし感動さしてはならぬ。驚動させれば死亡する。(劉涓子泉遺方)

(二三)浮麥 即ち水で淘つたとき浮き上つたものである。焙じて用ゐる。

氣味

【甘く鹹し、寒にして毒なし】

主治

【氣を益し、熱を除き、自汗、

盜汗、骨蒸、虛熱、婦人の勞熱を止める】(時珍)

麥麩

主治

【時疾熱瘡、湯火瘡爛、撲損傷折の瘀血おけつには、醋で炒つて罯貼あんどふする】(日華) 【麩に和し餅にして食へば、洩痢を止め、中を調へ、熱を去り、身體を壯健にする。醋を拌まぜ、蒸熱して袋に盛り、包んで人馬の冷失、腰脚の傷折の患部を熨すれば、痛を止め、血を散ずる】(藏器) 【醋で蒸して手足の風濕痺痛、寒濕脚氣を熨し、汗の出るまで交互に易へて熨するがいづれも良し、末にして服すれば虚汗を止める】(時珍)

## 發明

時珍曰く、麩とは麥の皮のことである。浮麥と性は同じであるが、汗を止める功力は浮麥の次位にある。蓋し浮麥とは肉の無い麥である。凡そ身體の疼痛するもの、及び、瘡瘍そうじやうの腫爛して物を漬け沾うるははすもの、或は小兒の暑期に出る痘瘡で、潰爛して席や寢具に着くために眠れぬものには、いづれも蒲團皮へ麩を盛り縫合せて敷いて臥せば、性が涼でありまた軟かで誠に妙法である。

## 附方

新七。

【虛汗、盜汗】衛生寶鑑では、浮小麥を文武火で炒つて末にし、

一日三回、二錢づつを米飲で服す。或は湯に煎じて茶代りに飲む。○ある方では、

豬鬣唇ちようしんを煮熟して切片し、右の末を蘸つけて食ふも良し。【産後の虛汗】小麥麩、牡

蠣等分を末にし、一日二回、豬肉汁で調へて二錢を服す。（胡氏婦人方）【走氣で痛むもの】

【醃醋げんそくを麩皮に拌ぜて炒り熱し、袋に盛つて熨す。（生生編）】【諸種の癰痕を滅す】

春、夏は大麥麩を用ゐ、秋、冬は小麥麩を用ゐ、篩ふるつた粉を酥そで和して傳ける。（總

錄）

【小兒の眉瘡】小麥麩を黒く炒つて研末し、酒で調へて傳ける。【小便尿血】麩

## 麩氣味

【甘し、溫にして微毒あり。熱を消し煩を止め能はぬ。（前錄）】大明。

曰く、性は壅熱ようねつであつて、少し風氣を動じ、丹石の毒を發する。思邈しゐゐつ曰く、多く食へば宿滯しゆくへきを増進し、客氣を加へる。○漢椒かんせう、蘿蔔らふふを畏る。

### 主治

【虚を補す。久しく服すれば膚、體を實し、腸、胃を厚くし、氣力を強くする】(藏器) 【氣を養ひ、不足を補し、五臓を助ける】(日華) 【水で調へて服すれば、人間の中暑、馬の肺熱を病むを治す】(宗奭) 【癰疽ようそ、損傷に傳れば血を散じ、痛を止める。生で食へば大腸を利す。水で調へて服すれば鼻衄びせく、吐血を止める】(時珍)

### 發明

詵しん曰く、麴に熱毒のあるのは、それは多くは陳くちんく黝しうい色になつたものか、又は磨臼中の石末が混入してゐるためだ。但し杵いて食へばよし。

(二四)大觀ニ麴ニ作ル。  
(二五)大觀ニ二ナ三ニ作ル。

藏器曰く、麴は性が熱であるが、(二五)二番磨りのものだけは涼である。それはその粉が麴に近くなるためである。河か、渭ゐ以西の白麥麴は性が涼だ。それは春種ゑるために二氣を缺くからである。

頴てい曰く、東南の地は卑濕で、春雨水が多いから麥がその濕氣を受けてゐる。また曾て汗を出さぬものだ。故に食へば渴し、風氣を動じ、濕を助けて發熱する。西北の地は高燥で、春雨が少いから濕を受けない。また地窖ちこうに貯藏してその汗を出して



ある。且つ北方人の體質は厚くして湿が少い。故に常食しても病を起さぬのだ。

時珍曰く、北方の麪は性が温であつて、これを食へば渴せぬ。南方の麪は性が熱であつて、これを食へば煩渴する。西方國境附近の麪は性が涼である。いづれもその地氣の關係から現はれるものである。漢椒を呑み、蘿蔔を食へば皆能くその毒を解する。それに就いては蘿蔔の條下で説明してある。醫方中に往往飛羅麪を用ゐることになつてゐるのは、その石末を無くして性を平易ならしめるためである。陳麥麪は水で煮て食へば毒はないが、糟は脹を發し、よく病を發し、瘡を發する。ただこれを蒸餅にし藥に和するのは、そのものが消化し易い點を利用するのだ。按ずるに、李廷飛の延壽書に『北方は霜雪が多い、それで麪に毒がない。南方は雪が少い、それで麪に毒がある』とあり、顧元慶の簷曝偶談には『江南の麥は花が夜開くものだから病を發する。江北の麥は花が晝開くものだから人體に宜い』とあり、又、『且つ魚と稻とは江淮が宜く、羊と麪とは江洛が宜い』とある。やはり五方それぞれ適、不適があるのだ。麪は性熱ではあるが、寒食の日に紙袋に盛つて風の當る場所へ懸けて置けば、數十年に互つて腐敗變質せず、それで熱性は皆去つて毒がない。藥に



〔六抄ハ匙ヲ以テ取  
ルヲ云フ。〕

入れるに尤も良いものである。

〔附方〕

舊七、新二十一。【熱渴心煩】温水一盞で麴一兩を調へて飲む。（聖濟總錄）

【中喝卒死】井水で麴一大〔六抄〕抄を和して服す。（千金）【夜間の盜汗】麥麴を彈丸ほど

にし、就寢時に空心にして煮て食ひ、翌朝妙香散一帖を服して效を取る。【内損の

吐血】飛羅麴をあつさり炒り、二錢を京墨汁、或は藕節汁（わうせつじふ）で調へて服す。（醫學集度）

【大衄出血】口、耳皆出るには、白麴に鹽少量を入れ、三錢を冷水で調へて服す。（普

濟方）【中蠱の吐血】小麥麴二合を水で調へて服すれば半日で下出するものだ。（廣記）

【嘔噦の止まぬもの】醋で麴を和して彈丸ほどのものを三十箇を作り、沸湯で煮熟

して漉出し、漿水中に投じて温い間に二三箇を吞む。それで噦が定まれば再び吞む

に及ばぬが、なほ定まらぬときは夕刻に再び吞む。（兵部手集）【白色のものを下す寒

痢】炒つた麴方寸匕づつを粥に入れて食へば、一日百回瀉して醫師も救ひ得ぬほど

のものを能く療ずる。（外臺）【泄痢（せりり）して固まらぬもの】白麴一斤を炒つて黄色に焦

し、毎日空心に一二匙を温水で服す。（正要）【諸瘡、久瘡】三軒の家から寒食麴一合

づつを集め、五月五日の正午に採つた青蒿（せいこう）を搗（す）つて自然汁を取り、和して綠豆大の

(七七) 跖ハ舐ナリ、皮起ルナリ、ソコマメ。

丸にし、發作する日の早朝無根水で一丸を服す。ある方では、炒つた黃丹わうたん少量を加へる。(德生堂) 【頭皮の虚腫】腫の状態が薄く蒸餅のやうで内部に水があるやうに見えるには、口で麪を嚼かんで傳けるが良し。(梅師方) 【咽喉腫痛】迂うかと物をも食へぬには、白麪を醋で和して外から喉の腫れた部位に塗る。(普濟方) 【婦人の吹奶すゐない】水で麪を調へて糊に煮、熟せんとする時、無灰酒一盞を投じて攪きまぜて熱して飲み、別人に徐徐に按摩させる。藥が行つて瘰いえる。(聖惠方) 【乳癰の消かぬもの】白麪半斤を黄色に炒り、醋で糊に煮て塗れば消く。(聖惠方) 【破傷風病】白麪、燒鹽各一撮を新水で調へて塗る。(普濟方) 【金瘡の出血】止まらぬには、生麪の乾いたものを傳ければ五七日で癒える。(蘭氏經驗方) 【遠路を歩行して出た脚きゃくの泡に成つたものには、水で生麪を調へて塗れば一夜にして平になる。(海上) 【折傷瘀損】白麪、卮子仁しにを共に搗き、水で調へて傳ければ散る。【火燎瘡】炒つた麪に卮子仁末を入れ、油で和して傳ける。(千金) 【瘡中の惡肉】寒食麪二兩、巴豆はづ五分を水で和して餅にし、燒いて末にして摻ふる。(仙傳外科) 【白禿頭瘡】白麪、豆豉を和して研り、醋で和して傳ける。(普濟方) 【小兒の口瘡】寒食麪五錢、消石七錢を水で調へ、男は左、女は右

（二）筋ハ筋ト同シ、  
筋ハ今日食用トスル  
駄ノコトナリ。  
（三）漿粉ハ俗ニ云フ  
シヤウフノリ。

の足の心に半錢を塗る。（普濟方）【婦人の斷産】白麴一升を酒一升で煮沸し、滓を去

つて三服に分け、月經の潮せんとする前夜と翌朝と曉とに服す。【陰冷の悶痛】漸

次に痛が腹に入つて腫滿するには、醋で麴を和して熨す。（千金方）【一切の漏瘡】鹽

と麴を和して團にし、燒き研つて傅ける。（千金方）【療疽の汁の出るもの】手足、肩

背に生じ、るゐるゐ 癰癰として赤豆のやうになつたものには、剥き淨めて酒で麴を和して傅

ける。（千金方）【一切の疔腫】麴を臘猪脂で和して封ずるがよし。（梅師方）【米食の積

傷】白麴一兩、白酒麴二丸を炒つて末にし、二匙づつを白湯で調へて服す。肉食で

傷めたものならば山查湯で服す。（簡便方）

### 麥粉 氣味

【甘し、涼にして毒なし】

### 主治

【中を補し、氣脈を益し、

五臟を和し、經絡を調へる。又、炒つて一合を湯で服すれば下痢を斷つ（孟詵）【醋

で熬つて膏にしたものは、一切の癰腫、湯火傷を消す】（時珍）

### 發明

時珍曰く、麥粉とは麴のことだ。麴を洗つて（二）筋にすると澄し

出す（九）漿粉である。今世間では（二）漿衣に多くこれを用ゐるが、古方には用ゐたも

のは鮮い。すくな 按ずるに、萬表の積善堂方に『烏龍膏は一切の癰腫發背、無名腫毒の初

(二) 藥衣トハ衣服ニ  
糊チ付ケル コトナ  
リ。

期の煨<sup>きんねつ</sup>熱してまだ破れぬものを治し、效を取ることを神の如きものだ。一箇年以上を  
經た小粉を——久しく經つたものほど佳し——鍋で炒る。炒る初めには錫<sup>あ</sup>のやうに  
なるが、久しく炒つて居るうちに乾いて黃黑色になる。それを冷えて定まつてから研  
末し、陳米醋で調へて糊にし、更に熬つて黒漆のやうにして瓷<sup>じく</sup>罐に貯へ、使用する  
時には、紙に攤<sup>の</sup>し、孔を剪り明けて貼る。すると氷のやうに冷えて疼痛が止まり、  
少頃<sup>しばらく</sup>すると痒を覺え、乾いて取らうとしても動かない。それをそのまま久しく經つ  
と、腫毒が自ら消する頃に藥力もまた盡きて脱落する。甚だ妙である。この方は蘇  
州の杜水庵の所傳であつて、屢<sup>しばしば</sup>用ゐて效驗があつた。藥は極めて得易いが功力は  
偉大なものだ。醫術を行ふ者は宜しく收藏すべきことである』といつてある。

### 麴筋

氣味

【甘し、涼にして毒なし】

主治

【熱を解し、中を和す。勞

熱の患者は煮て食ふがよし】(時珍)

【中を寛にし、氣を益す】(寧原)

### 發明

時珍曰く、麴筋は麩と麴とを水中で揉み洗つて出来るものだ。古人は  
知らなかつたらしい。今では(二)素食として重要な物となつてゐる。煮て食ふが甚  
だ良し。今は一般に多く油で炒るが、さうしたものは性が熱である。宗奭曰く、生

(二) 素食トハ精進料  
理ノコトナリ。

で白粥を嚼めば筋になる。鳥や蟲を粘し得るものだ。

**麥麩** 卽ち粳である。麥を蒸し磨つて出来る屑である。

氣味 【甘し、微寒に

して毒なし】

主治

【消渴に煩を止める】（蜀本）

**麥苗**（拾遺）

氣味

【辛し、寒にして毒なし】

主治

【酒毒の暴熱。酒疸

の目黄を消す。いづれも搗き爛して汁を絞り、日毎に飲む。又、蠱毒を解すには汁を煮て濾して服す】（藏器）  
【煩悶を除き、時疾の狂熱を解し、胸膈の熱を退け、小腸を利す。麴を作つて食へば甚だ顏色を益す】（日華）

**麥奴**

藏器曰く、麥の穂が熟せんとする時に上に出る黒黴そのものである。

主治

【熱煩、天行熱毒。丹石の毒を解す】（藏器）

【陽毒、溫毒の極端な熱で發

狂し大渴するもの、及び溫瘧を治す】（時珍）

發明

時珍曰く、朱肱の南陽活人書に『陽毒、溫毒の極端な熱で發狂し、發

斑し、大渴し、その程度が通常に倍して甚しきには、黑奴丸一丸を水で溶して服す。汗を出し、或は微し利して癒える。その方は、小麥奴、梁上塵、釜底煤、竈突墨、黄芩、麻黄、硝黄等分を末にし、蜜で彈子大の丸にして用ゐる』とある。蓋し火化



の作用を利用したもので、從治の法則に據つたものだ。麥なるものは心の穀で火に屬するものであり、奴そのものは麥實が實みらんとして濕熱のために蒸上された黒黴だから、釜煤、竈墨と同じ關係にあるものだ。この方は、陳延之の小品方には麥奴丸なる名稱で記載され、初虞世の古今錄驗には高堂丸、水解丸なる名稱で記載されてある。誠に救急の良藥である。

### 稗 主治

【灰に焼き、疣瘰いろうしを去り、惡肉を蝕しよくくする膏中に入れて用ゐる】(時珍)

## (二) 大 麥 (別錄中心)

和名 おほむぎ  
學名 *Hordeum vulgare, L.*  
科名 禾本科

### 釋 名

牟麥

時珍曰く、麥にして苗、粒共に來より大きい。故に大なる名稱

を呼ばれたのだ。牟ぼもやはり大の意味で、二字の意味を合して麩ぼうと書く。

### (三) 集 解

弘景曰く、今の稷麥で、一名牟麥といふ。穠麥くわうはくに似てこれは皮の薄

いだけのものだ。

恭曰く、大麥は關中に産する。即ち青稞せいこくわであつて、小麥に似て形の大きい麥で、

皮が厚いから大麥といふのである。穠麥には似てゐない。

(一) 牧野云フ、大麥モ亦小麥ト同シク今日デハ何レノ處ニモ其野生品ハ見付カラヌ、我邦ヘハ舊ク入り來ツテ今日デハ最も重要ナ食料品トナツテキルガ、多分古ヘ支那ノ方面ヨリ移入セラレタモノト思フ、此一變種ニ稷麥即チはだかむぎ(Yvar. coeleste [L.]ガアツテ、中部以西ノ日本デハ普通ニ耕



作セラレテキル。

(二) 木村(康)曰ク、大麥ハ元來吾邦ニテハ米ニ亞ギテ主要ナル食物ニシテ、主トシテ麥飯トナシ、其他麥酒ノ麥房トシ、又飴ヲ作ル等效用頗ル多シ。

(三) 關中ハ草部山草類淫羊藿ノ註ヲ見ヨ。  
(四) 秦隴ハ草部山草類胡黃連ノ註ヲ見ヨ。  
(五) 巴西ハ水部甘藷蜜ノ註ヲ見ヨ。

頤曰く、大麥は今は南方でも北方でも能く種蒔する。穡麥には二種あつて、一種は小麥に類して大きく、一種は大麥に類して大きい。

藏器曰く、大、穡の二麥を前後二條に記載してあるが、蓋し穡麥といふは皮付き



〔麥 大〕

販賣しゐるが、區別の付き兼ねるものである。

陳承曰く、小麥とは今一般に磨つて麴にして日常用ゐてゐるものを指し、大麥とは一般に粒も皮も稻に似たものを指す。これは飯にすれば滑かなもので、馬の飼糧

のもの、大麥といふは麥米のことで、殻のままだのものと殻のないうものとの區別である。蘇恭が青稞を大麥としたのは誤だ。青稞は大麥に似て皮と肉とが生來離れてゐるものだ。秦隴、巴西地方でこれを種ゑる。今は一般にこの物を大麥米として

（六）汴洛ハ草部芳草  
類香蒿ノ註ヲ見ヨ。

に良し。穞麥くわうはくとは今一般に小麥に似て粒が大きく、色の青黄のもののことで、麴にすれば脆もろく硬く、多く食へば脹する。（六）汴洛べんらく、河北地方ではまたこれを黃稞と呼んでゐる。關中の一種の青稞は、近道のものに比すれば粒がやや小さく、色は微し青い。これは馬の飼糧にはするが、薬には用ゐられてゐない。かやうな次第で、大、穞の二麥はその名稱が錯綜さくそうしてゐるが、今の穞麥といつて小麥に似て大きいものは大麥といふが正しく、今の大麥といつて小麥に似て硬脆かうぜいなものは穞麥といふが正しいのである。曖昧あいまいな區別は宜しくない。

時珍曰く、大、穞の二麥に對する註釋者の意見は一定してゐないが、按ずるに、吳普本草には『大、麥、一名穞麥。五穀の長なり』とあり、王禎の農書には『青稞の大、小の二種は、大、小の麥に似て粒が大きく皮が薄く、麴が多くて麩ふがない。西方の地で種ゑてゐる。大小麥とは名稱が異ふといふに過ぎぬものだ』とあり、郭義恭の廣志には、大麥には、黑穞麥といふがあり、稔麥みんばくといふがあり、涼州に産し、大麥に似てゐる。赤麥といふもあり、これは赤色で肥えてゐる』とある。これ等の說に據れば、穞麥とは大麥中の一種で皮が厚く青色のものとといふことになる。大體に於て、

これは一類の異種であつて、粟、粳などの種類が百に近いと同じわけで、總て一類である。ただその生産する地方の地味、氣候等の關係から不同があるだけのものだ。故にこの二麥の主たる治功も甚だ遠いものではない。大麥もやはり粘のあるものを糯麥じゆばくと名け、釀酒の材料にする。

### 〔七〕氣味

〔鹹し、溫にして微寒なり、毒なし。五穀の長となす。人をして熱多からしむ〕。詵曰く、暴食はうしやくすれば脚弱のやうな状態になる。それは氣を下すためだ。久しく服すれば人體に宜し、熟したものは益あり、生を帶びたものは冷にして人體を損ずる。○石蜜が使となる。

### 主治

〔消渴。熱を除き、氣を益し、中を調へる〕（別錄） 〔虛劣を補し、血脈を壯にし、顔色を益し、五臓を實し、穀食を消化し、洩せつを止め、風氣を動ぜぬ。久しく食すれば人體を肥白ならしめ、肌膚を滑にする。麴もちにすれば小麥に勝り、燥熱がない〕（士良） 〔麴にしたものは、胃を平にし、渴を止め、食物を消化し、脹滿を療ず〕（蘇恭） 〔久しく食すれば頭髮が白くならぬ。針砂はりなまき、沒石子等に和して染めれば髪が黒くなる〕（孟詵） 〔胸を寛にし、氣を下し、血を涼し、積を消し、食を進める〕（時珍）

〔七〕木村（康）曰く、  
（成分）葉ニハ「カロチン」及ビ乾燥物質中糖酸鹽〇・〇三%等ヲ含ム、全草ノ灰分五・七%ニシテ、SiO<sub>2</sub>五〇・六〇%、CaO四・七%、MgO一〇%ヲ含ム。  
穀粒ニハ全組成（〇）  
水分一二・九五、脂肪一・八七、無窒素物六七・八八、粗纖維四・二三、灰分三・〇六、其ノ中澱粉凡ソ五六・六六、糖等。六一七「デキストリン」ノ乾燥物質中（〇）澱

## 發明

宗奭曰く、大麥は性が平涼であり、滑膩である。纏喉風で食物の喉を通らぬ患者には、この麪で稀糊を作つて嚥せる。胃氣を助けて平癒する。三伏の暑中には、朝廷で麪にして臣下に賜はることになつてゐる。震亨曰く、大麥の熟した初に、世人は多く炒つて食ふが、この物には火があつて能く熱病を生ずる。世人はこれを知らない。時珍曰く、大麥は飯となし食饗として益がある。粥に煮れば甚だ滑かだ。麪に磨つて醬にすれば甚だ甘美である。

## 附方

舊四、新五。【飽食の煩脹】ただ臥してゐたがるには、大麥麪を熬つて微

し香くし、方寸匕づつを白湯で服するが佳し。(肘後方) 【膜外の水氣】大麥麪、甘遂

末各半兩を水で和し、餅にして炙熱して食ひ、通じをつける。(總錄) 【小兒の(八)傷乳】

腹脹し、煩悶し、よく睡りたがるには、大麥麪を生で用ゐ、一錢を水で調へて服す。

白麪を微し炒つたものもよし。(保幼大全) 九 【蠅螻尿瘡】一日三回、大麥を嚙んで傳け

る。(傷寒類要) 【腫毒の已に破れたもの】青大麥を鬚を去り、炒り爆して花のやうに

し、末にして傳ける。靨になつたものは、それを剥き去つて又數回傳ければ癒える。

【麥芒の目に入つたとき】大麥の煮汁で洗へば出る。(孫真人方) 【湯火傷灼】大麥を

粉八〇・八、「プロテイン」ハ・七、「ベントザン」二・八、脂肪二・二三、蔗糖一、粗纖維〇・四五、灰分一・一九。  
麥芽中ニハ「ベタイン」「ヒヨリン」蔗糖「ヒスチジン」「ホルデニン」等ヲ含ミ、「アミド」類ニ富ム、百分組成ハ水分一二、含窒素物二三、純「プロテイン」一六・二八、脂肪二、粗纖維一・二三、無窒素物四三、灰分七・五一、又「ヴァイタミン」ハA、B、D、Eヲ含ム。  
(八) 傷乳ハ乳ヲ飲ミ過ギタルヤマヒ。  
(九) 蠅螻尿瘡ハ壁間ニ隠レ住ム蠅螻蟲、一名ハ脚蟲ガ尿ヲ以テ人ヲ射タトキ其毒ニ中リ生ズルモノデ皮膚ニ米粒大又ハ豆

大ノ水泡瘡ヲ發シ、湯火傷ノ如キ狀ヲ呈スルモノト云フ。

(一〇)穀ハ皮裂、癰ハ手足ノ凍瘡。

(一)牧野云フ、是レハおほむぎノ一品デ本草綱目啓蒙ニ「一種純大ニシテ色青キ者ナリ」ト言ッテキル、即チ今之レニ從フテオク、からすむぎニハ同名ガアリ又かうぼうむぎニモ同名ガアルノヲ混視セ

黒く炒つて研末し、細かに調へて搽る。〔負傷して腸を露出せるもの〕大麥粥汁で

腸を洗つて推し入れ、百日間はただ米麤のみを飲むがよし。(千金)【突然の淋痛】大

麥三兩を湯に煎じ、薑汁、蜂蜜を入れて茶代りに飲む。(聖惠方)

麥蘖 けつまい 蘖米の條下に記載す。

苗 主 治 〔諸種の黃病に小便を利す。杵汁を日服す〕(類要)〔冬期の顔面、

手足の(一〇)刻瘡を煮汁で洗ふ〕(時珍)

附 方 新一。【小便不通】陳大麥稻の濃煎汁を頻に服す。(簡便方)

大麥奴 主 治 〔熱疾を解し、藥毒を消す〕(藏器)

(一)穢麥 穢の音は穢(グ) (別錄中心) 和 名 からすむぎ、かうぼうむぎ (本草綱目啓蒙)

學 名 *Eurum vulgare*, L. var.  
科 名 禾本科

釋 名 時珍曰く、穢とは穀が厚くて粗礫だといふ意味である。

集 解 弘景曰く、穢麥は馬に食はせるものだ。服食家はいづれも大、穢の二

麥を食ふが、これは人體を輕健ならしめるものである。炳曰く、穢麥は西川地方で



(三)木村(康)曰ク、  
雀麥ノ事詳サラズ、  
參考ノ爲マカラズム  
キ(Avena sativa L.)  
ノ成分ヲ記ス。

マカラズムギノ全草  
ニハ蔗糖「セカロ  
ゼ」果糖、葡萄糖「ア  
ルブミン」イド「ガイ  
タミン」ヲ含ム、全草  
ノ灰分ノ二分ノ一乃  
至三分ノ二ハ「カル  
シウム」ノ占ムル所ニシ  
テ、葉ニ於テ「カルシ  
ウム」ハ凡ツ七〇%ニ達  
ス、又胚素ヲ生植物  
一〇〇瓦中五〇胚、  
乾燥植物一〇〇瓦中  
六二胚ヲ有ス、又根

だが、ただ穂が細く長くして疎<sup>まばら</sup>らだ。唐の劉夢得が所謂『菟<sup>さ</sup>麥、燕麥、春風に動搖す』といったそのものである。周憲王曰く、燕麥は穂が極めて細く、穂毎にまた數十箇の小叉があり、子もまた細小である。春<sup>つ</sup>いて皮を去り、麪<sup>めん</sup>にして蒸して食ひ、また餅にして食ふ。いづれも凶歳のとき代用食になる。

### 米 (三) 氣味

【甘し、平にして毒なし】

#### 主治

【饑を充て、腸を滑する】(時珍)

### 苗 氣味

【甘し、平にして毒なし】

#### 主治

【婦人の臨産に胎兒の出ぬに

は、汁に煮て飲む】(蘇恭)

### 附方

舊三。

【腹中の胎兒死亡】【胞衣の下らぬもの】上に心を捨くには、雀

麥一把を水五升で二升に煮詰めて溫服する。(子母秘錄)

(三)齒<sup>しちく</sup>鹽、竝に蟲

【積年瘰癧

ず、幼少の頃から老年に及んでもなほ悩むには、雀麥、一名杜姥<sup>どら</sup>草、俗にいふ牛星草を用ゐ、先づ苦瓠<sup>くこ</sup>葉三十枚を取つて洗淨し、杜姥草を長さ二寸に剪つてその苦瓠葉で廣さ一寸、厚さ五分の五箇の包<sup>つつみ</sup>にしそれを三年の酢に漬け、日中に二包を火の中で炮<sup>や</sup>き。熱して口中に納れて齒の外邊を熨す。冷えれば更に易へる。その時熨した包を水中に入れて解いて視ると、長さ三分ほどの蟲が出る。老いたものは黃色、



莖中ニ「グラミニン」ヲ含ム。

穀粒ノ組成ハ（動搖甚ダシ）凡ソ水分一

二・八%、含窒素物一

〇・二五、脂肪五・二七、無窒素物五九・六八、組織維九・九七、灰分三・〇二、ソノ中澱粉凡ソ五〇・一六%、糖其他二・一五、藥ノ中ニハ「ペリチン」質（メチールベグタード）〇・八%（乾燥物質ニツイテ）及多量「ペントザン」及ビ蠟質脂肪各〇・三%、「ウイタミン」等ヲ含ム。

（應用）穀類トシテ重要ノモノニシテ、穀粒チ「オートミール」トイヒ粥トナシテ食用ニ供シ、又全草チ牛馬飼料トナス。

三 蕎麥ハムシクヒバ。

（一）牧野云フ、蕎麥ハ多分中央或ハ北部

亞細亞ノ原産デアラ

ウトノ事デアアル、我

邦ニハ廣ク栽培シ貴

要ナ食料品トナツテ

セルガ、是レニ秋そ

ばト夏そばトガアル

品質ハ秋そば佳ク夏

そば劣ル故ニ秋そば最モ普通ニ作ラレ

ル。

（二）翹然ハ特出スル

少いものは白色で、多きは二三十匹、少きは一二十匹も出るものだ。この方は甚だ妙である。（外臺秘要）

### 蕎麥（宋嘉祐）


和名 そば  
學名 *Eragrostis cicutaria*, Moench.  
科名 たて科（蓼科）

#### 釋名

蕎麥 蕎の音は翹（ケウ）である。

烏麥（吳瑞） 花蕎

時珍曰く、蕎麥



〔蕎麥〕

といふは、莖が弱くて（ミ）翹然と伸び上るものであり、長成し易く收穫し易く、麩に磨れば麥のやうなものだ。それで蕎といひ、蕎（そば）といひ、それに麥と同じ名を加へて呼ぶのである。俗に甜蕎（てんぎょう）と

も呼ぶが、それは苦蕎と區別するためである。楊慎は丹鉛錄に、烏麥を指して燕麥としてあるが、蓋しまだ日用本草を讀んだことがなかつたと見える。

### 集解

炳曰く、蕎麥を飯にするには、蒸して十分に氣を透らせ、それを烈日に暴して口を開かせ、春いて米仁を取つて作るものである。時珍曰く、蕎麥は南方にも北方にもある。立秋の前後に種を下し、八九月に刈取つて收穫する。性は最も霜を畏れるものだ。苗は高さ一尺餘で、莖は赤く、葉は緑で烏柏樹の葉のやうだ。

(三) 粦粦然、鮮明ナル貌。

(四) 湯餅トハ麪餅ヲ水淪シテ食フモノヲ云フ。

(五) 河漏ハソバキリ。

(六) 粉餅トハソバガキ又ハソバミヅトシテ食スヲ指スカ。

(七) 木村(康)曰ク、(成分)全草ハ「アーントチアン」糖、「醣糖ルチン」等ヲ含ム、

小さい白色の花を開き、それが密に繁つて、粦粦然たるものだ。結實は莢として羊蹄の實のやうで三稜があり、老い熟すると烏黒色になる。王禎の農書に『北方では多くこれを種ゑ、磨つて麪にし、煎餅にして蒜を配合して食ひ、或は湯餅にし、それを河漏と呼んで常食に供してゐるが、滑かに細く粉のやうで麥麪に亞ぐものだ。南方の一種はただ粉餅として食する。これは農家に於ける冬季の食糧だ』といつてある。

### (七) 氣味

【甘し、平、寒にして毒なし】思邈曰く、酸し、微寒なり。これを食へば消化し難く、久しく食へば風を動じ、頭眩を起す。麪にし、猪、羊肉を和し、

ソノ七一〇%ヲ占  
ムル灰分ハCaO三〇  
一五、K<sub>2</sub>O二一・四  
四、MgO一・八及  
僅ノSO<sub>2</sub>及NaA  
ナ。

種子(精製ノモノ)ノ  
組成(%)、水分一  
四・八、無窒素物五  
五、含窒素物一三・  
三、脂肪二・七、素纖  
維一・四三、灰分一・  
七六、蔗糖一・二〇%、  
澱粉凡ソ六七%ニ達  
スル量ヲ含ム。  
そば粉ノ組成(%)ハ  
水分一三・八、含窒素  
物八・二八(純蛋白質  
七・八一)、脂肪一・四  
九、無窒素物七四・五  
八(澱粉六七)、粗纖  
素・七、灰分一・一  
一及ビ少量ノ「ゴム」  
質及ビ糖ヲ存ス。  
「ハ」脾臓ハ糖母ノ一  
名オヨリカナベリ。  
「先」衛ハ急ニ注ギ下

熱して食ふは八九回以上はよくない。過ごせば熱風を患ひ、鬚眉しゆびが脱落して再び生  
えることが稀である。涇州けいしゅう、邠州ふんしゅう以北にこの疾の多い。又、黄魚と合せて食  
つてはならぬ。

### 主治

「腸、胃を實し、氣力を益し、精神を續ぎ、能く五臓の滓穢しやくわいを鍊る」孟  
詵「飯にして食ふが丹石の毒を壓するに甚だ良し」(蕭炳)「醋で粉を調へて小兒の丹  
毒赤腫、熱瘡に塗る」(吳瑞)「氣を降し、腸を寛にし、積滯しやくたいを磨し、熱腫、風痛を消  
し、白濁、白帶びやくたい、脾積、洩瀉を除く、沙糖水で炒麩二錢を調へて服すれば痢疾を  
治す。炒り焦し、熱水で衝きつして服すれば絞腸沙痛かうちやうしやつうを治す」(時珍)

### 發明

穎曰く、本草には『蕎麥は能く五臓の滓穢を鍊る』といひ、俗説には  
『一年の沈積が腸、胃に在るには、これを食へばやはり消し去る』といふ

時珍曰く、蕎麥は最も氣を降し腸を寛にする。故に能く腸、胃の滓滯を鍊るもの  
であつて、かくて濁帶、洩痢、腹痛、上氣の疾を治す。氣盛にして濕熱ある者に  
適するものだ。脾、胃虛寒の者がこれを食ふならば、大いに元氣を脱して鬚眉を落  
す。適當なものでない。孟詵は「氣力を益す」といつてあるが、首肯しうかうし難いこと

スコト。

だ。按ずるに、楊起の簡便方に『肚腹が微微として痛み、通じ始めると瀉し、瀉しても多くはなく、晝夜數回に及ぶものは、蕎麥麪一味を飯にして三四回續けざまに食へば癒える。予は壯年の頃、この病で二箇月ほどの間に甚しく瘦怯し、消食、化氣の藥を用ゐてもいづれも效がなかつたが、ある僧にこの方を授つて癒えた。その後度度用ゐて皆效を舉げてゐる』とある。これはこの物の積滯を鍊る功力を立證するものである。普濟の小兒の天弔、及び歷節風を治する方の中にもこれを用ゐてある。

### 附方

新十六。

【欬嗽上氣】蕎麥粉四兩、茶末二錢、生蜜二兩、水一椀を一千

回攪き廻して飲む。良久して氣を下して止まず、それで癒える。(備門事親) 【〇〇】十水

腫喘】生大戟一錢、蕎麥麪二錢を水で和して餅にし、炙熟して末にし、空心に茶で服

す。大小便の利するを度とする。(聖惠) 【男子の白濁】魏元君の濟生丹——蕎麥を炒

り焦して末にし、雞子白で和して梧子大の丸にし、一日三回、五十丸づつを鹽湯で

服す。【赤白帶下】方は上に同じ。【禁口痢疾】蕎麥麪を二錢づつ沙糖水で調へて服

す。(眞仙方) 【癰疽發背】一切の腫毒には、蕎麥麪、硫黃各二兩を末にして井華水で

〇〇十水腫トハ通身腫、四肢腫、面腫、脚腫、鼓脹、腸覃、石癧等ノ十種ヲ云フカ。

和し、餅にして晒して取收め、一餅づつを水に磨つて傳ける。痛むものをば痛まなくし、痛まぬものをば痛ませて癒える。(直指) 【瘡頭の黒回せるもの】蕎麥麴を煮て食へば起き上る。(直指) 【痘瘡の潰爛】蕎麥粉を頻頻と傳ける。(痘疹方) 【湯火傷灼】蕎麥麴を黃に炒つて研末し、水で和して傳ける。神の如き效がある。(奇效方) 【蛇盤瘰癧】項部に圍み連なるには、蕎麥を炒つて殼を去り、海藻、白殭蠶びやくきやうさんを炒つて絲を去り、等分を末にし、白梅を湯に浸して肉を取り、半減して和して綠豆大の丸にし、六七十丸づつを食後、就寢時しうしんじに米飲で服す。一日五回づつ服す。その毒は大便秘から排出するものである。淡菜と連服するが尤も好し。淡菜とは海藻の上に生ずるもので、やはりこの病に對する治功がある。豆腐、雞、羊、酒、麴を忌む。(阮氏方) 【積聚敗血】通仙散——男子の敗積、婦人の敗血を治して眞氣を動ぜぬ。苳麥麴三錢、大黃二錢半だいわうを末にし、就寢時に酒で調へて服す。(多能羅事) 【頭風で冷を畏るもの】李樓は『ある頭風の患者は、三十年間癒えず、綿を重ねて首を裹んでゐたが、予が、蕎麥粉二升を水で調へ、二枚の餅にして更互に頭上に合せて微汗を取らせる」と癒えた』といつてある。(怪證奇方) 【頭風風眼】蕎麥を錢大の餅にして眼の四角に貼



り、米大の艾炷かいしゆで灸する。神の如き效がある。【髪を黒く染る】蕎麥、針砂二錢を

醋で和し、先づ漿で洗淨してから塗つて荷葉で包み、初更の刻にそれを洗ひ去り、

再び無食子、呵子皮、大麥麴二錢を醋で和して塗つて荷葉で包み、曉方に洗ひ去れ

ば黒くなる。（普濟）【絞腸沙痛】蕎麥麴一撮さつを黄に炒り、水で烹にて服す。（簡便方）【小

腸疝氣】蕎麥仁を炒つて尖を去り、胡盧巴を酒に浸して晒し乾して各四兩、小茴香せうじやうかう

を炒つて一兩を末にし、酒糊で梧子大の丸にし、空心に五十丸づつを鹽酒で服す。

二箇月で大便に白膿を出して病根を去る。（孫天仁集效方）

### 藁ぎやう 主 治

【茹じよにして食へば氣を下し、耳目を利す。多く食へば微し洩する】

（土真） ○孫曰く、生で食へば刺風を動じ、身體を痒くする。

### 稽 主 治

【焼灰の淋汁で鹵を取つて熬り乾し、石灰と等分を密封し貯へて置

けば、能く癰疽を爛し、惡肉を蝕し、壓瘰えんしを去るに最も良し。穰で作つた薦へきじつは壁虱

### 附 方

新二。

【噎食いっしよく】蕎麥稽けうはくかいを灰に焼き、淋汁を取つて鍋で煎じて白霜一錢

を取り、蓬砂一錢を入れて研末し、酒で半錢を服す。（海上方）【壁虱へきじつ、蜈蚣ここう】蕎麥稽



を薦に作つて敷き、并に烟に焼いて熏ずる。

### (二) 苦蕎麥 (綱目)

和名にがそば、だつたんそば  
學名 *Eragrostis tataricum*, L.  
科名 たて科 (蓼科)

#### 集解

(一) 牧野云フ、亞細亞中部邊が其原產地デアラウ、我邦デハ未ダ耕作シテキナイ品質ハ蕎麥ヨリハズツト下等デアル、本草綱目啓蒙ニ此苦蕎麥ヲみぞそば (Pinyin: Genum Tsinbergii, Sieb. et Zucc.) ニ充テアルハ全ク誤リデアル。

時珍曰く、苦蕎は南方に産する。春社の日の前後に種を蒔き、莖は青く枝が多く、葉は蕎麥に似て尖り、緑色を帯びた花を開き、結實はやはり蕎麥に似てゐるが、やや尖つて稜角が鋭くなく、その味は苦く悪い。農家では磨り搗いて粉にし、蒸して氣を十分に透らせ、黄汁を滴し去る。



〔蕎 苦〕

かくて饑に作つて食ひ得るのである。色は猪肝のやうだ。穀物としての下級のもので、饑饉の際に饑を凌ぐ位のものである。

#### (三) 氣味

〔甘く苦し、温にして小毒あり〕時珍曰く、多く食へば胃を傷め、風を發し、氣を動じ、能く諸病を發する。黄疾の者は就中禁ぜねばならぬ。

和穀雜一九・七、灰分三・二九。

(一) 牧野云フ、印度ノ原産ナルいれハ最も舊ク我邦ニ移入セラレタモノデアル、即チ神代時分ニ南方ヨリ我邦ニ入り來リシ人種ガ携帶シタモノト思フ、今日デハ我邦デ最第一ノ重要ナ食料品デ從テ廣ク一般ニ耕作セラレテキル、最も能ク土地ニ適シ良質ノ米ヲ產スル、品種亦從テ多ク三百品以上モアル。

## 附方

新一。（のいもちろん）【明目枕】

苦蕎皮、黑豆皮、綠豆皮、決明子、菊花を共に枕に作つて用うれば、老年に達しても目が明かだ。（鄧才雅撰）

## 稻

（別錄下品）

和名 いれ、（のいもちろん） var. *Glutinosa* (Lour)  
學名 *Oryza sativa*, L.  
科名 禾本科

## 釋名

稌 音は杜（ト）である。糯 また稌（なん）とも書く。時珍曰く、稻、稌は稌、

糯の通稱である。物理論に所謂『稻とは既種の總稱だ』とあるはこの意味である。

本草では、専ら糯を指して稻といふことになつてゐる。稻の字は畱に從ふ。畱字の音は函（カン）であつて、人が臼の上で稻の始末をしてゐる状態を意味した形象である。稌といふは方言で、稻の音の轉訛である。その性が粘つて軟なところから糯といふ。

穎曰く、糯米は筋を緩にし、人をして多く睡らしめる。性の糯（だ）なるものだ。

## 集解

弘景曰く、道家にも、方藥にも、稻米と粳米とあつて共に用ゐる。これは二種別のもので、稻米は霜のやうに白いものだ。江東（かうとう）にはこの物はないから一般に粳を稻と呼んでゐる次第で、その特異點の如何なるものかさへ一向に知らない。

恭曰く、稻とは穰穀類全體を通じて呼ぶ名稱であつて、爾雅には、『稌は稻なり』

とある。稌とは粘らぬものの名稱で、二には稌といふがある。汜勝之は『三月稌稻

を種ふ、四月稌稻を種ふる』

といつてあるから、いづれも

稻なのである。陶氏が二種の

ものといつたのは蓋しわけが

判らぬ。



〔籼・粳・稻〕

—— 籼は粘る 粳は粘る 稻は粘る  
—— 籼は粘る 粳は粘る 稻は粘る

志曰く、ここに稻米とあるは糯米のことである。その粒の大小は秬米ほどのもの

で、糠が細く、雪のやうに白いものだ。今は稌、糯米の二穀を通じて稻と呼ぶので、稻

とは果してその孰れなるかに惑ふのである。按ずるに、李含光の音義には、字書を

引證して解釋し、粳の字をば『稻なり』といひ、三 稻の字をば『稻の屬なり、粘ら

ず』といひ、粳の字をば『稻餅なり』といつてある。粳とは蓋し糯米のことである。

禹錫曰く、爾雅に『稌は稻なり』とあり、郭璞の註には『別の二名である。今、三

沛國では稌と呼ぶ』とあり、周頌には『豊年黍稌多稌多』とあり、禮記には『牛

(二) 一書ニ稌ノ誤字  
トス。

(三) 沛國ハ今江蘇省  
徐州府ノ地ナリ。故  
城ハ沛縣ノ東ニ在  
リ。

は稌に宜し』とあり、てんぷう颶風には『十月稻を穫る』とあり、是等は一物である。説文には『稌は稻の屬であつて、沛國では稻を糯といふ』とある。字林には『糯は粘ねんたう稻なり、稌は不粘稻なり』とある。かやうに稌と糯とは甚だ相類するもので、粘ると粘らざるとの差異があるだけのものだが、説文に依つて稻を糯とすべきである。顔師古の刊謬正俗かんりやうせいぞくには『本草の稻米は今の糯米である。或は粳、糯を通じて稻と呼ぶ。孔子は、夫の稻を食ふといひ、周官には稻人なる官職があり、漢の時代には稻田使者なる官があつた。いづれも通じて稌、糯を指して言つたものだ。その結果後世の者が名稱を混同して、稻が糯であることが判らぬやうになつたのだ』とある。

宗奭そうしやく曰く、稻米とは現に造酒に用うる糯稻のことである。その性が温なるものだから酒になるのであつて、酒は陽である故に熱が多いのだ。西域、天竺の境土は溽じやく熱な處だから、一歳に四回熱する。やはり温、熱の關係を證するものだ。

時珍ときちん曰く、糯稻は南方で水田に多く種うゑる。その性は粘るもので、醸して酒にもなり、粢わうにもなり、蒸して糕かうにもなり、熟つて餠あひにもなり、炒つても食ふことがでさる。品種がやはり多く、その穀の殻には紅、白の二色があり、毛のあるものあり、

(自) 本村(康)曰ク、  
米ノ成分方表ノ如  
シ。

品 種	水 分	蛋白質	脂 肪	無窒素物	纖 維	灰 分
梗 玄 米	13.76	8.55	2.04	73.59	0.96	1.32
暹 羅 米	12.639	8.745	2.280	74.078	1.071	1.259
朝 鮮 米	13.934	7.929	2.143	73.166	1.324	1.504
糯	14.30	8.50	3.20	73.10	1.00	1.90

毛のないものもあり、その米にも赤、白の二色があつて、赤いものは醸せば酒が多くて糟が少ない。また粒が霜のやうに白く、長さ三四分あるものもある。齊民要術には、糯に、九格、雉木、大黃、馬首、虎皮、火色等の種目がある。古代には酒を醸すに多く糯を用ゐたのだ。そのために諸家の説に於て、糯稻の何物なるかに關し往往論辯を費されることとなつたのである。糯とは糯粟のことだ。記載はその本條にある。

## 稻米

### 氣 味

「苦し、温にして毒なし」 思邈曰く、味甘し。宗奭曰く、性

は温なり。頤曰く、糯米は性は寒である。作つた酒は熱である。糟となつたものは温、平である。やはり大豆と豉、醬とが性の同じからぬやうなものだ。洗曰く、三涼なり。風を發し、氣を動じ、人をして多く睡らしめる。多く食つてはならぬ。藏器曰く、久しく食すれば身體を軟ならしめ、筋を緩せしめる。小猫や犬が食へば、やはり脚が屈んで歩行し得なくなり、馬が食へば足が重くなり、妊婦が肉に難て食へば子が利せなくなる。蕭炳曰く、諸經絡の氣を擁し、四肢を收らなくし、風を發して昏昏たらしめる。士良曰く、久しく食すれば、心悸、及び癰疽、瘡癰中の痛を發する。酒と同時に食へば酔ふて醒め難い。時珍曰く、糯は性が粘滯で消化し難い。



小兒、病人は最も忌むべきものである。

〔七〕  
主 治

【飯にすれば中を溫め、熱多くし、大便を堅からしめる】〔別錄〕

【榮衛の中の血積を行<sup>や</sup>り、芫青、斑蝥の毒を解す】〔土真〕【氣を益し、泄を止める】

〔思邈〕【中を補し、氣を益す。霍亂後の吐逆の止まぬを止めるには、一合を水に研

つて服す】〔大明〕【駱駝脂で作つた煎餅を食へば痔疾に主效がある】〔齋齋〕【麋一斗を

作つて食へば消渴に主效がある】〔藏器〕【脾、胃を暖め、虛寒洩痢を止め、小便を縮

め、自汗を収め、痘瘡を發する】〔時珍〕

發 明

思邈曰く、糯米は味が甘い、脾の穀である。脾病にはこれを食ふが宜

し。楊士瀛曰く、痘疹に對して糯米を用ゐるのは、その解毒の功を利用するのであ

る。能く釀して發する力があるのだ。

時珍曰く、糯米は性が溫であつて、釀して酒にすれば熱となり、熬つて飴とした

ものは就中甚しい。故に脾、肺の虛寒の者には適當なものであるが、素から痰熱、

風病、及び脾病があつて、轉輸の作用の十分でない人がこれを食へば、最も能く病

を發して積となる。孟詵や蘇頌が、性涼なりとか、性寒なりなどいつてゐるが、謬

木村(康)曰ク、ソノ組成(%)精白米ニテ含窒素物七・五、五、含窒素物八、脂肪油一・二九、粗纖維〇・八八、灰分一、水分一三、玄米ニテハ水分一四・六、澱粉七五・七六、脂肪〇・三、糖分〇・四六、デキストリン一、纖維素〇・三〇・四、灰分〇・二九、灰分中 $\text{Ca}$ 〇・四〇一五〇、 $\text{K}$ 〇・二二二八、 $\text{C}$ 六〇一・五三、 $\text{O}$ 四一六・五等ノ他僅ニ砒素ニツケル、コバルト銅等ヲ含ム。芽胚ハ脂肪油三(%)ノ他「フィトステリン」「グアニン」「アデニン」「ヒポキサンチン」少量ノ「キサンチン」少量ノ「フィチン」少量ノ「メクレイン」「レチヤン」「レチ



チン」等ヲ含ム。

糖ハ「アデニン」<sup>一</sup>ヒヨリン<sup>二</sup>「ヒボキサンチン」<sup>三</sup>「フィチン」<sup>四</sup>「アミノ酸」<sup>五</sup>「ニコチン酸」<sup>六</sup>糖類<sup>七</sup>「ゲイタミン」<sup>八</sup>植物性鹽基物質<sup>九</sup>「オリジン」等ヲ含ミ、

「ヒスチジン」<sup>一〇</sup>トリプトファン<sup>一一</sup>等ハ之ヲ缺ク。

莖葉ハ蔗糖ト轉化糖ヲ有ス、又一〇〇瓦ノ生植物中ニハ十匙乾燥植物中ニハ八匙ノ碳素<sup>一二</sup>ヲ含ム。

(五) 大觀ニハ麥トアリ。

(六) 利セズトハ足カヨク利カヌコトナラシ。

(七) 木村(康)曰ク、

(應用) 本邦人ノ主食物トシテ重要ナルモノナルコトハ言チマズザレドモ、亦藥用トシテハ胸氣ニ有效

妄<sup>まう</sup>の説だ。別錄に已に『中を溫め、大便を堅くし、熱多からしめる』と謂つてある

ではないか、これを寒、涼といひ得るわけはあるまい。現に冷洩<sup>れいせう</sup>のものは炒つて食

へば止まり、老人の小便頻數のものは黍糕<sup>しかう</sup>にし、或は丸にして夜半に食へば止まる

といふことは一般に行はれてゐる事實であつて、これはその物が肺を溫め脾を暖め

るの實證である。痘證にこれを用ゐるのもやはりこの作用を利用するのである。

### 附方

舊五、新十六。

【霍亂煩渴<sup>くわくらんはんかつ</sup>】

煩渴して止まぬには、糯米三合、水五升、蜜

一合の研汁を分服し、或は煮汁を服す<sup>（楊氏產乳）</sup>「消渴飲水」方は上に同じ。【三種

の消渴病】梅花湯——糯穀を炒つて白花を出し、桑根白皮と等分を用ゐ、一兩づつ

を水二椀で煎じて汁を飲む<sup>（三因方）</sup>【下痢禁口<sup>げりきんこう</sup>】糯穀一升を炒り、白花を出して穀を

去り、薑汁を拌<sup>よ</sup>ぜ濕して再び炒つて末にし、一匙づつを湯で服す。三服で止まる。

（經驗良方）【久洩食減】糯米一升を水で一夜浸して瀝し乾し、慢かに炒り熟して磨り

篩ひ、懷慶の山藥一兩を入れ、毎早朝半盞に砂糖二匙、胡椒末少量を入れて極滾湯<sup>きまぐこんたう</sup>で

調へて食ふ。極めて美味で大いに滋補の功がある。久しく服すれば精が暖になり、子

を儲ける祕方である<sup>（松篁經驗方）</sup>【鼻衄<sup>びぞく</sup>の止らぬもの】藥を服しても反應なきには、

ナル「ガイタミン」<sup>B</sup>  
ハ製劑又神經榮養劑  
ナル「フイチン」製劑  
ヲ製ス。「ガイタミ  
ン」<sup>B</sup>製劑ナル「オリ  
ザニン」(三共)、「パ  
ラストラリン」(鹽野)、  
「ベリベロール」(ラ  
ザウム)、「ベリカイ  
ン」(帝國製藥)、「ベ  
リグミン」(小池)、  
「オルトベリン」(水  
野)、「ネチベリチン」  
(岸田)、「ガイタミイ  
ル」(田邊)、「ウリヒ  
ン」(松本)、「フルフ  
ルミン」(日本藥品)、  
「フアベリン」(福井)、  
「コルン」<sup>X</sup>(島居)、  
「アンチベリベリン」  
(南信堂)、「ミツホニ  
ン」(大日本製藥)、  
「ガイタベリン」(小  
島)、「ビソール」(黒  
田)、「スベルザン」  
(武田)、「オロベロ  
ン」(日本新藥)、「マ

獨聖散——糯米を微し炒つて黄にして末にし、二錢づつを新汲水で調へて服し、また少量を鼻中に入れる。(簡要濟衆方)「勞心の吐血」糯米半兩、蓮子心七箇を末にして酒で服す。孫仲盈は曾て用ゐて多く有効であつた。或は墨汁で丸にして服す」といつてある。(潛窓)「白汗の止まぬもの」糯米と小麦麩とを共に炒つて末にし、三錢づつを米飲で服す。或は煮た豬肉に點けて食ふ。「小便白濁」白糯米——夜間に小便が(二)脚停し、白濁するものを治す。この證は老人、虚せる人に多いもので、卒死することがあり、非常に精液を耗失し、主に頭が昏重するものである。糯米五升を炒つて赤黒くし、白芷一兩を末にし、糯粉糊で梧子大の丸にし、五十丸づつを木饅頭の煎湯で服す。木饅頭がなければ(二)局方の補腎湯で服す。また少年で體質の怯弱なものが、房事過度のために小便が過多になり、尿道が塞澀し、尿が膏脂のやうになつた場合には、石菖蒲、牡蠣粉を入れるが甚だ效がある。(經驗良方)【婦人の白淫】糙糯米、花椒等分を炒つて末にし、醋糊で梧子大の丸にし、三四十丸づつ食前に醋湯で服す。(楊起簡便方)「胎動不安」黃水を下すには、糯米一合、黃芪、芎藭各五錢を水一升で八合に煎じて分服する。(產寶)【小兒の頭瘡】糯米飯を灰に燒き、輕粉を

ルタミン（丸石）等。  
 フイチン製劑「フイチン（パーゼル）」「フエロフイチン（パーゼル）」「ユークリン」（三共）等。  
 （ハ）醸トハ化膿スルトノ意ナラン。  
 （九）新陳代謝ノ作用。  
 （一〇）脚停ハ停滯ヲ云フカ。  
 （一一）局方ハ和劑局方ヲ指ス。

（一二）大觀ニ吒ニ作ル吒ハ噴ナリトアリ、類ノ腫レルヤマヒナラン。

入れ、清酒で調へて傳ける。（普濟方）【纏蛇丹毒】糯米粉と鹽を囓かんで塗る。（濟急方）【打撲傷損】諸瘡には、寒食の日に糯米を浸し、小満の日まで毎日水を易へ、取出して日光で乾して末にし、水で調へて塗る。（便民圖纂）【金瘡、癰腫ようしゅ】及び竹木、簽せん刺等の毒には、糯米三升を端午から四十九日前の日から冷水に浸し、一日に二回水を換へ、攪き廻して碎かぬやうにして淘たうり出し、端午の日に取り出して陰乾し、絹袋に盛つて風の通る場所に掛け、使用せんとする際に少しづつ出して黒く炒つて末にし、冷水で調へて膏藥のやうにし、瘡の大小に随つてそれで瘡口を裹つつみ固め、その外から布で動かぬやうに包み縛り、そのまま瘡の癒えるまで置く。○金瘡の場所は、生水に觸れば化膿して甚しく腫れるものである。急に裹んで一二時間すれば膿腫をなさぬ。癰疽ようしゅならば、纔に癰腫ようしゅを覺える初期に急に貼れば一夜で消する。（靈苑方）【喉痺ごび 吐腮ひさい】前記の膏を項下、及び腫處に貼れば一夜で消する。乾けば換へて常に濕を有たせて置くやうにするが妙である。【竹木簽刺】前記の膏を貼れば一夜で刺さがその膏藥の中へ出る。【狂犬の咬傷】糯米一合、斑蝥はんめう七箇を共に炒り、蝥が黄になつたとき取去り、再び七箇を入れて炒り、黄になつたとき取去り、又七箇を

入れて米から烟が出るやうになつたとき螯を取去り、その米を末にして油で調へて傳ける。小便が利下して好果を舉げる。（醫方大成）【饑饉ききんの際の代用食糧】稻米一斗

を淘り、百回蒸し百回曝して搗いて末にし、日毎に食事を朝食の一回に止めて、これを水で調へて服す。三十日間服して止めれば一箇年間食物を攝らずに生存し得る。

（肘後）【虚勞の不足】糯米を猪肚の中に入れて蒸し、乾して搗いて丸にし、日毎に服す。【腰痛虚寒】糯米二升を炒熟して袋に盛り、痛處に縛り付けてもた靠れ、内服には八角茴香はつかうゐさやうを酒に研つて服す。（談楚翁試驗方）

### 米泔

氣味

【甘し、涼にして毒なし】

主治

【氣を益し、煩渴、霍亂を

止め、毒を解す。あふにぐ鴨肉を食つて消化せぬには、頓に一盞を飲めば消化する。（時珍）

附方

舊一。

【煩渴して止まぬもの】糯米泔を任意に飲めば定まる。研汁も

よし（外臺）

### 糯稻花

主治

【陰乾し、牙に揩すつて鬚を黒くする方に入れて用ゐる】（時珍）

### 稻稬即ち稻稈

氣味

【辛く甘し、熱にして毒なし】

主治

【黃病で金

のやうな色になるものには、煮汁に浸し、また穀芒こくぼうを黄に炒つて末にして酒で服す】

〔戴器〕【焼灰は墜撲傷損を治す】〔蘇頌〕【焼灰を水に浸して飲めば消渴を止める。淋汁で腸痔を浸す。穰じやうをあんで靴の底に敷けば、足を暖め、寒濕氣を去る】〔時珍〕

發明

頤曰く、稻稈灰ちやかんぐわいの方は劉禹錫の傳信方に出てゐる。それに依ると『湖南の李從事が落馬して傷損した際、稻稈焼灰を、新熟酒を糟のまま鹽を入れ和したもので灰の淋汁を取り、それを患部に淋したところ立ろに癒えた』といふ。

時珍曰く、稻稈は煮て加工して紙に作り、嫩心なんしんをば取つて〔三〕襪あひに作る。いづれも産業を裨補するものだ。その紙は瘡に貼つてはならぬ。能く肉を爛らすものである。按ずるに、江湖紀聞に『ある人が、壁虱へきしつが耳に入つて忍び難く頭痛し、あらゆる薬も效かなかつたが、稻稈灰の煎汁を灌さそぎ入るとその蟲が死で出た』とある。

附方

舊一、新八。

【消渴飲水】稻稈の中心を取つて灰に焼き、一合を湯に浸し

て澄清ちやうせいして飲む。〔危氏〕【喉痺腫痛】稻草を焼いて黒烟を取り、醋で調へて鼻中に吹

き入る。或は喉中に灌こんぎ入れば痰を滾出こんしゆつして立ろに癒える。〔普濟〕【熱病の餘毒】手

足を攻めて脱けるほど疼痛するには、稻稈灰の煮汁に漬ける。〔肘后方〕【下血で痔と

なつたもの】稻稈ちやかんの焼灰で淋汁を取り、熱して三五回漬ければ瘥える。〔崔氏纂要〕【湯



火傷瘡」稻草灰を冷水で七回淘り、灰を帯びて上に攤し、乾けば易へる。もし瘡が濕ふものならば、焙じ乾して二三回油で傅ければ癒える。(衛生易簡方)「惡蟲の耳に入つたとき」香油と稻稈灰汁を合せて滴し入る。(聖濟總錄)「噎して食物の通らぬもの」赤稻の細稍を灰に焼き、滾つた湯一碗で絹を隔て三回に淋汁を取り、丁香一箇、白豆蔻半箇、米一錢を入れ、粥に煮て食ふが神效がある。(摘玄秘方)「小便白濁」糯稻草の濃煎汁を一夜露して服す。(同上)「砒石の毒を解す」稻草の燒灰の淋汁で青黛二錢を調へて服す。(醫方摘要)

## 穀類

穀芒のことである。稔と書くは誤りだ。

## 主治

【黃病には、末にして酒

で服す。又、蠱毒を解するには煎汁を飲む】(日華)

## 糯稭

## 主治

【齒の黃色なるには、焼いて白灰を取つて毎朝擦る】(時珍)

## 二 粳

音は庚(カウ) (別錄中品)  
である。

和名 いれ、うるし  
學名 *Oryza sativa*, L.  
科名 禾本科

## 釋名

## 杭

粳と同じ。時珍曰く、粳とは穀稻の總名であつて、收穫時期に於

(一)牧野云フ、いれノ最モ普通品デ吾人が日常ノ食品デアル即チうるしれア之レチもちごめト分ツテキル、もちごめハタダ餅ニ造リ毎日ノ食



料ニハシナイ。早稻ハなかにデ水田ニ作ラズ乾地ニ耕作シテキル一品デアル。

(二) 廩ハ米藏ヲ云フ、廩米ハ貯藏米ノコト。

(三) 酒ハ草部山草類徐長卿ノ註ヲ見ヨ。  
(四) 襄洛ハ襄州ヨリ北ニ洛水流域ノ地ヲ指ス。

(五) 畚田ハ地ヲ治メテ二歲サ云フ、新田ヲ云フ。

て早、中、晩に別れてゐる。諸家の本草に、獨り晚稻のみを粳としてあるは正しくない。粘るものは糯、粘らぬものが粳であつて、糯は糯であり、粳は硬である。ただし解熱薬に入れるは晚粳が良いとなつてゐるのだ。

### 集解

弘景曰く、粳米は今一般の常食となつてゐる米である。但し白、赤、小、大があり、種類の異同で四五種あるが、やはり大體に於て一類である。廩米として貯藏に堪へる。洗曰く、淮、酒の地方に最も多く、襄洛の土地に産する粳米も堅實で香しい。南方の地で多く收穫する水稻は最も人體に補益がある。諸處に粳米を多く産するが、ただ饑を充てるだけのものだ。

時珍曰く、粳には水、早の二稻があつて、南方は土地が下くして塗泥が多いから水稻に適し、北方は土地が平でただ澤土だから早稻に適する。西南の蠻夷地にも山地を焼いて畚田にして種ゑる早稻があつて、火米と稱してゐる。古代に於ける稻の耕作方はただ畦にし耕してそれに種を蒔いたもので、それゆゑに祭祀には稻を嘉蔬といつたのである。しかし今は一般に皆秧を抜いて挿んで栽ゑることになつてゐる。その種類百に近いほどあつて、それぞれ特異點を有つてゐるが、いづれも産

〔七〕本草原始ニ青ニ作ル。

〔七〕眞臘ハ石部鹵石類戎鹽ノ註ヲ見ヨ。

地の地質、氣候等の關係に隨ふのであつて、その穀の尖芒せんぼうにも長さ短きと、太きと細きと種種ささざまであり、その米にも、赤あり、白あり、紫あり紫、黒あり、堅きあり、鬆やはらかきあり、香あるとなきと等の差異があり、その性にも温、涼、寒、熱があり、やはり産地の諸種の條件に因つて異なるのである。〔七〕眞臘しんらんにある水稻は高さ一丈ほどになつて、水の深淺に隨つて成長する。また南方には一年に二回熟する稻もある。蘇頌そうがいふ、香粳かうかうの長くして玉の如く白く、天子の供御の御料に充あつべきものといふも、やはり粳にしてやや特異點を有つたものである。

## 粳米

氣味

〔甘く苦し、平にして毒なし〕思邈しひやく曰く、生のものは寒である。

燐やいたものは熱である。時珍しちん曰く、北方産の粳は涼である。南方産の粳は温である。赤粳は熱である。白粳は涼である。これを修治するには雞屎白けいしはくを用ゐる。○穎えい曰く、新米を早速食へば風氣を動ずる。陳ちんいものは氣を下し、病人には尤も宜し。洗せん曰く、乾粳飯を常食すれば、中を熱して唇口が乾くやうになる。馬肉と共に食へば、痼疾こじきを發するから食つてはならぬ。蒼耳そうじを和して食へば、卒心痛を發すから食つてはならぬ。その場合は急にえん倉米を焼いて灰にし、蜜、漿で和して服する。

〔八〕乾粳飯ハホシイヒノコトナラン。

〔九〕倉米ハ玄米ノコトカ。

さなくば死亡する。

### 主治

【氣を益し、煩を止め、渴を止め、洩を止める】（別錄）【中を溫め、胃氣を和し、肌肉を長ずる】（蜀本）【中を補し、筋骨を壯にし、腸、胃を益す】（日華）【煮汁は心痛に主效があり、渴を止め、熱毒下痢を斷つ】（孟詵）【芡實と合せて粥にして食へば、精を益し、志を強くし、耳を聰くし、目を明にする】（軒古）【血脈を通じ、五臓を和し、顔色を好くする】（時珍）養生集要に記載がある。【乾粳飯を常食すれば噎せなくなる】（孫思邈）

### 發明

説曰く、粳米の赤いものは粒が大きくて香しく、水に漬ければ味があつて健康を益す。概して新たに熟したばかりのものは氣を動じ、<sup>(二〇)</sup>年を経たものもまた病を發するものである。ただ江南地方で多く收穫する米稻は、一旦倉庫に貯へて置いてから<sup>(二一)</sup>毛を燒き去り、春になつてから米を舂いて食ふので、病を發せず、健康に適し、中を溫め、氣を益し、下元を補するのである。

宗奭曰く、粳は白晩米を以て第一とし、早熟米はそれに及ばない。五臓を平和にし、<sup>(二二)</sup>血氣を補益するその功はこれに逮ぶものはないのであるが、しかし、やや生

(二〇)大觀二年上ニ再ノ字アリ。

(二一)大觀ニ毛ヲ芒ニ作ル。

(二二)大觀ニ血ヲ胃ニ作ル。

のものではやはり脾を益するところがない。よく熟して始めて佳いのである。

穎曰く、粳はその收穫期に依つて早、中、晩の三種に別け、晚白米を以て第一とする。各地方に依り、その産するものに種類が甚だ多く、随つて氣味にも少しの差異は免れぬのであるが、やはり大差はないのである。天の五穀を生ずる所以は人を養ふに在るのであつて、人はこれを得れば生を保ち、これを得なければ死亡するのである。この穀だけは天地中和の氣を得て造化生育の功に同じきものだから、その點に於て到底他の物の比すべきものではないのである。薬に入れての功は略しても差支ないであらう。

好古曰く、本草には『粳米は脾、胃を益す』とあるが、張仲景の白虎湯びやくこたうはこれを用ゐて肺に入るのである。これは、味の甘は陽明の經に屬し、色の白は西方の象であつて、氣の寒は手の太陰に入るのである。小陰の證に用ゐる桃花湯はこれを用ゐて正氣を補し、竹葉湯はこれを用ゐて不足を益する。

時珍曰く、粳稻は、六七月に收穫するものを早粳といふ。これはただ食料に供するだけのものだ。八九月に收穫するものを遲粳ちかうといひ、十月收穫するものを晚粳と

(三)五戸ハ飛戸、通戸、泥戸、風戸、伏戸ニシテ皆風邪ノ氣ヲ祛ミ、身體ニ滲注シテ人ヲシテ寒熱淋瀝、精神錯雜、積年異月漸々頓滯ニ至

いふ。北方の地は氣候が寒いから粳の性が多くは涼であつて、八九月に收穫したものでも藥に入れ得るが、南方の地は氣候が熱いから粳の性が多くは温である。ただ十月の晚稻晩入たうだけが氣が涼であつて藥に入れ得るのである。遅粳と晚粳とは金の氣を多く受けてゐる。故に色は白く、肺に入つて熱を解す。早粳は土の氣を多く受けてゐる。故に色の赤きは脾を益し、白きは胃を益する。滇てん、嶺の粳の如きは性は熱であるが、これは彼の地に於てのみのことで他の地には適用されぬことだ。

# 附方

舊二、新十。【霍亂吐瀉】煩渴して絶命せんとするには、粳米二合を粉に

研り、水二盞を入れて汁に研り、淡竹瀝たんちゆくれき一合を和して頓服する。(普濟) 【赤痢熱躁】

粳米半升を水で研つて汁を取り、油瓷瓶ゆじへいに入れて蠟紙で口を封じ、井底に一夜沈めて翌早朝に服す。吳内翰の家の乳母がこの病の時、これを服して效があつた。(普濟方)

【自汗の止まぬもの】粳米粉を絹に包んで頻頻と撲つ。(肘後) 【五種のここ戸病しびやう】粳米二升

を水六升で煮て一沸し、一日三回に服す。(肘後) 【突然の心臓の氣痛】粳米一升を水

六升で煮て六七沸して服す。(肘後方) 【米癢べいで米を嗜むもの】好んで米を嘔かみ、それ

が久しく経てば癥しやうとなり、米を嘔まねば清水を吐出し、米を嘔めば止まるといふも



リ以テ死ニ至リ、復  
傍人ニ易シテ滅門ニ  
至ル、證候病候論ニ  
詳ナリ。

(四)甜瘡ハ顔面水泡  
瘡ヲ云フ。

のがあるが、その米は消化せずして久しきに互れば死亡するものである。これには、白米五合、雞屎けいし一升を共に炒り焦して末にし、水一升で頓服する。少時して瘰を吐出する。それは研米汁、或は白沫、淡水のやうなものだ。瘰はそれで癒える。(千金方)

【小兒の初生】三日にして腸、胃を開いて穀神を助くべきものである。米を碎いて濃き汁にし、乳酪を飲ませるやうに、豆ほどづつを頻りに生兒に與へて飲ませる。

二週間はこれを與へるがよし。絶対に雜藥を與へてはならぬ。(肘後方) 【初生兒の皮無きもの】色が赤く、ただ紅い筋あかの現れてゐるのは、受胎後また日が足らぬのであ

る。早白米粉を撲てば肌膚が自から生ずる。(聖濟方) 【小兒の(四)甜瘡】顔や耳に生じ

たるには、母をして頻りに白米を嚼かんで就寢時に塗らす。三五回に過ぎずして癒え

る。【凶作の際の辟穀法】粳一升を酒三升に漬けて暴乾し、又は酒に漬けて浸して取

出し、少しづつ食へば穀を辟さけ得るものだ。三十日間に一斗三升を完全に食へば一

年間穀を辟け得る。(肘後方) 【胎動の腹痛】急に黃汁を下すには、粳米五升、黃芪わうぎ六

兩を水七升で二升に煎じ、四回に分服する。(聖惠) 【赤根丁腫】白粉を黒く熬り、蜜

で和して傳ける。(千金方)



浙二泔

釋名

米泔

時珍曰く、浙の音は錫（セキ）であつて、洗米である。

泔は汁であつて泔は甘汁である。第二回目の洗ひ汁は清くして用ゐ得るところから浙二泔といふのである。

氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【熱を清し、煩渴を止め、小便を

利し、血を涼す】（時珍）

發明

戴原禮曰く、風熱赤眼には、睡らんとする時、浙二泔で洗肝散、菊花

散の類を冷調して服す。

附方

新四。

【吐血の止まぬもの】

陳紅米の泔水を一日三回づつ一鍾を溫服

する。（普濟方）

【衄血】頻りに浙二泔を飲み、同時に眞麻油、或は蘿蔔汁を滴し入る。

（證治要訣）

【酒瘡】浙二泔を食後に冷飲し、外部には硫黃を大菜頭の内にに入れて煨き

碾つて塗る。（證治要訣）

【服藥過劑】悶亂するには、粳米泔を飲む。（外臺）

炒米湯

主治

【胃を益し、濕を除く。火毒を去らねば渴を作させる】（時珍）

粳穀奴

穀穗煤の黒いものである。

主治

【走馬喉痺には、燒き研つて酒で

方寸匕を服す。立るに效がある】（時珍）千金方に記載がある。

禾稗 主治 『砒毒を解す。灰に焼き、新汲水で淋汁を取り、濾し清めて一椀

を冷服す。毒が下出するものである』(時珍) 衛生易簡方に記載がある。

秬

(一) 音は仙(セン) (綱目) 和名 たいとういぬめ  
である。

學名 *Oryza sativa*, L. var.  
科名 禾本科

釋名 占稻(綱目) 早稻 時珍曰く、秬といふも粳の屬で、先に熟して鮮明

なものである。故にこれを秬種(せんしゆ)といひ、(二) 占城國(せんじやうこく)から輸入したものだから占  
といふ。俗に占を粘(ねん)と書くは正しくない。

集解 時珍曰く、秬は粳に似て粒が小さい。閩地方(もん)の者が占城國から種を輸

入したことが中國にある始であつて、宋の眞宗の時、使を閩に遣して三萬斛を徵收  
し、それを諸道に分配給與して種とした。それで現に各處いづれにもあるものであ  
る。高仰の土地には何處でも栽種し得るもので、その熟する時期が最も早く、六七  
月には收穫し得る。種類も多く、赤白の二色があつて、粳と大同小異である。

秬米 氣味 『甘し、溫にして毒なし』 主治 『中を溫め、氣を益し、胃

(一) 牧野云フ、たい  
たうごめハ大唐米ノ  
意デアル、米ノ品質  
ハ良好デサク其色ニ  
赤イモノガアル、米  
粒ハ普通ノ米ヨリハ  
小サイ、又たいまい  
或ハたいトモ呼バル  
ル。  
(二) 占城國ハ金部金  
ノ註ヲ見ヨ。

を養ひ、脾を和し、濕を除き、洩を止める」(時珍)

稗 主治

【反胃はんゐには、燒灰の淋汁を溫服して吐かす。蓋し胃中に蟲あるを能く殺す】(普濟)

本草綱目穀部第二十二卷 終



本草綱目穀部

第二十三卷





本草綱目穀部目錄第二十三卷

穀の二 稷粟類十八種

稷 別錄

黍 別錄

蜀黍 食物

玉蜀黍 綱目

粱 別錄

粟 別錄

秬 別錄

糝子 救荒

稗 綱目

狼尾草 拾遺

東廬 拾遺

菰米 綱目

蓬草子 拾遺

蒺藜子 拾遺

蒺藜子 海藥

薏苡 本經

罌子粟 開寶 即ち御米、麗春花。

阿芙蓉 綱目

右附方 舊二十七、新五十三。




穀の二 稷粟類十九種

(二) 稷

(別錄ニ上品)

和名 きび(うるしきびノ方)  
學名 Panicum miliaceum, L.  
科名 禾本科

(一) 牧野云フ、きびハ一名チこきびトモ云フ、此レニ甚麤ノ粘<sup>ネ</sup>バ<sup>ネ</sup>モ<sup>ノ</sup>ト然ラザルモノトアル、木條ノ稷ハ其粘バラヌ方ノモノヲ指ス。  
(二) 大觀ニ下ニ作ル。



〔黍 稷〕

——うるす粘は黍・ザネ粘は稷——

**釋名** 稷 音は祭(サイ)である。黍 音は咨(シ)である。時珍曰く、稷の字は禾に從ひ𦵏(音は即(ソク))に從ふ諧聲であつて、努力して稼植の業に従事するの意味である。詩に「𦵏𦵏たる良耜」とあるはそれであつて、稷を栽培する者は必らず𦵏𦵏として努力するといふのである。南方の地では北方の發音を承けて、稷を呼ぶに稌といふ。その米は祭祀に供へるものだとの意味を含ませたのだ。

禮記に、宗廟を祭る稷を明粢（ミヤヒ）といひ、爾雅に『粢は稷なり』とあり、羅願は『稷、稌、粢いづれも一物であつて、その發音により輕、重があるだけだ。赤いものは麋（ミ）と名け、白いものは𦵏（キ）と名け、黒いものは秬（キ）と名ける』といつてある。その註解は黍（シ）の條下に記載する。

### 集解

弘景（ミ）曰く、稷米なるものは、世人は一向に識らぬが、書、記に多くいつてある黍は稷と相似たものだ。又、黍米の註解にいふ稌米は黍米と相似てゐるが、際立（キ）つて大きいものだ。これを食料とするは健康に適しない。それは宿病（キ）を發するものだからである。詩には、黍、稷、稻、粱、禾、麻、菽、麥を八穀と稱へてあるが、俗間ではそれさへ明確に識別するものがないのである。況や芝、英などいふものに至つては申すまでもない。

蘇恭（ミ）曰く、呂氏春秋に『飯の美なるものに陽山の稌あり』とあり、高誘の註に

『關西ではこれを麋——音は麋（ミ）——といひ、冀州ではこれを麋——音は牽

（ケン）の去聲——といふ』とある。廣雅には『麋は稌なり』とある。禮記には、稷を明粢といひ、爾雅には『粢は稷なり』とある。説文には『稷といふは五穀の長で

（ミ）芝、英トハ仙藥トスル五芝ト石英トヲ指ス。

（ミ）陽山、呂氏春秋卷十四、木味篇ニ飯之美者。玄山之禾。不周之梁。陽山之稌。南海之秬トアリ、高氏ノ註ニ山南曰陽。

崑崙之南。故曰陽山。  
 南海南方之海』トアリテ一見南海ノ崑崙即チ馬來地方ノ如クナレドモ、更ニ南海ノ和ヲ列シアルニ觀レバ或ハ山海經ノ崑崙之邱ヲ指スニハアラズヤトモ思ハル。崑崙之邱ハ畢氏ノ考證ニ據レバ今ノ甘肅省肅州ノ南八十里ニ在リトイフ。楊氏漢地理圖ニハ祁連山脈中ノ歐西喜山ヲ崑崙山ト指定ス。然ラバ此ニイフ陽山ハ祁連山脈ノ南青海省ノ北部一帯ノ地ヲ指スモノカ。  
 (五) 關西ハ禽部水禽類爲ノ註ヲ見ヨ。  
 (六) 冀州ハ水部井泉水ノ註ヲ見ヨ。  
 (七) 楚ハ湖北地方。關中ハ山草類淫羊藿ノ註ヲ見ヨ。

ある』とあり、註に『田でんの正せいなり』とある。これで見ると官名であつて穀物の名稱ではないのである。既往の學者は、稷を以て粟の類とし、或は粟の上なるものといつてゐるが、いづれもその意味に關する説明のみで、その實物をば知らなかつたのだ。按ずるに、汜勝之の種植書には、黍は擧げてあるが稷の説明はなく、本草には、稷は擧げてあるが稷は記載してない。稷とは稷のこと、楚その地方では稷といひ、關中くわんちゆうでは麋へといひ、その米を呼んで黃米といふ。その苗が黍と類を同うするところから黍を呼んで秬せんべいといふのである。陶氏が『黍と相似たもの』といつたのは當を得てゐる。

藏器そうき曰く、稷、稌は同一物である。（そ）塞北さいほくに最も多く、色は黍のやうに黒いものだ。

説つ曰く、稷は八穀の中の最下の作物で、黍とは酒に作るもののことだ。これ等のものは飯にする穀物とは用途が異ちがふ。

頤い曰く、稷米は、粟を産する地方ではいづれも能く種植する。今は一般にあまり珍重されず、ただ祭祀の供物に用ゐる、農家でも他の穀物の稌とれぬ場合の豫備食糧と

（八）稷ハ黍ノ誤。  
（九）粟北ハ粟古地  
方。

するに過ぎない。

宗○夷曰く、稷米は今は稌米と稱へる。諸種の穀米に先じて熟し、その香がよいところから、特にこれを祭祀の供物にするのだが、しかしこれは故い病を發するものだ。飯にもなるが、粘りがなく、味が淡い。

時○珍曰く、稷と黍とは一類の二種であつて、粘るものが黍、粘らぬものが稷である。稷は飯になり、黍は酒に釀し得る、稻に粳と糯とがあるやうなものである。陳藏器は黑黍のみを指して稷としたが、やはり偏してゐる。稷、黍の苗は粟に似て低く小さく、毛があり、結子は枝になつてまばらに散り、粒は粟ほどのもので光があつて滑だ。三月種を下し、五六月に收穫する。また七八月に收穫するものもある。

その色には赤、白、黄、黒の數種あつて、黒いものは禾がやや高い。今は俗に通じて黍子と呼び、稷とは呼ばない。北方の國境地方は土地が寒く、そこに種ふたものには補の效果がある。（一〇）河西の産は顆粒が就中硬い。稷は熟することが最も早く、飯にすればさつぱりして香美であり、五穀の長として土に屬するものだ。故に穀神を祀るときに稷を以て社に配するのであつて、五穀の悉くを供へて祭ることは六ヶ

（一〇）河西ハ今ノ陝西  
省ノ北半。



敷いからその長たるものを供へ、それで他の穀をも代表したわけである。上古には  
厲山氏の子孫を稷主の職に置いたが、成湯の時になつて始めて后稷こうしやくに易へた。いづ  
れも農事に精通し功勞あつたものなのである。

正誤

吳瑞曰く、稷は、苗が蘆に似て粒もやはり大きく、南方の地では蘆稌ろさ  
と呼ぶ。孫炎の正義には『稷は粟なり』とある。

時珍曰く、稷、黍の苗は頗る粟に似てはゐるが、結子が異ふ。粟は穗むらぎが叢り密集  
し、稷黍は粒毎にまばらに散つて枝になつてゐる。孫氏が稷を粟といつたのは誤  
だ。蘆稌といふは蜀黍のこと、その莖、苗は高く太く、蘆のやうなものだ。今の  
祭祀さいしを行ふものは、稷とは黍の粘らぬものなることを知らずして、往往にして蘆稌  
を稷といつてゐるところから、吳氏もその誤のまゝを踏襲たふしふしたのだ。ここにいづれ  
も是正して置く。

稷米

(二) 氣味

『甘し、寒にして毒なし』  
洗曰く、多く食べば二十六種の  
冷病の氣を發する。瓠子こしと共に食つてはならぬ、冷病を發するものだ。但し黍稷汁とふじやうじふ  
を飲めば瘥える。又、附子ぶしと共に服してはならぬ。

主治

『氣を益し、不足を

(一) 水村(康)曰く、  
(穀) 粟(實)ノ類、  
(性) 寒、  
(功) 附子・八九、  
(ア) ロイシン (含窒  
素物) 一〇・六、無窒

素物六一・一一、粗  
纖維ハ・〇七(精白セ  
ラレザルモノ)、灰分  
三・八二、水分一二・  
五、内澱粉ハ凡ソ六  
〇・二ヲ占ム、糖〇・  
五、又「デキストリ  
ン」一・二%ヲ含ム。  
(應用)稷ハ民間ニテ  
眼病ニ煎用シ、飯ト  
シ粥トシ團子等トモ  
ナシ食用トス。又酒  
或ハ焼酎ヲ製ス。

補す』(別錄)【熱を治し、丹石毒發の熱を壓し、苦瓠の毒を解す】(日華)【飯にして食へば、中を安じ、胃を利し、脾に宜し】(心鏡)【血を涼し、暑を解す】(時珍) 生生編に記載がある。

### 發明

時珍曰く、按ずるに、孫真人は「稷は脾の穀であつて、脾病にはこれを食ふがよし」といひ、汜勝之は「黍、稷を焼けば瓠が枯れる。これは物の性が相制するのであつて、稷米、黍稷は能く苦瓠の毒を解すものだ」といひ、淮南萬畢術には「祠塚こちようの黍を兒に啖はせれば母を慕はなくなる」とある。これはやはり厭まだなひの力があるものと見える。

### 附方

新四。【中を補し、氣を益す】羊肉一脚を湯に熬り、河西の稷米、葱、鹽を入れて粥に煮て食ふ。(飲膳正要)【卒そつ嘔えんの止まぬもの】稷米粉を井華水で服するがよし。(肘後)【癰疽發背】稷米粉を黒く熬り、雞子白で和して練絹に塗り、孔を剪つて貼り、乾けば易へる。神效がある。(葛氏方)【瘟疫えんえきの辟除】感染を防ぐには、稷米を末にして頓服する。(肘後方)

### 根 主 治

【心氣痛、産難】(時珍)

附方

新二。

【心氣疼痛】高粱<sup>かうりやうこん</sup>根の煎湯を溫服するが甚だ有效である。【横

産、難産】重陽の日に取つた高粱根を瓜龍<sup>くわりう</sup>と名ける。これを陰乾し、焼いて性を存して研末し、酒で二錢を服すれば分身する。

黍

(別錄中品)

和名 きび (もちきび)

學名 *Panicum miliaceum*, L.

科名 禾本科

校正

別錄中品の丹黍米を本書には一條に併記した。

(一) 牧野云フ、元來前條ノ品ト同種デアレドモ此レハ其穀ノ粘バルモノデアル、故ニもちきびノ名ガアル。

釋名

赤黍<sup>せきしよ</sup>を

麴

音は門(モン)

といひ、麴

音は麴(キョ)

といひ、

白黍を

音は起(キ)

といひ、黑黍を

秬

音は距(キョ)

といひ、一稊

二米を

音は疋(ヒ)

といふ。(いづれも爾雅)

時珍曰く、按ずるに、許慎の

説文には『黍は酒に作れるものだ。禾に従ひ、水に入るの意味を表した文字である』

とあり、魏子才の六書精蘊には『禾の下を尗に従ひ、細粒が散垂する状態を形象したものだ』とある。汜勝之は『黍は暑であつて、暑を待つて生じ、暑後に成熟するものだ』といひ、詩には『誕<sup>たは</sup>いに嘉種を降す、維<sup>こ</sup>れ秬、維<sup>こ</sup>れ秬、維<sup>こ</sup>れ麴、維<sup>こ</sup>れ麴、維<sup>こ</sup>れ麴、維<sup>こ</sup>れ麴』

とある。麩とは麩の發音の轉じたものだ。郭璞は、麩、芒を梁粟とし、秬を黑黍の二粒の米を生ずるものとし、羅願は、秬を來牟としたが、いづれも正しくない。

### 集解

(一) 荆鄆ハ荆州、鄆州。荆州ハ縣鄆縣縣鄆縣ノ註チ見ヨ。鄆州ハ西魏ニ置キ、唐ソレニ因ル。今ノ湖北黃陂縣治ナリ。又、南宋ニ置キ、隋ニ廢シタル鄆州ハ今ノ湖北省武昌縣治ナリ。弘景ハ後者ニ據レルナルベシ、即チ荆州ノ鄆州ナリ。

(二) 汴洛ハ草部芳草類ノ香薷ノ註、河陝ハ周山經類述志ノ註チ見ヨ。  
(三) 上黨ハ石經長石ノ註チ見ヨ。

弘景曰く、黍は三荆鄆州、及び江北でいづれも種ふる。その苗は蘆のうで粟とは異ひ、粒も大きい。今一般に秬粟を黍と呼んでゐるが、誤だ。北方地方で作る黍飯、方薬に醸す黍米酒はいづれも秬黍である。別錄にある丹黍米といふは赤黍米のことで、やはり北方の地に産する。江東にも時にあるが、土地が適しない。多く補薬に入れて用ゐる。又、秬と名ける黑黍があつて、それは酒を醸して祭祀に供するに用ゐる。

恭曰く、黍には數種あるが、その苗はやはり蘆には似てゐない。粟に似てゐるけれども粟ではない。

頌曰く、今は汴洛、河陝地方でいづれも種ふる。爾雅に『麩は赤苗、芒は白苗、秬は黑黍』とあるそのものだ。李巡は『秬とは黑黍のうちの一箇の稔の中に二箇の米のあるものことだ。古代には、上黨の秬黍の標準的に正しく平均したものゝを異ねて、一般に物を計る標準を制定したもので、度量衡の制度はそれから發

生したものが、後世ではこの黍を標準にしようとしても、終に正確に度量衡に合はぬやうになつて了つた』といつてある。或は『きふ種といふは黍の正しく平均したもの』のことで、一箇の稗に二箇の米がある黍である。この黍は天地中和の氣を得て生ずるもので、蓋し普通にあるものではない。この黍があれば一穗すくがみな同じく二米のもので、粒はいづれも平均して大小の差がない。それゆゑに物を計る標準となるのである。他の黍ではさうは行かぬ。土地には肥えたと瘠せたとの差があり、歳には凶作と豊作とがあるから、米も大小の差が生じて一定せぬ。現に上黨の民間では、豊作の歳に往往二米のものを得ることがあるが、但しそれは極めて稀で、收穫が當てにならぬから貢納品には充てないのだ』ともいふ。

時珍曰く、黍とは稷の粘ねんするものゝことで、やはり赤、白、黄、黒の數種あり、その苗の色はやはり數種に別れてゐる。郭義恭の廣志には、赤黍、白黍、黄黍、大黑黍、牛黍、燕あん領りやう、馬草、驢皮、稻尾などの諸名稱が記載されてあつて、いづれも三月に種こふるものは上時といつて五月に熟し、四月に種ふるものは中時といつて七月に熟し、五月に種ふるものは下時といつて八月に熟する。詩に『きんぐわういちちやう秬一亩』とあ



るところを見ると、黍で酒を造つた事實は古いものだ。白いものは糯に亞ぎ、赤いものは最も粘る。蒸して食料になり、いづれも餠ちひを作る材料になる。古代に黍を以て屨を粘し、黍を以て桃を雪つたといふは、いづれもその粘る點を利用したものである。菰葉こふで裹んで糲そうにし、それを角黍と呼んで食ふ。淮南萬畢術には『黍を糲さつて溝に置けば鱉はつが生ずる』とある。

**正誤**

頌曰く、粘するものは秬であつて、酒を釀し得るものだ。北方では黄米と呼び、また黄糯ともいふ。粘せぬものは黍であつて、食料となる。稻に粳と糯があると同様だ。

時珍曰く、これは誤つて黍を糲とし、秬を黍としたものだ。蓋し糲ねはの粘るものが黍であり、粟の粘るものが秬であり、粳の粘るものが糯であることは、別録の本文に黍、秬、糯、稻の性味功用を著録されあつて甚だ明である。しかるに註釋者がそれを熟讀せずして、往往かやうな誤謬ごせうに陥つてゐるのだ。今俗間ではその區別が明でなく、秬と黍とを通じて黄米と呼んでゐる。

**黍米**

ここには通じて諸種の黍米を指す。

**氣味**

【甘し、溫にして毒なし。



(成分) 精白穀粒ノ乾燥物質中ニハ「デキストローゼ」五%、「デキスリン」〇・二六、澱粉七六・脱穀セザルモノニテハ糖四・〇八、「デキスリン」〇・九六、澱粉六〇・三四、一般組成ハ前者ト同ジ、以上ハ外國産ニ就テノ説。本邦産ノモノハ水分一三・六、蛋白質一〇・六、脂肪一〇・三七、無窒素物六九・七、粗纖維〇・九一、灰分一・八〇、灰分中ニハ硅酸五六%、磷酸一八等ヲ含ム。(應用) 果實ハ精氣多キ故ニ主トシテ饅トナシ、又糊ヲ製ス。

(二) 陰易ノ解、第二

久しく食すれば人をして多く熱煩せしめる【別錄】 誥曰く、性寒にして小毒あり。

故疾を發す。久しく食すれば五臟を昏し、人をして好く睡らしめ、人の筋骨を緩にし、血脈を絶つ。小兒が多く食へば久しく行歩不能ならしめる。小猫、犬が食へばその脚が踟屈する。葵菜と食合せれば痢疾となり、牛肉、白酒と食合せれば寸白蟲が生ずる。李廷飛曰く、五種の黍米は、多く食へば閉氣する。

### 主治

【氣を益し、中を補す】(別錄) 【灰に燒き油に和して杖齧に塗れば、痛

を止め、癥とならぬ】(孟詵) 【嚼んで濃汁を小兒の驚口瘡に塗れば效がある】(時珍)

### 發明

思邈曰く、黍米は肺の穀である。肺病にはこれを食ふがよし。主として氣を益する。

時珍曰く、按ずるに、羅願は「黍は暑である。火に象るものだから南方の穀とする」といつた。蓋し黍は最も粘滯するもので、糯米と性が同じく、その氣は溫暖だ。故にその功能は肺を補するのであるが、しかし多く食すれば煩熱を作し、筋骨を緩にする。孟氏が、「その性寒だ」といつたのは正しくない。

### 附方

曹二、新二。【異子の陰易】黍米二兩を煮た薄粥に酒を和して飲む。

卷三十四頁ニ出ヅ。

發汗して癒える。(聖濟總錄)

【心痛の癒えぬもの】四十年に達したものは、黍米の淘

汁じゅうを隨意に溫服する。(經驗方)

【湯火傷】まだ瘡とならぬには、黍米、女麴せうぎやく等分を、

各、炒り焦して研末し、雞子白で調へて塗る。粥に煮て用ゐるもよし。(肘後方)

【閃

眇みょう、脫臼だつぐう】赤黒くなつて腫痛するには、黍米粉、鐵漿粉各半斤、葱一斤を共に炒つ

て性を存して研末し、醋で調へて三回服し、後に水で調へて少量の醋を入れて貼る。

(集成)

丹黍米(別錄中品)

即ち赤黍であつて、爾雅にはこれを𥝵もんといつてある。瑞すい曰く、

浙地方では紅蓮米と呼ぶ。江南かうなんには白黍が多く、たまたまある赤いものを赤蝦米せきあまいと

呼ぶ。宗奭そうせき曰く、丹黍は皮が赤く、その米は黄である。ただ麴くにするだけのもので

飯にはならない。粘著すると容易に解けないものだ。原げん曰く、穗が熟すると色が赤

い。故に火に屬するものだ。北方の地ではこれで酒を釀かうし糕かうを作る。

氣味

【甘し、微寒にして毒なし】思邈しゐゐく曰く、微溫なり。大明だいめい曰く、溫に

して小毒あり。蜜、及び葵と共に食合せてはならぬ。宗奭そうせき曰く、風を動ずる。性は

熱である。多食すれば消化し難い。○その他は黍米に同じ。

(七) 大觀ニ苦ニ作  
ル。

(ハ) 熱ハ熱ノ寫誤  
カ。

主 治

【欬逆上氣、霍亂。洩利を止め、熱を除き、煩渴を止める】(別錄) 【氣

を下し、欬嗽を止め、熱を退ける】(大明) 【鼈癭を治す。新しい(ハ)熱せるものを淘つ

た胆汁一升を取り生で服す。二三回に過ぎずして癒える】(孟詵)

附 方

舊二、新二。 【男子の陰易】丹黍米三兩を煮て薄酒を和して飲む。發汗

せしめて癒える。(傷寒類要) 【小兒の驚口】乳を飲み得ぬには、丹黍米を嚼んで汁を

塗る。(子母秘錄) 【酒を飲んで酔はぬ方】赤黍を取つて狐血で漬けて陰乾し、酒を飲

む場合に一丸を舌下に置いて含む。酔はなくなる。(萬華術方) 【婦人をして嫉妬せざ

らしめる方】藁、即ち赤黍を取り、薏苡と等分を丸にして常服する。(同上)

稷 莖

并に 根

氣 味

【辛し、熱にして小毒あり】詵曰く、酔つて黍稷

に臥せば腐を生ぜしめる。人家でその莖、穗を取つて地上を掃く帚にしたものを煮た汁は薬に入れて更に佳し。

主 治

【煮汁を飲めば苦瓠の毒を解す。身體を浴すれば浮腫を去る。小豆を

和して煮た汁を服すれば小便を下す】(孟詵) 【灰に焼いて方寸匕を酒で服すれば妊娠

尿血を治す。丹黍の根、莖の煮汁を服すれば小便を利し、上喘を止める】(時珍)

## 附方

舊一、新三。

【全身の水腫】黍の莖で作つた帚を煮た湯に溶する。【脚

氣衝心】黍稷一石の煮汁に椒目一升を入れ、更に煎じて十沸し、脚を三四回漬けれ

ば癒える。〔外臺秘要〕

【天行豌豆瘡】人と畜類とに拘らず、黍稷を煮た濃汁で洗ふ。一

本莖のものは稌稊さいじつといふもので、用ゐられない。〔千金〕【瘡腫傷風】水に中つたもの

で、痛み劇しきには、黍稷を烟に焼いて熏じ、汗を出さしめれば癒える。〔千金方〕

## 蜀黍（食物）

和名 もろこしきび、たかきび  
學名 Andropogon Sorghum, L.  
科名 禾本科

## 釋名

蜀黍（俗名）

蘆稌（食物）

蘆粟（いづれも俗）

木稷（廣雅）

荻梁（同

上）高粱

時珍曰く、蜀黍は甚だ經に見えないが、現に北方に最も多い。按ずる

に、廣雅に『荻梁こきりやうは木稷なり』とある。蓋しこれもやはり黍、稷の類のもので、高

く大きくして蘆、荻のやうなものだから俗にかかる諸名があるのであつて、これを

栽培することが蜀地方から始つたので蜀黍といつたのだ。


## 集解

穎曰く、蜀黍は、北方の地では栽培して食糧不足の場合の備にし、そ

（一）牧野・フ、其穗形、色彩ハ品種ニヨツテ多少ノ相違ガアル、中ニハ往往穗梗ノ曲ルモノモアル、稈ニ糖分多キミタウモノコシ（蘆粟ノ名ヲ我邦ニ來タ）、花穂デ穂ヲ造ルハはきモアル。

の他、牛、馬の糧にもする。穀類中で最も長いものだ。南方地方では蘆稔ろさいと呼ぶ。

時珍曰く、蜀黍は下地に適し、春期に種を蒔いて秋期に收穫する。莖は高さ一丈ばかり、状態は蘆、荻に似て内部が實し、葉もやはり蘆に似たもので、穂は大きくして帚のやうだ。粒の大きさは椒ほどの紅黒色のもので、米は性が堅く實して黄赤



〔黍 蜀〕

色だ。二種あつて、粘するものは糯じもち。秫じもちに和して酒に醸し、食料となる。

粘せぬものは糕かうにし、粥にして凶作の場合の食料になり、畜類の飼糧にもなり、梢は箒になり、莖は箔席を織る材料になり、籬かきに編あむにも用ゐる、

炊爨すゐさんの薪にもなり、民家に取つて最も有用なものである。現に一般に稷こに代へて祭祀に用ゐてゐるが、あれは誤だ。この穀物の殻かちは水に浸すと紅色になり、酒に色をつける場合に用ゐる。博物志には『土地に蜀黍を種ゑて年久しく經つと蛇が多くな  
る』とある。



米 ニ 氣味

【甘く澀し、温にして毒なし】

主治

【中を温め、腸、胃を

澀し、霍亂を止める。粘するものは黍米と同功だ】(時珍)

根 主治

【煮汁しじゅうを服すれば小便を利し、喘滿を止める。灰に焼いて酒で服すれば産難を治するに有效だ】(時珍)

附方

新一。【小便不通】喘を止め、紅朮散——紅朮黍根二兩、扁蓄一兩

半、燈心百莖を用ゐ、半兩づつを流水で煎じて服す。(張文叔方)

蛋白質「カフイリン」ニ「ソルギン」ヲ含ム、ソノ灰分中ニ銅ヲ存ス、以上洋書ノ説。日本産ノモノハ其組成水分一・四六%、蛋白質八・九六%、脂肪三・五九%、灰分一・九五%、而シテ無窒素物中ニハ六五・四九%ノ澱粉、三・三〇%ノ「デキストリン」、一・四六%ノ蔗糖ヲ含有シ、灰分中ニハ燐酸及加里鹽ヲ多ク含ム。(應用)穀ヲサキテ皮ヲ去リ餅トナシ、又麴トモナシ、又燒酎ノ製造ニ用ヰ。

(一) 玉蜀黍 (綱目)

和名 たうもろこし  
學名 Zea Mays, L.  
科名 禾本科

釋名 玉高粱

集解

時珍曰く、玉蜀黍の種類は(二)西土から出たもので、種植するものはや

はり罕だ。その苗、葉は俱に蜀黍に似てゐるが肥えて矮く、また薏苡ぎぎの苗にも似た

(一) 牧野云フ、元來中、南亞米利加原産ノ禾本デアルガ、今一般ニ我邦ニ栽培セラレテ重要ナ食料品ノ一トナツテキル、ハゼニ造ルモノニハなきびト稱スルモノガアルガ此一變種デアル。



(二) 西土ハ新疆、西藏、及ビソノ以西ノ地ヲ廣ク指シタル稱ナリ。

(三) 木村(康)曰ク、  
 (成分) 莖莖中ニ酵素「インベルチン」<sup>インベルチン</sup>、「アスターゼ」<sup>アスターゼ</sup>及糖チ含ム、而シテ莖ノ汁液中ニハ蔗糖〇・二—一〇%、轉化糖〇・八一四・七五%、雌蕊ハ「フイトステロール」<sup>フイトステロール</sup>、葡萄糖、キシラル<sup>キシラル</sup>、ガラクタン<sup>ガラクタン</sup>等ヲ含有ス。風乾物一〇〇分中無機成分含量ハ水分一二・七、灰分五・六、灰分中 $\text{SiO}_2$ 〇・一一、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \times \text{Al}_2\text{O}_3$ 〇・一一、 $\text{CaO}$ 〇・六、 $\text{MgO}$ 〇・六、 $\text{K}_2\text{O}$ 一・七、 $\text{Na}_2\text{O}$ 〇・一一、 $\text{P}_2\text{O}_5$ 〇・六、 $\text{Cl}$ 〇・三、玉黍蜀粉末ハ水分一〇・六〇、蛋白質一四・〇、脂肪三・八、無窒素物七〇・三四、纖維〇・六八、灰分〇・八六ナリ。

(藥用) 米國ノ準藥局法ニヨレバ、花柱ヲ生ノママ或ハ乾燥シタルモノヲ民間ニ煎服シテ利尿ノ效ヲナス、大人一日用量八瓦。



〔黍 蜀 玉〕

もので、高さ三四尺のものだ。六七月に稗麥<sup>ひぐき</sup>のやうな状態の穂に成つた花を開き、苗の心から別に稷魚<sup>きうぎょ</sup>のやうな形の一箇<sup>つと</sup>の苞<sup>つと</sup>が出て、その苞の上から白鬚<sup>ひげ</sup>が出てふさふさと垂れ、久しく經つとその苞が折けて子の顆粒<sup>かりゅう</sup>が夥しく簇<sup>むら</sup>り著<sup>つ</sup>いて出る。その子の大いさはやはり稷の子ほどの黄白色のもので、燂<sup>や</sup>き炒つて食へる。炒れば折き糯穀<sup>もちこ</sup>を炒り折いたときやうに白花の形狀になる。

米

(三) 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【中を調へ、胃を開く】(時珍)

根葉

氣味

主治

【小便淋瀝、沙石痛<sup>しせきつう</sup>の忍び難きには、煎湯を頻に飲

す】(時珍)

(一) 梁 (別錄中品)

和名 あは、おほあは  
學名 *Solitaria italica*, *Beauv.*  
科名 禾本科

校正

別錄中品にある青梁米、黃梁米、白梁米をここには一條に併記した。

釋名

時珍曰く、梁りやうは良であつて、穀物としての良なるものの意味だ。或は

(二) 牧野云フ、今日我邦ニ培養セララルルあはニハ數個ノ變リ品ガアツテ、中ニハ穗末ガ數枝穗ニ分岐スルモノモアル。あはトエのころぐサトノ間種ト認メラルルモノニおほえのころト云フモノガアツテ能クあは畑ニ生ジテキル。

(三) 梁州ハ石部特生藥石ノ註チ見ヨ。

『種が二 梁州から出たから』或は『梁の米は性涼なるものだから』それで梁なる名稱が生じたのだといふが、これはいづれも各々勝手な見方であつて、梁とは即ち粟のことである。周禮に就いて考ふるに、九穀、六穀として擧げてある中の名稱に、梁があつて粟のないところを見ても推知される。漢より以後、大きくして毛の長いものを梁とし、細かにして毛の短いものを粟とするといふことが始つたのであるが、今では兩者を通じて粟と呼び、古代に呼んだ梁なる稱呼は反對に隠れて了つた。現に世俗に稱するところの、粟の中の穗が太くして芒はうが長く、粒が粗あらくして紅毛、白毛、黃毛のある品が即ち梁なのであつて、黃梁、白梁、青梁、赤粟と呼ぶは、や

(三) 雲州、冀州ハ水  
部井泉水ノ註ヲ見  
ヨ。

(四) 一書ニ蔡ニ作  
ル。  
(一) 蜀ハ四川、漢、  
商ハ陝西ノ南半、浙  
ハ浙江地方ヲイフ。

はりその色に随つた命名に過ぎない。郭義恭の廣志に、解梁、貝梁、遼東赤梁なる  
名稱が擧げてあるが、これはその産地に因つた命名だ。

### 集 解

弘景曰く、凡て梁米といふはみな粟の類であつて、ただその牙頭の色  
の差異に因つて區別しただけのものである。汜勝之は『梁は秬粟だ』といつたが、



〔秬・粟・梁〕

細は粟・粗は梁  
—— 枯は秬・くは

それはさうでない。黄梁は(三)青、  
冀州に産するもので、東部地方で  
は見受けなない。白梁は處處にある  
が、襄陽の竹根のものを佳しとす  
る。青梁は江東にはあることが稀

だ。又、漢中に秬梁といふ一種があつて、粒は粟のやうで皮が黒く、食料にもなり、  
酒にも醸す。よく(三)玉を消かすものだ。

恭曰く、梁は粟の類ではあるが、詳細に調べると差別がある。黄梁は、(一)蜀、漢、  
商、浙地方に産し、穂が大きくして毛が長く、穀、米は俱に白梁よりも粗くして子  
の收穫が少く、水旱に耐へず、食料として香美なる點は諸梁に勝るもので、一般に

竹根黃と稱してゐる。陶氏が竹根を白粱といつたのは誤だ。白粱は、穂が大きくして毛が多く、且つ長くして穀は粗く、扁長で粟のやうに圓くなく、米はやはり白くして大きく、食料としての香美な點は黃粱に亞ぐものだ。青粱は、穀穗に毛があつて粒が青く、米もやはり微し青くして黃粱、白粱よりも細かく、その粒は青稞に似て少し粗く、早く熟して收穫が薄い。夏期の食料として極めて清涼なものだが、ただ味がないのと色の悪いのとで黃粱、白粱のやうなわけに行かない。故に一般にこれを種植することが稀である。餽を作ると清白で他の米に勝る。

頤曰く、粱は粟の類であつて、粟は粒が細くはあるが功用の點では差異がない。現に汴洛、河陝地方では白粱を多く種植するが、青粱、黃粱は稀だ。それは土地の肥力を損して收穫が少いためだ。

宗奭曰く、黃粱、白粱は西洛の農家で多く種植する。飯にして尤も佳し。その他用途では甚だ結構なものでない。

黃粱米（別錄中品）

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【氣を益

（考）木村（康）曰ク、  
（成分）うるあはノ組  
成（%）ハ水分一三・

し、中を和し、洩を止める】（別錄）【客風頑痺を去る】（日華）【霍亂下痢を止め、小

三四、蛋白質二・五  
七、脂肪五・五五、無  
窒素物六五・三一、纖  
維一・六五、灰分二・  
五五。

便を利し、煩熱を除く【時珍】

發明

宗奭曰く、青粱、白粱は性いづれも微涼であるが、黃粱だけは性、味が甘にして平である。これは土地の中和の氣を稟けることが多いからではないかと思ふ。

頤曰く、諸種の粱は、他の穀類に比較して最も脾、胃を益するものだ。

附方

舊四、新一。

【霍亂煩躁】

黃粱米粉半升、水半升を和して絞り、白粉の

やうにして頓服する。(外臺) 【霍亂大渴】 渴して止まぬものは、多く流動物を飲めば

死亡する。黃粱米五升、水一斗を煮て清したもの三升を少しづつ飲む。(肘後) 【小兒

の鼻乾】 涕の出ないものは腦熱である。黃米粉、生礬末各一兩を用ゐ、一日二回、

一錢づつを水で調へて顙上に貼る。(普濟) 【小兒の赤丹】 土番黃米粉を雞子白で和し

て塗る。(兵部手集) 【小兒に生じた瘡】 身體、顔面全部に満ちて火で焼くやうなるに

は、黃粱米を粉に研つて蜜水を和して調へ、瘡えるを度として用ゐる。(外臺)

白粱米(別錄中品)

氣味

【甘し、微寒にして毒なし】

主治

【熱を除き、

氣を益す】(別錄) 【胸隔中の客熱を除き、五臓の氣を移し、筋骨を(七)緩にする。凡そ

(七)大觀ニ續ニ作  
ル。



胃虚、并に食物、及び水を嘔吐するには、米汁二合、薑汁きやうじゆ一合を和して服するがよし（孟詵）【飯に炊いて食へば、中を和し、煩渴を止める】（時珍）

（心）大觀ニ吐ニ作

ル。

（心）大觀ニ鑑ニ作

附方

舊二。

【霍亂の（心）止まぬもの】白粱米五合、水一升を和して粥に煮て食ふ、（千金方）【手足に疣の生じたるもの】白粱米粉を鐵銚てつてうで赤く炒つて研末し、多數人の唾液で和して厚さ一寸に塗る。直ちに消える。（肘後）

青粱米（別錄中品）

氣味

【甘し、微寒にして毒なし】

主治

【胃痺、熱

中、消渴、洩痢せうりを止め、小便利し、氣を益し、中を補し、身を軽くし、天年を長くする。粥に煮て食ふ】（別錄）【脾を健にし、洩精を治す】（大明）

發明

時珍曰く、現に粟中にある大きくして青黒色なものがそれである。この物は穀芒が多くして米が少く、金水の氣を稟受ひんじゆするものだ。その性は最も涼であつて、病人に好適のものである。

詵曰く、青粱米は辟穀よに可し。純苦酒に三日間浸し、百回蒸し百回晒さらして貯藏し、遠路歩行の際に一日に一回食へば十日間歩行繼續に堪へる。若しそれを繼續して食へば四百九十日間は饑ゑない。又、ある方では、米一斗、赤石脂三斤を水に漬けて



一兩日間暖かな場所に置き、上に青白色の衣の出たとき、搗いて大いさ李ほどの丸にし、一日三丸づつを服す。やはり饑ふない。按ずるに、靈寶五符經中に『白鮮米を九蒸九暴して辟穀の糧にする』とあるが、此に青粱米を用ゐるといふその出處は判らない。

### 附方

新七。

【脾を補し、胃を益す】羊肉湯に青粱米、葱、鹽を入れて粥に

煮て食ふ。(正要)

【脾虛泄痢】青粱米半升、神麴じんきく一合で日毎に粥を煮て食へば癒える。(養老書)

【冷氣心痛】

桃仁二兩を皮を去り、水で研つて汁を絞り、その汁に青粱

米四合を入れて粥に煮て常食する。(養老書)

【五淋澀痛】青粱米四合に醬水を入れて

粥に煮、上蘇末じやうそまつ三兩を投じて毎日空心に食ふ。(同上)

【老人の血淋】車前五合を綿に

裏んで煮た汁に青粱米四合を入れて粥に煮、その汁を飲む。またよく目を明にし、

熱を引いて下行するものだ。【乳石の發渴】青粱米の煮汁を飲む。(外臺)

【一切の毒藥】及び鳩毒ちゆうどくの煩懣はんまん止まぬには、甘草三兩、水五升を二升に煮取つて滓

を去り、黍米粉一兩、白蜜三兩を入れて煎じ、薄粥のやうにして食ふ。(外臺)

## 粟 (別錄中品)

和名 こあは

學名 *Setaria italica*, Beauv. var. *germanica*, Trin.

科名 禾本科

(一) 牧野云フ、あはノ果穂ノ小形ナル品デアルガ、往往普通ノあはト分チ難イ中間品ガアル。

## 釋名

稊粟 時珍曰く、粟の古文字は稊と書いた。穂が禾の上に在る状態を

形容したものであつて、春秋題辭に『粟なるものは金の所立であつて、米は陽の精である。故に西の字に米を合せて粟としたのだ』とあるは、こじつけだ。許慎の説には『粟といふは續の意味で、穀に續くものだ。古代には粟を黍、稷、粱、秫の總稱とした』とあつて、今いふ粟そのものは古代にはただ粱と呼んだそのものだ。後世一般には粱の細かいものを指して専ら粟と呼ぶやうになつた。それで唐の孟詵の本草には『一般に粟なるものを識らぬ』といつたのだが、近世では全く粱を識らなくなり、大體に於て、粘るものを秫とし、粘らぬものを粟とするところから、この物では秫粟と呼んで秫と區別して秫と配するやうになつた。北方の地では一般にこれを小米と呼んでゐる。

## 集解

弘景曰く、粟は、江以南、江西地方で作るものはいづれもその粒が粱

(二) 南、大觀ニ東ニ作ル。

よりも細かく、よく春<sup>つ</sup>いて白くしてやはり白粱に當て、白粱粟と呼び、或は粟米と呼んでゐる。

恭曰く、粟は種類は多いが、いづれも諸種の粱よりも細かい。北方の地では常食とする。粱とは區別がある。粟<sup>も</sup>とは稷米のことだ。陶氏の註解は正しくない。

説曰く、粟とは顆粒<sup>くわりゅう</sup>の小さいものことだ。現に一般人の多くは正確に知つてゐない。(三) 粟そのものは米粒が粗大なもので、色に随つて區別する。南方では多く新たに焼いて開墾する所謂畚田<sup>しんてん</sup>に多くこれを作るが、その收穫したものは極めて春き易く、粒は細く、香美で少しこくがない。それはただ灰の中へ種<sup>う</sup>ゑるのと、鋤を加へないがためであつて、北方で耕地に作るものは多く鋤を加へるから、その收穫物は春き難い。鋤を加へないとその草が(四) 翳死<sup>もいじ</sup>する。全然土地の關係である。

時珍曰く、粟、即ち粱であつて、穂が大きくして毛長く、粒の粗<sup>あら</sup>いものは粱である。穂が小さくして毛短く、粒の細かいものは粟である。いづれも苗<sup>さう</sup>は茅のやうなものだ。種類は凡そ數十あつて、青、赤、黄、白、黒の諸色があり、人の姓氏や地名やに因<sup>うな</sup>み、或は形の類似點や時季に因み、それぞれの意味を含めて名を命<sup>めづ</sup>けるの

(三) 大觀ニ粱ニ作ル。

(四) 翳死ハ雜草ニ隱蔽セラレテ死スルト。

(五) 息耗ノ息ハ増スコト、耗ハ減ズルコト。

(六) 木村(廉)曰ク、こあはノ穀粒成分ノ組成(%)ハ澱粉五六・七・六二・五、脂肪三・一二、含窒素五、水分八・六。

で、早種のものには趕麥<sup>けんまく</sup>黄、百日糧などの名のものがあり、中種のものには八月黄、老軍頭などの名のものがあり、晚種には鴈頭青、寒露粟などの名のものがある。按ずるに、賈思勰<sup>かしかん</sup>の齊民要術には『粟の成熟に早晚あり、苗程<sup>めうかう</sup>に高下あり、收實に息耗あり、質性に強弱あり、米味に美惡あり、山澤に異宜あり。天の時に順<sup>したが</sup>ひ地の利を量<sup>はか</sup>れば、力を用うること少くして功を成すこと多し。性に任じ道に返すれば、勞して穫ること無し』とある。概して早粟は皮薄くして米が實し、晚粟は皮厚くして米が少い。

### 粟米

即ち小米である。(六)

### 氣味

【鹹し、微寒にして毒なし】時珍曰く、鹹

し、淡なり。宗奭曰く、生では消化し難い。熟では滯氣<sup>たいき</sup>し、隔食し、蟲を生ずる。藏器曰く、胃冷のものは多食してはならぬ。粟を水に浸して敗れるやうになつたものは人體を損ふ。瑞曰く、杏仁と食合はせれば人をして吐瀉せしめる。鴈は粟を食ふと足が重くなつて飛べなくなる。

### 主治

【腎氣を養ひ、脾、胃中の熱を去り、氣を益す。陳<sup>ちん</sup>さものは苦寒であつて、胃熱、消渴を治し、小便を利す】(別錄) 【痢を止め、丹石の熱を壓す】(孟詵)

【水で煮て服すれば、熱腹痛、及び鼻衄<sup>びぞく</sup>を治す。粉にし水で和して濾した汁は、諸毒を解し、霍亂、及び轉筋の腹に入りたるものを治し、又、卒<sup>にまか</sup>に罹つた鬼打を治す】<sup>〔鐵器〕</sup>【小麥毒の發熱を解す】<sup>〔土苴〕</sup>【反胃<sup>はんゐ</sup>、熱痢を治す。粥に煮て食へば、丹田を益し、虚損を補し、腸胃を開く】<sup>〔時珍〕</sup> ○生生編

#### 發明

弘景曰く、陳粟とは三五年經つたものをいふのであつて、尤も煩悶を解す。服食家でもやはりそれを食ふ。

宗奭曰く、粟米は小便を利するものだから脾、胃を益する效能があるのだ。

震亨曰く、粟は水と土とに屬する。陳いものは最も硬くして消化し難いが、漿水を得れば消化する。

時珍曰く、粟なるものは、味は鹹くして淡く、氣は寒にして下滲<sup>げじん</sup>する。腎の穀であつて、腎病に適する食物だ。虚熱、消渴、洩痢はいづれも腎の病であつて、小便を滲利<sup>しんり</sup>する結果は腎の邪を洩<sup>せつ</sup>することになるのである。胃火を降すから脾、胃の病に食ふがよし。

#### 附方

舊五、新四。

【胃熱消渴】陳粟米で炊いた飯を乾して食ふが良し。<sup>〔醫方心</sup>



鏡)

【反胃吐食】脾、胃の氣弱で食物が消化せず、湯飲の通らぬには、粟米半升を粉に杵ついて水で梧子大の丸にし、七粒を煮熟して少量の鹽を入れ、空心に汁と共に吞下す。或は、醋中に納れて吞む。下通して已むといふ。(心鏡) 【鼻衄の止まぬもの】粟米粉を水で煮て服す。(普濟) 【嬰孩の初生】七日目に穀神を助けて腸、胃に導き達する。粟米を研いで飴のやうな粥に煮、毎日少許を哺ほはす。(姚和衆方) 【孩子の赤丹】粟米を嚼んで傳ける。(兵部手集) 【小兒の重舌】粟米を嚼んで哺ふ。(秘錄) 【雜物の味目】出ぬには、生粟米七粒を嚼み爛らし、その汁を取つて洗ふ。直ちに出来る。(總錄) 【湯火灼傷】粟米を炒り焦して水に投じ、澄して汁を取り、糖のやうに煎稠して頻りに傳ける。能く痛を止め、癰痕を滅す。ある方では、半炒半生にして研末し、酒で調へて傳ける。(崔行功纂要) 【熊、虎の爪傷】粟を嚼んで塗る。(葛氏方)

粟泔汁

主治

【霍亂卒熱で心の煩渴するには、數升を飲む。立ろに瘥える。臭泔しうかんは消渴を止めるに尤も良し】(蘇恭) 【酸泔、及び澱で皮膚の癰疥さうがいを洗へば蟲を殺す。これを飲めば五痔に主效があり、臭楞皮しうちやひを和して煎して服すれば小兒の疳痢を治す】(藏器)



附 方

新二。

【眼熱赤腫】粟米泔澱かんてんの極めて酸きものと、生地黃等分を研り  
まぜて方圓二寸の絹に攤のし、目上に貼つて熨す。乾けば易へる。（總錄）【疳瘡月蝕】  
寒食泔澱を傅けるが良し。（千金）

栗 糠

主 治

【痔漏、脱肛には、諸藥に和して薰ずる】（時珍）

栗 奴

主 治

【小腸を利し、煩懣はんまんを除く】（時珍）

發 明

時珍曰く、栗奴、即ち栗苗の穗が生えるときに生ずる黒煤こつはいである。古  
方には用ゐてないが、聖恵に、小腸の結澀不通で心煩悶亂するを治する栗奴湯とい  
ふがあつて、『栗奴、苦竹鬚くちくしよ、小豆葉、炙甘草しやかんぞう各一兩、燈心十寸、葱白五寸、銅錢七  
文を水で煎じて分服する。效を取つたならば止める』とある。

栗 廩 米

後の陳廩米の條下に掲げる。

栗 藁 米

後の藁米ぎやうまいの條下に掲げる。

栗 糲

後の粃ちの條下に掲げる。

(一) 軟野云フ、穀ノ粘ルモノデ、あは、こあはトモ孰レニモアル。

秬

音は朮(シエツ)である。

(別録中品)

和名 もちあは  
學名 玄米 indica, Beauv. form.  
科名 禾本科

釋名

衆

音は(シエツ)

である。

(爾雅)

糯糲(唐本)

糯栗(唐本)

黃糯

時珍

曰く、秬の字の篆文はその禾の體の柔弱なる形に象つてある。俗に糯栗と呼ぶそのものだ。北方地方では黃糯と呼び、また黃米ともいふ。酒に醸しては糯に劣る。

集解

恭曰く、秬とは稻秬のこと

で、今は一般に粟糯を秬と呼ぶ。

北方の地

では多くこれで酒を醸すが、汁は黍米よりも少い。

凡て黍稷、粟秬、粳糯の三穀に

はいづれも秬と糯とがある。

(二) 大觀ニ秬ニ作ル。

禹錫曰く、秬米は黍米に似て粒が小さい。酒に作れるものだ。

宗奭曰く、秬米は搗くと初めに淡黄色が出る。やはり糯のやうなもので、飯にはならない。それはあまり粘り過ぎるからだ。酒を作るにはよい。

時珍曰く、秬とは粱米、粟米の粘るものを指すのであつて、赤、白、黄の三色あり、いづれも酒に醸し、糖に熬り、糴糕に作つて食へるものだ。蘇頌の圖經に、秬

(ミ)木村(康)曰ク、  
稊ト稱スルハ粘藪  
(盛京通志)、稊粟(通  
州志)ノ類ニシテ、  
種粒殊ニ小サク粘マ  
リ餅トナスニ適シ、  
マタ酒、燒酎、餡ヲ製  
スルニ佳ナリ。

を黍の粘るものだといひ、許慎の説文に、稊を稷の粘るものだといひ、崔豹の古今注に、稊を稻の粘るものだといつたのはみな誤であつて、蘇恭が、粟稊を以て稊、糯を分ち、孫炎の爾雅の註に、稊を粘粟といつたのが當を得てゐる。

### 稊米

即ち黄米である。(ミ)

### 氣味

【甘し、微寒にして毒なし】詵曰く、性は

平である。常食してはならぬ。五臟の氣を挫し、風を動じ、人をして迷悶せしめるものだ。時珍曰く、按ずるに、養生集に『味酸く、性熱であつて、粘滯して黄積病と成り易い。小兒は多食してはならぬ』とある。

### 主治

【寒熱、大腸を利し、漆瘡を療ず】(別錄)

【筋骨の攣急を治し、瘡疥毒

熱を殺す。生で搗き、鷄子白で和して毒腫に傅けるが良し】(孟詵) 【犬咬、凍瘡に主效がある。嚼んで傅ける】(日華)

【肺痿、及び陽盛陰虛で夜中眠れぬもの、及び鷄

鴨を食つて成つた瘰癧、妊娠中に黄汁を下すものを治す】(時珍)

### 發明

弘景曰く、北方地方ではこの米で酒を作る。糖に煮れば肥軟にして消化し易い。方藥には純粹の藥としては用ゐない。ただ嚼んで漆瘡に塗り、また諸種の藥醪を醸すに用ゐるだけだ。

時珍曰く、秫は肺の穀であつて、肺病にはこれを食べがよし。そのわけは、能く寒熱を去り、大腸を利するからで、大腸は肺の合であつて、肺が病めば多く皮の寒熱を作すものだ。千金の肺痿を治する方にこれを用ゐたのはこの意味を取つたのである。靈樞經に、岐伯が陽盛陰虛して夜瞑し得ざるを治する半夏湯中にこれを用ゐたのは、この物が陰氣を益して大腸を利する功力を取つたものであつて、大腸が利すれば陽が盛でなくなる。その方は半夏の條下に記載した。又、異苑に『宋の元嘉年間のこと、ある者が鴨を食つて癥瘕になつたとき、醫が秫米を粉に研つて水で調へて服せると、須臾にして煩躁し、一羽の鴨雛を吐出して瘥えた』とある。千金方には『鴨肉を食つて病となり、胸滿し、面赤く、物を食し能はぬには、秫米泔一盞を飲ませる』とある。

## 附方

舊三、新三。

【赤痢の止まぬもの】秫米一把、鯽魚鮓二櫛、葱白一虎口

で粥に煮て食ふ（普濟方）

【筋骨の攣急】洗曰く、秫米一石、麴三斗、地黄一斤、茵

陳蒿を黄に炙いて半斤を用ゐ、普通の釀造法に依つて酒にして服するが良し。

【肺

瘡寒熱】痰が胸中に聚り、その病狀が心を寒せしめるやうになり、寒甚しければ熱

(一)牧野云フ、山地ノ畑ニ往往之レヲ作ルヲ見ル、一二かもまたきびトモかうばふひえトモ稱スル、蓋シちからぐさ一名なし(ば) *(C. incan. Gaertn.)* カラ變化シタ品デハナイカト思フ、本草綱目啓蒙ニハ此書ノ稗子ヲひえトニレドモ非デアル、

してよく驚き、幻覺を生ずるやうなものである。恒山三錢、甘草半錢、秫米三十五粒を水で煎じ、未發時に三回に分服する。(千金) 【妊娠で水を下すもの】膠のやうな黄色の水、或は小豆汁のやうな水を下すには、秫米、黄芩各一兩、水七升を三升に煎じて三回に分服する。(梅師) 【浸淫惡瘡】汁があつて多く心に發するものは、早く治療せねば全身に及んで死亡する。秫米を黄黑に熬り、末に杵いて傳ける。(肘後方) 【久泄の胃弱】黄米を炒つて粉にし、數匙づつを沙糖を拌せて食ふ。(簡便)

根 主治 【湯に煮て風を洗ふ】(孟詵)

(二) 稭

衫(サン)稭(ザン)の二音である。

(救 荒)

和名 し、くびえ

學名 *Eleusine coracana, Gaertn.*

科名 禾本科

釋名

龍爪粟 鴨爪稗

時珍曰く、稭とは粘せぬものを呼ぶ言葉であつて、

また實らぬものを指す意味である。龍爪といひ、鴨爪といふは、その穂の岐の形の形容だ。

集解

周憲王曰く、稭子は水田中、及び下濕の地に生える。葉は稻に似てた

然シ周憲王ノ救荒本草所載ノ稭子ハ蓋シ  
 ひんシハナイカト思フ、即チ此書ノ稭子ト救荒本草ノ稭子トハ名ハ同シデモ其物ハ異ツテキル。ひえハ植物名實圖考ニ湖南稭子トアルモノデ學名ハ *Echinochloa frumentacea*, Link. デアル。



〔子 稭〕

だやや短く、梢の端にさながら稗子の穂そのまゝの穂を結ぶ。その子は黍粒としりふほどの大いさで茶褐色だ。米を搗ういて粥に煮、飯に炊き、麴に磨る、いづれもよし。

時珍ししん曰く、稭子は、山東、河南でもやはり五月に種うゑる。苗は菱かろ、黍のやうなもので、八九月に莖が抽き出でる。その莖には

三稜があつて、水中の蘼草へうさうの莖のやうだ。細かい花を開き、簇ぞくぞくとした粟の穂のやうな穂を結び、それが數岐に分れて鷹の爪のやうな状態になり、内に黍粒のやうで細かな赤色の細子がある。その稭ふは甚だ薄く、その味は粗澀なものだ。

氣味

【甘くこ満みし、毒なし】

主治

【中を補し、氣を益し、腸、胃を厚く

し、饑うすを濟すくふ】



(一) 牧野云フ、のびえニハ數品ガアル、其芒ノ無キモノチさるびえト稱ヘ芒ノ著シキモノチくまびえト稱スル。ひえハ多分モト此ノびえカラ出タ品デハナイカト思ハル、ひえハ通常畑ニ作ツテキルガ又水田ニ栽エル品モアツテ之レチみづびえト云ハルル。ひえノ支那名ハ湖南稷子(植物名實圖考)デ學名ハ *Echinochloa frumentacea*, Link. デアル。

## 稗

音は敗(ハイ) (綱目)

和名 のびえ、いねびえ  
學名 *Echinochloa crusgalli*, Beauv.  
科名 禾本科

### 釋名

時珍曰く、稗とは禾の卑賤なるものだ。故に文字は卑に従ふのである。

### 集解

弘景曰く、稗の子はやはり食へる。又、烏禾といふ野中に生える稗のやうなものがある。凶作の際には代用食糧となる。蟲を殺すもので、煮て地に沃くと、蠖が悉く死ぬ。

藏器曰く、稗に二種あつて、一種は黄白色、一種は紫黑色だ。紫黑色のものは芒



〔稗〕

に似て毛がある、北方の地では烏禾と呼ぶ。時珍曰く、稗は處處に野生し、最も能く稲の苗と見まがふものだ。その莖、葉、穂、粒はいづれも黍、稷のやうなもので、一斗から米三升取れる。故に『五穀熟せざれば稗、稗に如かず』といふのであつて、稗は苗が

(二) 本村(康)曰ク、  
ひえ種子ナトリ炊  
キテ食用ニ供ス、性  
質強剛ニシテ能ク旱  
魃ニモ堪へ、風雨蟲  
害ニ犯サルルコトモ  
少ク、瘠地ト雖モ尙  
ヨク相當ノ收穫アリ、  
且ツ久シク貯藏  
ニ耐フルノ故ヲ以  
テ、農家ハ古來備荒  
ノ作物トシテ栽培セ  
リ。

(一) 牧野云フ、今植  
物名實圖考ニ據テ之  
レヲ下ノ如ク定メタ  
カ、然シ時珍ノ文ニ  
ヨレバ從來學者ガ偽  
シタヤウニシカラ

稗に似て、穗は粟のやうで紫毛がある。即ち烏禾である。爾雅にはこれを逖——音は迭(テツ)——といつてある。周憲王は『稗に水稗と旱稗とあつて、水稗は田中に生じ、旱稗は、苗、葉は稗子に似て色は深緑、根下の葉は紫色を帯び、稍頭に扁穗を出して子を結ぶ。その子は黍粒のやうで茶褐色だ。味は微し苦く、性は温である。粥に煮、飯に炊き、麴に磨いて食ふ。いづれもよし』といつた。

### 稗米

(三)

#### 氣味

『辛く甘く苦し、微寒にして毒なし』 穎曰く、辛く脆し。

### 主治

『飯にして食へば氣を益し、脾に宜し。故に曹植に『芳薺精稗』の稱がある』(時珍)

ある』(時珍)

### 苗根

#### 主治

『金瘡、及び傷損の出血止まぬには、搗いて傅け、或は研末し

て掺る、直ちに止まり、甚だ效驗がある』(時珍)

## 狼尾草 (拾遺)

和名 あぶらすすき  
學名 *Echinochloa crusgalli*, Haackel.  
科名 禾本科

### 釋名

#### 根

音は郎(ラウ)である。

#### 董師

爾雅には董梁と書いてある。狼茅、爾

ぐさ (Pennis tum  
purpurea, Ma-  
kino.) ニ充ツルコト  
モ出来ルトモ考ヘ得  
ル。

(三) 牧野云フ、蒯草  
ハ未詳ノ一草デアル  
從來學者ハ之レヲカ  
やつリぐさ科ノあ  
ぶらがや (Scirpus  
cyperinus, Ku th.  
var. concolor, Makino.) ニ充テ居レドモ  
穩當デナイ。

雅) 孟爾雅) 宿田翁(詩疏) 守田(詩疏) 時珍曰く、狼尾とはその穂の状態の形

容である。秀でて成熟せず、すつくとして田にあるから宿田、守田と呼ばれたのだ。

### 集解

藏器曰く、狼尾は澤地に生じ、茅に似て穂になる。廣志に『子は黍として食へる』とあり、爾雅に『孟は狼尾、

茅に似たり、以て屋を覆ふ可し』とある

はこの物だ。

〔草 尾 狼〕

時珍曰く、狼尾は、莖、葉、穂、粒いづれも粟に似て、穂は紫黄色で毛がある。

凶作の年にはやはり采つて食物となる。


許慎の説文に『禾粟にして穂が生えて成

らぬものを董郎といふ、その秀でて實らぬものを狗尾草といふ』とある。草部に記載してある。

### 附録

蒯草 藏器曰く、蒯草は苗が茅に似たもので、席にも織り、繩にも

絢へる。また食物にもなり、粳米のやうだ。



米 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【飯にして食へば人をして饑

ゑざれしめる】(藏器)

(一) 東 廬

音は塘(シヤウ)である。

(拾遺)

和名 とうしやう  
學名 Nitroaria Schobori, I.  
科名 はまびし科(養稈科)

釋名

沙蓬米(格物)

登相子(保德州志)

沙米(同上)

登粟(遼史)

集解

藏器曰く、

東廬は(三)河西に生ずる。苗は蓬に、子は葵に似たもので、

(一) 河西ハ陝西省ノ北半部。  
(二) 子粒ノ二字、大觀ニ之子ノ二字ニ作ル。  
(三) 大觀ニ黒字ナシ。

九月、十月に熟する。飯にして食へるものだ。河西地方には『東廬を貸してくれたら田梁で濟さう。(貸我東廬償爾田梁)』といふ俚諺がある。廣志には『東廬(三)子の粒は葵に似て青(四)黒色だ』とある。(五)并、涼地方にもある。

時珍曰く、相如の賦に『東廬、彫胡』とあるはこの物だ。魏書に『(六)烏丸の地は

(七) 烏丸ハ今ノ内蒙古ノ地ナリ。  
(八) 木村(康)曰ク、此種ハ南魯西亞ヨリ蒙古ニカケテ及ビ

東廬に適する。襟に似たもので、白酒を作るものだ』とあり、又、廣志に『梁禾は蔓生のもので、その子は葵子のやう、その米の粉は白くして麪のやうだ。饅粥にな

る。六月種ゑて九月に收穫する。牛が食ふと尤も肥えるものだ』とある。これもや

「メソボタミヤ」ハ「オーストラリヤ」ニ産ス、此種及 Nitaria retusa ハ會テ曹達チ製スルニ應用セラレタリ、果實ハ食フ可シ。

(一) 牧野云フ、菰米ハまこもノ穀デ、往時ハ我邦デモ僅カニ之レヲ食用トシタ事モアルガ今日デハ其事實ガナイ、まこもニハ實ノ生ルモノト否ラザルモノトアルト唱ヘラレテキダガソシナ事ハ決シテナク、何レノ株ニモ能ク實ガ出來ル、即チ花穂ノ上部ニ雌花ガ咲イデ之レニ實ガ結び、花穂ノ下部ニハ雄花ガ咲キ、此雄花ガマダ咲キ了ラヌ内早ク穂米ノ花ハ實ニナツテキル、實ハ熟スルト穂カラ離レテ落下ス。

はり一種の穀類で、東廬に似たものだ。

子<sup>(七)</sup>氣味【甘し、平にして毒なし】主治【氣を益し、身を軽くし、

久しく服すれば饑えず、筋骨を堅くし、能く歩行せしめる】(藏器)

### (二) 菰 米 (綱目)

和名 まこもノ實  
學名 Fruits of *Zizania latifolia*, Turcz.  
科名 禾本科

釋名 茭米(文選) 彫蓬(爾雅) 彫菰(說文) 唐韻には蒿胡と書いてある。

彫胡 時珍曰く、菰はもと菰と書いたものだ。茭草である。その中に生える菰は

瓜のやうな形で、食へるものだ。故にこれを菰といふ。その米は霜が降りて彫む時をまつて採るものだから彫菰といひ、或は訛つて彫胡といふ。枚乗の七發には、

これを『安胡』といつてある。爾雅には『蓄は彫蓬なり。薦は黍蓬なり』とあり、

孫炎の註に『彫蓬、即ち茭米である。古代にはこれを五飯の一に數へたものだ』とある。鄭樵の通志には『彫蓬、即ち米茭である。飯にして食へるものだから蓄といふ。黍蓬といふは茭の實を結ばないもので、ただ薦に作れるだけだから薦



(二) 松州ハ草部芳草類當歸ノ註ナ見ヨ。

といふ』とある。楊慎の<sup>しぜん</sup>扨言には『蓬には水、陸の二種ある。彫蓬といふは水蓬であつて彫菰のことだ。黍蓬といふは旱蓬であつて青科のことだ。青科は黍のやうな實を結び、羌地方ではそれを食ふ。現に(三)松州にある』とある。余が按ずるに、鄭氏、楊氏の二説は同じくないが、しかしづれも根據がある。蓋し蓬の類は一種でないからだ。

【集 解】

弘景曰く、菰米、一名彫胡は餅にして食へる。

藏器曰く、彫胡とは菰蔣草の米のことだ、古代には重要視されたものである。故に内則に『魚は菰に宜し』とある。いづれも水に産するものだ。曹子建の七啓に『芳菰、精稗』とあるは、その二草の實は飯になるものだから謂つたのだ。

頤曰く、菰は水中に生え、葉は蒲、葦のやうだ。その物の苗に莖梗あるものを菰蔣草といふ。秋になつて結ぶ實が彫胡米だ。古代には美饌としたのだが、今は饑饉<sup>うきん</sup>歳にやはり採つて代用食糧にする位のものだ。葛洪の西京雜記に『漢の太液池の邊は全部彫胡、紫籜<sup>しだく</sup>、綠節<sup>りくせつ</sup>、薄叢<sup>はくそう</sup>の類であつた』とある。蓋し菰にして米のあるものをば長安地方では彫胡といひ、菰にして首あるものをば綠節といひ、葭蘆<sup>かろ</sup>にして

(三) 薄、恐クハ蒲ノ誤。



まだ葉の解けぬものをば紫籜といふ。

宗碗そうわん曰く、菰蔣は、花は葦のやうで青い子を結ぶ。細い青麻黄のやうで、長さ寸に幾いものだ。野人はこれを取收め、粟と合せて粥にして食ふ。甚だ饑を濟ふものだ。

時珍曰く、彫胡は、九月に莖が抽き出て葦、苧のやうな花を開き、長さ一寸ばかりの實を結ぶ。降霜後に採る。大いさ茅針ほど、皮は黒褐色で、その米は甚だ白くして滑膩なものだ。飯にすれば香脆なものである。杜甫の詩に『波は菰米を漂はして沈雲黒し』といったのはこのものだ。周禮には、供御に六穀、九穀の數を擧げ、管子の書には、これを鴈膳がんぜんといつてある。故にその米だけを此に收録した。菱、筍、菰、根については別に草部に掲載してある。

氣味

【甘し、冷にして毒なし】

主治

【渴を止める】（穢毒）

【煩熱を解

し、腸、胃を調へる】（時珍）

## 蓬 草 子 (拾遺)

和名 ナシ  
學名 未詳  
科名 未詳

## 釋 名

## 集 解

(一) 牧野云フ、集解ノ文中ニアル飛蓬ヲ單ニ蓬ト稱スル草ダトシテ、小野蘭山ハ之レヲやなぎもぎ一名むかしもぎニ充テタノハ誤リデア  
ル、蓬ハあかざ科ノ一種ノ草デ、ははきギ(地膚)ニ似タモノデア  
ル。

(二) 西南夷トハ雲南地方ヲ指ス。

時珍曰く、陳藏器の本草に蓬草子(ほうそうこ)を載せてあるが、形状の説明がない。余が按ずるに、蓬類は單に一種のものでないので、彫蓬、即ち菰草といふものがあり、——それは菰米の條に記載した——黍蓬、即ち青科といふもあり、又、黃蓬草、飛蓬草といふもある。陳氏は果してその何れの蓬を指していつたものか判らないが、事實から推したところでは、黃蓬でなければ青科を指したものに相違ないやうだ。黃蓬草は、湖、澤の中に生じて葉は菰、蒲のやう、秋期に結實して穂になり、子は細かで彫胡の米ほどのものだ。饑饉年には一般に採つて食ふ。浸し洗つてから曝して春けば苦澀味が取れる。青科は、(三) 西南夷地方で種ふる。葉は莢、黍のやうで、秋期に實を結んで穂になり、赤黍のやうで細かな子があり、その稈は甚だ薄い。曝し春いて炊いて食ふ。又、粟類に七稜青科、八稜青科といふがあり、麥類に青

稗、黄稗といふがあるが、いづれもこの物の類ではなく、異物同名だ。飛蓬といふそのものは藜、蒿の類で、末が大きく本が小さく、風で抜け易いものだから飛蓬と呼ぶのである。子は灰翟菜の子のやうで、やはり饑饉の際の糧になる。又、魏略に『鮑出は、饑饉歳に蓬實を采り、日に數斗を得て母のために食料にした』とあり、西京雜記に『宮中では、正月上辰に池邊に出て鹽灌し、蓬の食物を食つて邪氣を祓ふ』といふことがあるが、これはいづれも采つた場所が如何なるところで、それが何の蓬であつたか判らないが、要するに右の三種の蓬子もやはり甚しい相違のあるものでなからう。

子

氣味

〔酸く澀し、平にして毒なし〕

主治

〔飯にして食へば、饑を

益すること粳米と異らない〕〔穢器〕

茵

草

音は綱（マウ）である。（拾遺）

和名 みのこめ、あつたむぎ  
學名 *Glycyrrhiza nuchifera*, Torr.  
科名 禾本科

（二）牧野云フ、茵草ハ先輩ノ爲セシヤウニ之レヲみのこめニ充テテヨイト思フ。然シ小野蘭山等ハ其實物ヲ間違ヘ、同シ禾

釋名

皇（爾雅）

守田（同上）

守氣（同）

時珍曰く、皇と茵とは音が近いの

本科ノ *Bredmannia*

*cruciformis*, Host.

ナ其品トシテキルノ

ハ實際ニ即セヌ説デ

取ルニ足ラス。此品

ハ其穀コソ大キイガ

其穀粉最少デ使用ス

ルニ足ラスモノデア

ル。關山ハ村民子チ

採テ糲トス又屠者モ

飯トシ食フト記シテ

居レドモ、ソシナ事

ハ一切ナイ。故ニ此

品チ從來ノ如ク、の

こめナドト稱スルハ間違ユエ、私ハ之レニかずのこめノ名稱チ與ヘタ、ソシテみのごめノ稱チ其正品ニ移シテ其邊チ正シクシタ。即

チ茵草チみのごめト稱スル事ハ變リハナイガ其實物ハ違ノノデアル。私ノ稱スルみのごめハ現ニ農夫ガ之レチ田ニ集メテ食用ニ供シテ

居リ、處ニヨツテハたむぎト呼ンデキル。今日植物家ハ通常之レチむつたにぐさト稱ヘテキルガ、ソレハみのごめト呼バネバラヌ。

(一) 大觀ニ茵米ニ作ル。

(二) 牧野云フ、先輩

ノ定ムル所ニ從ヒ先

ヅ下ノ如ク極メテオ

ク、此こまばふむぎ

ハ一ニふてくさト稱

スルモノテ諸州ノ海

濱砂地ニ普通ニ見ル

だ。

集 解

藏器曰く、茵草は水田中に生ずる。苗は小麥に似て小さく、四月に熟

する。飯になるものだ。

時珍曰く、爾雅に『皇は守田なり』とあり、郭璞は『一名守氣といふ、廢田中に

生じ、燕麥に似たもので、子は彫胡のやうで、食へる』といった。

米 氣 味

【甘し、寒にして毒なし】

主 治

【飯にすれば、熱を去り、

腸、胃を利し、氣力を益す。久しく食へば饑ゑぬ】(藏器)

(一) 薺 草 (海 藥)

和 名 こまばふむぎ

學 名 *Carex macrocephala*, Willd.

科 名 かやつりぐさ科(莎草科)

釋 名

自然穀(海藥) 禹餘糧

集 解

藏器曰く、博物志に『東海の洲上に薺といふ草があつて、その實は食

モノデアル。雌雄異  
株テ雌株ニハ實ミが出  
ルカ其形チハ麥ニ似  
テキル、然シ敢テ食  
フニ堪フルモノデハ  
ナイノデ何處ニモ之  
レヲ食ツテキル處ハ  
ナイ、強テ食フナラ  
却テ同シ海邊生ノこ  
うばふしげ (Carex  
pumila Thunb.)ノ  
實ミガ好イト思ハル。

へる。大麥ほどのもので、七月に熟する。その地の民は冬までにその收穫とくわいを訖る。それを自然穀と呼び、また禹餘糧うよりやうともいふ」とあるが、これは石類の禹餘糧とは異ふ。

詢ゆ曰く、藟ろうしの實は毬子のやうなもので、八月に取收める。かの地の人民は常食としてゐるのだが、中國では未だ曾て見たことがない。

時珍曰く、按ずるに、方孝孺集に海米行といふがある。蓋しやはり藟草の類のものだらう。その詩は『海邊に草あり、海米と名く。大にして蓬蒿ほうこうに非ず、小にして薺さいに非ず。婦女籃を携へて晝羣しやくぐんを作し、采り摘んで仍つて海中に於て洗ふ。歸來釜を滌あつて松枝を燒き、米を煮て飯にして朝饑あさうを充みつ。辭ことすること莫なれ苦澀咽みを下らざることを、性命聊しかか須臾しよゐの時を假かる』といふのである。

子 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【饑えず、身を軽くする】(藏

書) 【虛羸きよら、損乏を補し、腸、胃を溫め、嘔逆を止め、久しく服すれば人體を健すこやかにする】(李珣)

「薏苡仁（本經上品）」

和名 はとむぎ  
學名 *Coix Lacryma-Jobi, L. var. frumentacea,*  
*Makino.*  
科名 禾本科

校正

千金方に據つて、草部より此に移し入る。

釋名

釋名 薏苡 音は禮（レイ）である。（本經） 芑實 音は起（キ）である。（別錄）

籼米（別錄） 音は感（カン）である、陶氏は籼珠と書き、雷氏は籼米と書いた。同回

米（救荒本草） 薏珠子（圖經） 時珍曰く、薏苡といふ名稱の意味は判らない。その

葉が籼實の葉に似て解散し、また芑黍の苗に似てゐるところから解散、芑實の名稱がある。籼米といふは、そのものが堅硬で籼強なものといふ意味があり、苗を屋莖と名ける。救荒本草に「同回米は、また西番蜀稗とも呼び、俗に草珠兒と名けるとある。

集解

別錄に曰く、薏苡仁は（二）真定の平澤、及び田野に生ずる。八月に實を採る。根の採收に一定の時期はない。

（一）牧野云フ、往々薏苡ナジゆずだまト訓ズレドモ此レハ下ニ記スルガ如クはとむぎテアル、じゆずだまハ集解ノ文中ニアル菩提子テ其學名ト *Coix Lacryma-Jobi, L.* テアル、此じゆずだまハ多年生本テ野生シテキレドモ、はとむぎハ一年生本テ圃ニ作ラレテキル。

（二）真定ハ草部陽草類紫苑ノ註ナ見ヨ。



(一) 簞、救荒本草ニ  
載ニ作ル。

(二) 梁漢ハ梁州漢  
中。石部特生纂石梁  
州ノ註參照。

弘景曰く、眞定縣は常山郡に屬する。近道處處にあつて、人家で種ゑてゐる。交趾に産するものは子が最も大きく、彼の地では簞珠と呼ぶ。故に馬援は交趾にゐたときこれを餌ひ、中國に齎し還つてから種植したので、人からそれを珍珠として譏されたといふのである。實の重疊せるものを良しとし、仁を取つて用ゐる。



〔苳 苳〕

志曰く、今は梁漢のものを多く用ゐるが、氣は眞定のものに劣る。青白色のものが良し。子を取つて甌中に入れて蒸し、氣を餽せしめて曝乾し、按んで仁を取る。また磨つて取つてもよし。

苳は高さ三四尺、葉は黍葉のやうで、紅白の花を開いて穂になり、五六月に珠子のやうな形で稍長い青白色の實を結ぶ。故に一般に苳珠子と呼ぶのである。小兒が多く線を穿つて貫珠のやうにして玩ぶ。九月、十月にその實を採る。

穀曰く、凡そこれを使用する場合に、糲米といふを用ゐてはならぬ。それは顆が

金芽ハ茅ノ誤。

大きくて味がなく、世間で粳かうかんと呼んでゐるそのものだ。薏苡仁は顆が小さくして色青く、味甘く、咬めば人の齒に粘著するものだ。

時珍曰く、薏苡は一般に多く種くゑるもので、二三月に宿根から自生して葉は初生の芭金芽のやう、五六月に莖が抽き出て花を開き實を結ぶ。二種あつて、一種は牙に粘るもので、尖つてゐて穀が薄い、即ち薏苡である。その米は色白く、糯米のやうなもので、粥、飯にもなり、また麪に磨つて食ひ、米と共に酒にも醸し得る。一種は圓くして殻が厚く、堅硬なもので、即ち菩提子である。その米は少い、即ち粳かうかんであつて、ただ穿ち綴つて經を誦むときの數珠になるだけだ。故に一般にもやはり念珠と呼ぶのである。その根はいづれも色白く、大いさ匙の柄ほどのもの、つれ結ばれたもので、味は甘い。

# 薏苡仁

## 修治

穀曰く、凡そこれを使用するには、每一兩を糯米一兩と共に炒り、熟して糯米を去つて用ゐる。また更に鹽湯で煮て用ゐることもある。

## 氣味

〔甘し、微寒にして毒なし〕 誥曰く、平なり。

## 主治

〔筋急し、拘攣こうれんして屈伸し得ぬもの、久風濕痺。氣を下す。久しく服すれば身を輕くし、氣を

（六）炒、大觀ニ煎ニ  
作ル。  
（七）木村（康）曰ク、  
（成分）はとむぎノ全  
種子ニハ水分一・一

〓、粗蛋白質一六〓、  
 粗脂肪三・六〓、澱粉  
 五〇・三〓、灰分四・  
 九〓、チ合ミ、種仁ハ  
 水分八・五〓、澱粉五  
 一・九〓、粗蛋白質一  
 七・六〓、粗脂肪七・  
 二〓、灰分二・三〓  
 チ含有ス。蛋白質ノ  
 性狀ハ小麥ニ類スル  
 モ、分解ニヨル「ア  
 ミノ酸」ハ「ロイシ  
 ン」、チロジンニ富  
 ミ「グルタミン」酸少  
 ナシト。  
 (藥理)寺坂源雄「鮮  
 醫昭和二(七五)三四  
 五・二、金線蛙及家兎  
 ニ對スル薏苡仁油ノ  
 實驗アリ。  
 (藥用)良好ナル營養  
 品ナリ、肺病ニ管用  
 セリ。利尿及健胃藥  
 トモナス。薏苡仁煎  
 チ連用スレバ壯チ除  
 クニ效アリ。  
 (ハ)積、大瀉ニ吐ニ

益す【本經】「筋骨中の邪氣で不仁なるを除き、腸、胃を利し、水腫を消し、食慾を  
 増進する【別雜】「飯に炊き麪にして食へば、饑ゑず、氣を溫めるの主效があり、  
 煮て飲めば消渴を止め、蛇蟲を殺す【藏器】「肺痿、肺氣の積膿血、欬嗽、涕唾上  
 氣を治す。煎じて服すれば毒腫を破る【甄權】「乾、濕脚氣を去るに大いに效驗があ  
 る【孟詵】「脾を健にし、胃を益し、肺を補し、熱を清し、風を去り、濕に勝つ。飯  
 に炊いて食へば冷氣を治し、煎じて飲めば小便熱淋を利す【時珍】

# 發 明

宗奭曰く、薏苡仁は、本經には「微寒にして筋急、拘攣に主效がある」とあるが、拘攣には二種あつて、素問註の文中に『大筋に熱を受けると縮して短になる。故に攣急して伸びない』とあるものは、これは熱に因つて拘攣するものだ。故に薏苡を用うべきものである。素問に「寒に因るときは筋急する」とあるその場合には更にこれは用ゐられない。蓋し寒を受くれば筋急を發し、寒熱は筋攣を發するものであるが、ただ熱を受けただけで全然寒を受けぬ場合にはやはり筋緩を發し、濕を受ければまた引長して無力になるもの。この藥は力勢が和緩だから、凡そ使用するには、他の藥に倍加して用ゐて效が現はれる。

作ル。  
寒、大觀ニ受ニ  
作ル。

震亨曰く、寒なれば筋急し、熱なれば筋縮する。急は堅強に因り、縮は短促に因るのであつて、濕を受ける場合には弛し、弛すれば引長する。かかる次第で寒と濕とにして熱を挾こまぬといふことは未だ曾てないのであつて、三者いづれも濕に因るのである。しかし外部よりの濕は内部よりの濕が開き發するのでなければ外部よりの濕のみで病とは成り得ないものだ。故に濕から病となるには酒が因となり、魚肉がそれに繼つぐものであつて、甘、滑のもの、燒炙して陳久なるもの、并に辛香のもの、いづれも濕を致すの因である。

時珍曰く、薏苡仁は土に屬し、陽明の藥である。故に能く脾を健にし胃を益するので、『虚するときはその母を補する』が法則だから、肺痿、肺癰はいようにこれを用ゐ、筋骨の病は陽明を治するを根本とするものだから、拘攣、筋急、風痺のものにこれを用ゐ、土は能く水に勝ち濕を除くものだから、泄痢せり、水腫にこれを用ゐるのである。按ずるに、古方の小續命湯の註には『中風で筋急、拘攣し、語遅く、脈の弦するには薏苡仁を加へる』とあるは、やはり脾を扶たすけ、肝を抑おさへる意味だ。又、後漢書には『馬援が交趾にゐた頃、常に薏苡實を餌くひ一身を輕くし、慾を資たすけ、それに因つて瘴

氣に勝つことが出来る』といった』とある。又、張師正の倦游錄には『辛稼軒が突然痼疾を患ひ、重墜して盃ほどの大いさになつたとき、ある道人から、薏苡を東壁土と共に炒り、水で煮て膏にして服する方を教へられ、數服にして消いた。程沙隨がこの疾を病んだときは、稼軒がその方を授けてやはり奏效した。本草では薏苡を上品の藥とし、心を養ふ藥としてある。故にかやうな効果があるのだ』とある。

頌曰く、薏苡仁は心、肺の藥に多く用ゐるものだ。故に范汪が肺癰を治し、張仲景が風濕胸痺を治する方にいづれもこれを用ゐる方法があり、濟生方の肺損咯血を治するには、熟豬肺を切り、薏苡仁末を蘸けて空心に食ふ。薏苡は肺を補するため、豬肺は經に引くためであつて、趙君猷は『屢用ゐて效果があつた』といつてある。

#### 附方

舊五、新九。

【薏苡仁飯】冷氣を治す。薏苡仁をよく舂いて飯に炊いて

食ふ。氣味はなるだけ麥飯のやうにするが佳し。或は粥に煮るも好し。〔廣濟方〕

【薏仁粥】久風濕痺を治し、正氣を補し、腸、胃を利し、水腫を消し、胸中の邪氣を除き、筋脈の拘攣を治す。薏苡仁を末にし、粳米と共に粥に煮て日毎に食ふが良し。〔二〇〕

【風濕身疼】日晡に劇しきには、張仲景の麻黃杏仁薏苡仁湯を主とする。麻



（二）周、大觀ニ胸ニ  
作ル。

黃三兩、杏仁二十箇、甘草、薏苡仁各一兩を水四升で二升到煮取り、二回に分服する。（命脈要略）【水腫喘急】郁李仁いくりん二兩を研つて水で濾し、その汁で薏苡仁飯を煮て、一日二回を食ふ。（獨行方）【沙石熱淋】痛み忍び難きには、玉穂ぎょくしゆを用ゐる。即ち薏苡仁である。子、葉、根いづれも用ゐてよし。水で煎じて熱飲する。夏期には冷飲する。通ずるを度とする。（楊氏經驗方）【消渴飲水】薏苡仁で粥飲を煮、并に粥を煮て食ふ。【（二）周痺緩急】偏なるには、薏苡仁十五兩、大附子十箇を炮やいて末にし、一日三回、方寸匕づつを服す。（張仲景方）【肺痿咳唾】膿血あるには、薏苡仁十兩を杵うき破り、水三升で一升到煎じ、酒少量を入れて服す。（梅師）【肺癰咳唾】心胸の甲錯するには、淳苦酒じゆんくしゆで薏苡仁を濃く煮取り、微温にして頓服する。肺に血あるは吐出して癒えるものだ。（范汪方）【肺癰咯血】薏苡仁三合を搗うき爛し、水二大盞で一盞に煎じ、酒少量を入れて二回に分服する。（濟生）【卒そかに發おこつた喉の癰腫】薏苡仁二箇を吞むが良し。（外臺）【癰疽の潰れぬもの】薏苡仁一箇を吞む。（姚僧坦方）【妊娠中の癰】薏苡仁の煮汁を吞む。頻頻と飲む。（婦人良方補遺）【牙齒の齲痛ちくつ】薏苡仁、桔梗を生で研末して點じ服す。大人、小兒に拘らぬ。（永類方）



根 氣味

【甘し、微寒にして毒なし】

主治

【三蟲を下す】（本經）

【汁麤

に煮て食へば甚だ香しく、虻蟲を去るに大效がある（弘景）【煮て服すれば胎を墮す】（藏器）【卒に發つた心腹の煩滿、及び胸脇痛を治す。剉きざんで煮た濃汁を三升服すれば定まる】（蘇頌）記載は肘後方にある。【搗汁たうじゆに酒を和して服すれば黃疸を治するに有效だ】（時珍）

附方

舊二、新二。

【金の如き黃疸】薏苡根の煎湯を頻に服す。【蛔蟲くわいちゆうの心痛】

薏苡根一斤を切り、水七升で三升に煮て服す。蟲が死んで盡く出る。（梅師）【經水不通】薏苡根一兩を水で煎じて服す。數服に過ぎずして效がある。（海上方）【牙齒の風痛】薏苡根四兩を水で煮て含漱げんそうし、冷えれば易へる。（二二）（延年秘錄）

葉 主治

【飲にすれば氣が香しく、中を益し、膈を空くする】（蘇頌）

【暑期

にこれを煎じて飲めば、胃を暖め、氣血を益す。初生の小兒を浴すれば無病になる】（時珍）記載は瑣碎錄にある。

（二二）大觀ニ外臺秘要ニ作ル。

(一) 罌子粟 (宋開寶)

和名 けし  
學名 *Papaver somniferum, L.*  
科名 けし科 (罌粟科)

(一) 牧野云フ、けしハ希臘竝ニ小亞細亞ノ原産植物デアル、花ヲ實スルモノハ其花色種種アリ、又ハ重咲ナドモアルガ藥用ノ罌片ヲ採ルモノハ、一重咲白花品ヲ賞用スル。

釋名

米囊子 (開寶)

御米 (同上)

象穀

時珍曰く、その實の形狀が罌子の

やう、その米が粟のやうなるを穀に形容し、しかも供御になるといふのでかかる諸種の名稱があるのだ。

集解

藏器曰く、嵩陽子に『罌粟花は、四葉あり、紅白色で上に淺紅の暈子がある。その囊の形は犢頭箭のやうで、中に細米がある』とある。

頌曰く、處處にあるもので、一般に美觀を賞するために多くこれを蒔く。花には紅、白の二種あつて、微かな腥氣がある、その實の形は餅子のやうで、極めて細かな米粒が中にある。耕作者は一年おきに土地に肥料を加へて九月に子を蒔き、冬を経て春になつてから始めて苗が生え、極めて繁茂する。さうせねば生えぬもので、生えたとしても茂らないのである。餅形の實が焦黃色になるを俟つて採收する。

宗奭曰く、その花にはやはり千葉のものがある。一箇の罌中に凡そ數千萬の粒が

あつて、大いさは葶藶子ほどで色は白い。

時珍曰く、罌粟は秋種ゑて冬生える。嫩苗は蔬にして食ふが甚だ美味だ。葉は白  
苣のやうで、三四月に莖が抽き出て青苞を結び、花が開けば苞が脱する。花は凡て



〔罌 子 粟〕

罌は花の中にあつて鬚藥に裹ま  
れ、花は開いて三日で散り、罌は  
莖頭に遺つて、長さ一二寸、大い  
さ馬兜鈴ほどになり、上に蓋があ  
り下に蒂があつて、さながら酒罌  
のやうだ。その中に極めて細かな

白い米があつて、粥に煮、飯に和して食へるが、(三)水で研つて濾した漿と綠豆粉と  
で豆腐にして食ふが就中佳味である。また油も取れる。その殻は藥に入れることが  
甚だ多いのだが、本草に記載のないところを見ると、古代には用ゐなかつたもの  
と見える。江東地方では千葉のものを麗春花と呼ぶ。或はこれを罌粟の別種だとい

(三)大觀ニ水研ノ上  
ニ取子ノ二字アリ。

ふが、それはやはりさうでない。その花には變態があつて、元來一定したものではない。白いものもあり、紅いものもあり、紫のもの、粉紅のもの、杏黃きまつわうのもの、半紅のもの、半紫のもの、半白のものもある。艷麗愛すべきものだから麗春といひ、又、賽牡丹さいたんといひ、錦被花といふ。游黙齋の花譜に詳述してある。

### 米（三）氣味

【甘し、平にして毒なし】宗奭そうしやく曰く、性は寒である。多食すれ

ば二便を利し、膀胱の氣を動ずる。

### 主治

【丹石の發動で飲食の下らぬには、

竹瀝ちやくれきと和して粥に煮て食ふ。極めて美味だ（閩贛）寇く曰く、石藥を服する人は、こ

れを研つて水で煮、蜜を加へて湯にして飲むが甚だ宜し。【風氣を行ひ、邪熱を逐

ひ、反胃はんゐ、胸中の痰滯を治す（瀕）【瀉痢を治し、燥を潤ほす（莊珍）】

### 附方

舊一、新一。

【反胃吐食】罌粟粥——白罌粟米（白）三合、人參末三大錢、

生山芋せいざんぎやう五寸を細に切つて研り、三物を水二升（二）三合で六合に煮取り、生薑汁、及び

鹽花少量を入れ、和勻して分服する。早期と晩期とに拘らず、また他の湯藥、丸藥

を服しても妨げない。（圖經）【赤白泄痢（しやくびやくせつり）】罌粟子を炒り、罌粟殻を炙き、等分を末

にして煉蜜で梧子大の丸にし、三十丸づつを米飲で服す。實際に經驗を経たもの

（三）木村（康）曰く、種子ノ組成（%）ハ粗脂肪四〇—五六、主トシテ「ステアリン」酸、（%）「パルミチン」酸、油酸等ノ「グリセリド」ヨリ成ル、蛋白質一・八、肉一・二、六、粗纖維五・二—五・六、「ペントザン」三—三・六、「アミド」其他一一・八、無窒素物九・五—一〇・六、水分三・九—四・五、灰分五・六—六・三六、尙阿片碱基類ノ二三ハ極メテ僅ニ之ヲ含ムトイフ報告アリ。罌粟子ハ菓子製造ニ

用キラルルモノナル

が、是けし栽培者ニ  
トツテ重要ナル補助  
收入トナルモノナリ  
ト聞ク。

(四) 大觀ニ二ニ作  
ル。

(五) 大觀ニ二ニ作  
ル。

(六) 木村(康)曰ク、  
罌粟殼ハ阿片ヲ採集  
シ、種子ノ成熟シタ  
ル後刈り取り乾燥シ  
種子ヲ除キタルモノ  
ナリ、歐洲産ノモノ  
ハ概ネ未熟葉ヲ採集  
セララルモノニシテ  
切痕ナク形狀モ品種  
ニヨリ一定セズ。

(成分) ハ「メコン」酸  
酒石酸、枸橼酸、「モ  
ルヒン」、「ナルコチ  
ン」痕跡「ババベリ  
ン」及ビ礫質等ヲ含  
ム。

未熟ノ果殼(種子ハ  
除ク)ノ成分ハ「モ  
ルヒン」

だ。(百一選方)

### 殼 修治

時珍曰く、凡そこれを用ゐるには、水で洗ひ潤して蒂、及び筋膜を去り、外薄皮を取つて陰乾し、細かに切つて米醋を拌ぜ、炒つて藥に入れる。また蜜で炒ることもあり、蜜で炙くこともある。

### 氣味

【酸く澆し、微寒にして毒なし】

時珍曰く、醋、烏梅、橘皮と配合

するが良し。

### 主治

【瀉痢を止め、脱肛を固くし、遺精、久効を治し、肺を

斂め、腸を澀し、心腹、筋骨の諸痛を止める】(時珍)

### 發明

呆曰く、收斂し、氣を固くし、腎に入るものだ。故に骨病を治するに就中好適である。

震亨曰く、今一般に、虚勞欬嗽に多く栗殼を用ゐて止劫し、また濕熱泄痢にこれ

を用ゐて止澀する。治病の功力の急速なものではあるが、人を殺すこと劍の如きものでもあるから、深く警戒を要するものだ。又曰く、嗽を治するに多く栗殼を用ゐることは必しも異議はないが、但し豫め病根を去ることが必要であつて、この物は

その後を収める藥である。痢を治するにも同様であつて、凡そ痢の場合には、豫め邪



ルヒン」〇〇・五一  
 〇・二〇、「ナルコチ  
 ン」十「コデイン」〇・  
 〇一、三—〇〇・〇一  
 一六、成熟穀（種子ハ  
 除ク）ノ成分%ハ「モ  
 ルヒン」〇〇・〇一八、  
 「ナルコチン」〇・コデ  
 イン」〇〇・二八〇。  
 （應用）粟殼ハ腹痛  
 咳嗽等ニ煎用ス。

を散じ、滯を行ふことを條件とする。遽に粟殼、龍骨などの藥を投じ、そのために腸、胃を閉塞してよかるべきわけがあらうか。それでは邪氣が補を得ていよいよ甚しくなり、結局變症が發つてますます病を深くし長くして停止するところがない。時珍曰く、酸は收澀を主とするものだ。故に初期の病には用ゐられない。泄瀉、下痢が既に久しきに互れば、氣が散じて固からず、そのために腸が滑して肝が脱する。咳嗽の諸病が既に久しきに互れば、氣が散じて收まらず、そのために肺が脹つて痛が劇しくなる。その場合には、いづれもこれを用ゐて澀し、固くし、收め、斂めるが宜きを得た方法である。按ずるに、楊氏の直指方には「粟殼で痢を治する」とに就ては、一般に甚しく危険視してこれを避ける傾向がある。しかし、長期の下痢で腹中に積痛がないものならば、當然止澀を要するのであつて、澀せぬわけには行かぬのである。この藥劑がなくて何を以て對治し得やうぞ。但し條件として輔佐の藥を要するだけだ』とあり、又、王碩の易簡方には『粟殼は痢を治するに神の如きものだ。ただ性が緊澀で、嘔逆せしめることが多い。故に一般に畏れて敢て服せぬのだが、醋を用ゐて制し、それに烏梅を加へるならば、使用上最も適法を得たも



のだ。或は四君子藥と共に用ゐるが、就中胃を閉ぢ、食を妨げる副作用がなくて奇功を獲るものだ』とある。

### 附方

新八。

【熱痢便血】粟穀を醋で炙いて一兩、陳皮半兩を末にし、三錢づつを烏梅湯で服す。（普濟方）「久痢の止まぬもの」罌粟殼を醋で炙いて末にし、蜜で彈子大の丸にし、一丸づつを水一盞、薑三片で八分に煎じて溫服する。○又ある方では、粟穀十兩を膜を去つて三分にし、一分は醋で炒り、一分は蜜で炒り、一方では生で用ゐ、いづれも末にして蜜で炙子大の丸にし、三十丸づつを米湯で服す。

○集要では、百中散——粟穀を蜜で炙り、厚朴（こくはく）を薑制し、各四兩を細末にし、一錢づつを米飲で服す。生物、冷物を忌む。【小兒の下痢】神仙救苦散——小兒の赤白痢下で晝夜に百回ほどあつて止まらぬを治す。罌粟殼半兩を醋で炒つて末にし、再び銅器で炒り、檳榔半兩を赤く炒つて研末し、各取收めて等分づつを用ゐ、赤痢には蜜湯で服し、白痢には沙糖湯（さとうとう）で服す。口味を忌む。（全幼心鑑）【水泄の止まぬもの】罌粟殼一箇を蒂、膜を去り、烏梅肉、大棗肉（たいそうにく）各十箇を水一盞で七分に煎じて溫服する。（經驗）【久嗽の止まぬもの】穀氣の元來壯なる患者に用ゐて效がある。粟穀を筋

(一) 牧野云フ、阿片ハけしノ果實ノ未熟ナルモノヲ傷ケテ探リシ自乳ヲ乾カシタモノデアツテ、鐵種ノ「アルカロイド」ヲ含ンデキル、其中デ「モルヒネ」ハ能ク人ノ知ツテキルモノデア

ル。  
木村(康)曰ク、阿芙蓉樹阿片ハ未熟ナルけしノ果實ニ淺ク切傷ヲ附シ分過セシ乳液ヲ採集スルモノニシテ、舊製英國ニコ

ッ異ナル、本邦ニ於テハ六〇度ヲ超エザル温度ニテ乾燥シ粉末トス。日本藥局方

を去つて蜜で炙いて末にし、五分づつを蜜湯で服す。(危氏方) 【久效虚嗽】賈同知の

百勞散——多年の嗽で自汗するを治す。罌粟殼二兩半を蒂、膜を去り、醋で炒つて

一兩を取り、烏梅半兩を焙じて末にし、二錢づつを就寢時に白湯で服す。(宣明方)

嫩苗 氣味 【甘し、平にして毒なし】 主治 【蔬にして食へば、熱を除

き、燥を潤ほし、胃を開き、腸を厚くする】(時珍)

(二) 阿芙蓉 (綱目) 和名 あへん 學名 Opium.

### 釋名

阿片 時珍曰く、俗に鴉片あへんと書く。名稱の意味は詳でない。或は、阿とは地方音の我といふ意味で、その花が我が國の芙蓉ふように似てゐるといふところからこの名稱が生じたのであるといふ。

### 集解

時珍曰く、阿芙蓉は前代には聞くことの罕まれなものであつたが、近頃の方には用ゐるものがあつて、その話に據ると『これは罌粟花の津液じつじやくで、罌粟が青苞を結んだとき、午後に、太い針で裏面の硬皮を損せぬやうに外面の青皮だけを三五個處刺して置き、翌早朝、そこに出てゐる津を竹刀で刮り取つて瓷器じきに取收め、陰

品ハ「モルヒネ」含量  
チ「〇・一—」%ト規  
定ス。

(二) 天方國ハ草部陽  
草類番紅花ノ註ヲ見  
ヨ。

(三) 木阿(廉)曰ク、  
(成分)けしヨリ採リ  
タル阿片ニハ純「アル  
カロイド」一〇—  
二五%ヲ含有シ、是  
ノ「アルカロイド」ハ  
メコン酸鹽トシテ含  
有セラル。本邦產阿  
片ノ主要アルカロイ  
ド含量ヲ示セバ「モ  
ルヒネ」五—二四%、  
「ナルコチン」四—七  
%、「ゴデイン」四—  
一〇%、「デバイン」  
〇・四—〇・八%、  
「バベリン」〇・四—  
〇・七%、「ナルツエ  
イン」〇・二—〇・五  
%、其他「グノスコ  
ピン」「ヒドロコタル  
ニン」「コダミン」「ク

乾して用ゐるものだ。それで現に市中で賣るものには、内に苞の片が雜つてゐるの  
だ』といふ。王氏の醫林集要には『これは(三)天方國で種ゑる紅罌粟花であつて、頭  
を水に淹からぬやうにし、七八月花が散つて後、青皮を刺して取るものだ』とある  
が、按ずるに、この花は五月に實が枯れるので、七八月後になほ青皮があらう筈は  
なさうに思はれるが、或はその土地に因つて異ふのかも知れぬ。

(三) 氣味 【酸く澀し、溫にして微毒あり】—主治 【瀉痢し、脱肛して止ま

ぬもの。能く男子の精氣を澀する】(時珍)

### 發 明

時珍曰く、俗間で房中術に用ゐる。京師で售つてゐる一粒金丹は、百  
病を通治するといふが、いづれも方伎家の術である。

### 附 方

新四。 【久痢】 阿芙蓉を小豆ほど溫水に溶かし、一日一回、空心に服す。

葱、蒜、漿水を忌む。渴するときは蜜水を飲めば解す。(集要) 【赤白痢下】 鴉片、木  
香、黃連、白朮各一分を研末し、飯で小豆大の丸にし、壯年の者は一分、老人、  
幻兒は半分を空心に米飲で服す。酸きもの、生のもの、冷えたるもの、油膩のもの、  
の、茶、酒、麴を忌む。止まらぬものなし。口が渴するときは少し米湯を飲む。

リブトピン「ラント  
ピン」「ラウダニン」  
「ラウダニザン」「ラ  
ウダノシン」「メコニ  
ザン」「ネオピン」「ガ  
キシナルコチン」「ガ  
キシザモルフイン」  
「ブソイトババベリ  
ン」「ババベラミン」  
「プロトババベリン」  
「プロトピン」「ロエ  
アザン」「トリトピン」  
「キサシタリン」等ナ  
リ、其他構脂ゴム質  
チ多量ニ含有ス。  
(藥用) 鎮靜スル爲ニ  
盲腸炎、腹膜炎等ニ  
内用ス、局方製劑ト  
シテハ阿片丁幾ドー  
ノル散芳香阿片酒チ  
製ス、又「モルヒネ」  
「コデイン」其他重要  
ナルアルカロイド藥  
劑ノ製造原料ナリ。  
(毒) 斷腸トハ中毒シ  
テ死スルコトナ云  
フ。

○ある方では、罌粟花のまだ開かぬとき、外部を包む兩片の青葉——花が開けば落  
ちる——を取收めて末にし、一錢づつを米飲で服す。神效がある。赤痢には紅花の  
ものを用ゐ、白痢には白花のものを用ゐる。【一粒金丹】眞阿芙蓉一分を粳米飯と  
搗いて三丸にし、一丸づつを服す。なほ效なきときは再び一丸を服す。多く服し  
てはならぬ。醋を忌む。犯せば腸が斷つものだ。風癰には熱酒で服す。口目の喎  
邪には羌活湯で服す。百節痛には獨活湯で服す。正頭風には羌活湯で服す。偏頭  
風には川芎湯で服す。眩運には防風湯で服す。陰毒には豆淋酒で服す。瘧疾には桃  
柳枝湯で服す。痰喘には葶藶湯で服す。久嗽には乾薑阿膠湯で服す。勞嗽には欸冬  
花湯で服す。吐泄には藿香湯で服す。赤痢には黃連湯で服す。白痢には薑湯で服す。  
禁口痢には白朮湯で服す。諸氣痛には木香酒で服す。熱痛には卮子湯で服す。臍下  
痛には燈心湯で服す。小腸氣には川楝茴香湯で服す。血氣痛には乳香湯で服す。脇  
痛には熱酒で服す。噎食には生薑丁香湯で服す。婦人の血崩には五靈脂湯で服す。  
小兒の慢脾風には砂仁湯で服す。(龔雲林醫鑑)

## 本草綱目穀部第二十三卷 終

本草綱目穀部

第二十四卷





本草綱目穀部目錄第二十四卷

穀の三 菽豆類十四種

大豆 本經

大豆黃卷 本經

黃大豆 食鑑

赤小豆 本經

腐婢 本經

綠豆 開寶

白豆 嘉祐

稽豆 拾遺

豌豆 拾遺

蠶豆 食物

豇豆 綱目

藊豆 別錄

刀豆 綱目

黎豆 拾遺 卽ち鯉豆。

右附方 舊五十一、新一百。



# 穀の三 菽豆類十四種

## (一) 大豆 (本經中品)

和名 だいづ  
學名 *Glycine Max. Merr.*  
科名 まめ科(豆科)

### 校正

禹錫曰く、原は大豆黃卷の條下に附してあつたが、ここに一條を分出した。

### 釋名

赤 俗に菽こくと書く。

時珍曰く、豆といひ、赤しやくといふはいづれも莢穀けいこくの

(一) 牧野云フ、元稹大豆ハ本種ノ總名デ種中ニ種種ノ變リ品ガアル、藥用ニハくろまめヲ用ウルノデアルガ此レモ種中ノ一品デアアル、本種ノ學名ハ又 *Glycine Soja*, Sieb. et Zucc. ト稱スルガ此名稱ノ *Soja* ハ醬油ニ基イテノ名デアアル、俗ニ本種ヲ *Soybean* ト呼バル。



〔豆 大〕

諸大豆みな同じ、ただ豆の色にて分つ。

總稱であつて、篆文の赤しやくの字は莢さやが莖こに生り附いて下垂した状態の形容、豆の字は子が莢の中に在る状態の形容だ。廣雅には『大豆は菽なり、小豆は荳たふなり』とある。角を莢さやといひ、葉を藿くわといひ、莖を萁けいといふ。

【集解】

別錄に曰く、大豆は太山の平澤に生ずる。九月に採收する。

頤曰く、今は處處で種ふる。黑白の二種あつて、薬に入れるには黒きものの緊つて小さきものを用ゐ、これを雄とする。使用上就中佳し。

宗奭曰く、大豆には綠、褐、黒の三種あり、大、小の兩類があつて、大なるものは江浙、湖南、湖北に産し、小なるものはその他の地に生ずる。薬に入れての功力は更に佳し。又、礥うづいて腐にして食へる。

時珍曰く、大豆には黒、白、黃、褐、青、斑の數色あつて、黒いものは烏豆うづと名けて薬に入れ、また食料にし、豉を作るに用ゐる。黄なるものは豆腐に作り、油を搾り、醬を造るに用ゐる。その他の種類はただ豆腐にし、また炒つて食ふ位のものである。いづれも夏至前後に種を下し、苗は高さ三四尺、葉は團まるくして尖があり、秋、小さい白花を開き、叢になつて長さ一寸餘の莢を結び、霜が降ると枯れる。按ずるに、呂氏春秋に「時を得たるの豆は莢長く足短く、その莢二七が族をなし、枝多くして數節あり、大菽は圓、小菽は團である。時に先つものは必ず莢長く、葉が浮き、節疎まばららに、莢小さくして實らない。時に後るものは必ず莢短く、節疎まばららに、

(ニ) 牧野云フ、黒大豆ハくろまめ一名くるづテ其豆ノ皮ノ黒イ品デアル、學名ハ *Glycine Max*, Merr. form. *Kurohimo*, *Mukino* (G. *Sin form. Kurohimo*, *Mukino*.) デアル。  
(三) 本村(康)曰ク、(成分)だいづノ葉ハ 燒酸「カルチウム」「ウレアーゼ」「脂肪油」(三一・六〇%)「アミラーゼ」「チモーゲン」藥ハツノ灰分中假性石灰(四五%)、酸化「バクネシウム」(一五・四〇%)等ヲ含ム。

本が虚して實らない』とあり、又、汜勝之の種植書には『夏至に豆を種ゑる。深く耕す必要はない。豆の花は日を見ることを憎むもので、日を見れば黄爛して根が焦れる。その歳の收穫の豊凶を豫知し得るものだ。囊に豆子を盛り、平均量にして陰地に埋め、冬至から十五日後に發掘して量つて見て、最も多いものを種ゑる。蓋し大豆は保蔵には收穫が易く、凶年に對する備となし得るもので、小豆は保蔵でなければ收穫が困難だ』とある。

### 黒大豆

#### 氣味

『甘し、平にして毒なし 久しく服すれば人をして身を重からしめる』岐伯曰く、生では温、熟すれば寒である。

藏器曰く、大豆は生では平である。炒つて食へば極めて熱である。煮て食へば甚だ寒である。豉にすれば極めて冷である。醬に造つたもの、及び生黄卷では平である。牛が食つては温であり、馬が食つては冷である。一體の中に用ゐやうに依て數種の變化がある。

○之才曰く、五參、龍膽を惡む。前胡、烏喙、杏仁、牡蠣、諸膽汁と配合するが良し。

種子(大豆)ノ組成  
 (%)ハ含窒素物三  
 五、脂肪油一七、無  
 窒素物二六、粗纖維  
 五一六、灰分四・五、  
 水分一一・三四。  
 黃大豆ノ乾燥物中ニ  
 ハ脂肪一九・八一ニ  
 三・三、總プロテイン  
 「プロテイン」三二、  
 九一三七・七、可溶性  
 「プロテアーゼ」三一  
 六、無窒素物二四・八  
 一三一・五、主トシテ  
 蔗糖ヨリナル。糖一  
 二、粗纖維四・八一  
 七・七、灰分四・二八  
 一五・七九又消化酵  
 素ハ「カゼイン」、「ヒ  
 ヨレステリン」、「レ  
 チチン」、「アスパラ  
 ギン」、「ロイチン」、  
 「ヒヨリン」、「ヒボキ  
 サンチン」鹽基、「フ  
 エニールアミゼ」プロ  
 ビオンに酸等ヲ含ム。

説曰く、大豆黃屑は猪肉を忌む。小兒が炒豆と猪肉とを食合せれば、必ず壅氣し  
 て十中八九は死亡する。十歳以上はその畏がない。

時珍曰く、草麻子を服したものは炒豆を忌む。これを犯せば脹滿して死を致す。  
 厚朴を服したのもこれを忌む。氣を動ずるものだ。

### 主治

【生で研つて癰腫に塗る。煮汁を飲めば鬼毒を殺し、痛を止める】(本經)

「水脹を逐ひ、胃中の熱痺、傷中淋露を除き、瘀血を下し、五臟の結積、内寒を散  
 じ、烏頭の毒を殺す。炒つて屑にすれば、胃中の熱に主效があり、痺を除き、腫を  
 去り、腹脹を止め、穀物を消化する」(別錄)【煮て食へば溫毒、水腫を治す】(唐本)

【中を調べ、氣を下し、關脈を通じ、金石藥の毒、牛、馬の溫毒を制す】(日華)【煮  
 汁は、礬石、砒石、甘遂、天雄、附子、射干、巴豆、芫青、斑蝥、あらゆる藥の毒、  
 及び蠱毒を解す。藥に入れば下痢臍痛を治す。衝酒すれば風痺、及び陰毒腹痛を治  
 す。牛膽で貯へたものは消渴を止める】(時珍)【黒く炒り熱して酒中に投じて飲めば、  
 風痺の癱緩、口噤、産後の頭風を治す。食後に生で半兩を吞めば、心胸の煩熱、  
 熱風、恍惚を去り、目を明にし、心を鎮め、溫補する。久しく服すれば、顔色を好





作ル。

(六) 大觀ニ灰下ニ汁

字アリ。

(七) 大觀ニ甄權ヲ読  
ニ作ル。

(八) 大觀ニ左慈ヲ左  
元亮ニ作ル。

ものだ。これを導くに鹽を以てすれば、その結果は妙なるわけである。

時珍曰く、按ずるに、養老書に『李守愚は、毎早朝黑豆十四箇を水で吞み、それを五臓穀と謂つてゐた。年老いても衰へなかつた』とある。そもそも豆には五色あつてそれぞれ五臓を治すものだが、黑豆だけは水に屬し、性寒にして腎に對する穀物であり、腎に入るの功果が多い。故に能く水を治し、脹を消し、氣を下し、風熱を制するのであつて、血を活し、毒を解するは、所謂同氣相求めるのである。又按ずるに、古方に、大豆は百藥の毒を解すと稱してあるが、予の毎に實驗したところによると、全然さうでない。ところがまた甘草を加へると不思議なほど著しい效驗を示す。かかる事實は心得て置くべきことだ。

### 附 方

舊三十二、新三十四。

【大豆の服食法】人をして肌膚を長ぜしめ、顔色を益

し、骨髓を填て、氣力を加へ、虚を補し、食を能くする。二劑に過ぎずして效がある。大豆五升を通常醬を作る方法の如くにして黄を取つて末に搗き、猪肪を煉つた膏で和して梧子大の丸にし、五十丸乃至百丸づつを溫酒で服す。神驗の祕方である。肥つた人は服してはならぬ。(延年祕錄) 【饑饉の場合の食料として】博物志に『左慈

(九) 大觀ニ粒ヲ鹿ニ作ル。

(一〇) 大觀ニ先日不食ヲ先不食一日ノ四字ニ作ル。

(一一) 瘦衰、骨立ノ狀ヲ形容セルナリ。

(一二) 太白山ハ今ノ陝西省蘭縣ノ東南ニ在リ。

(一三) 食物本草ニ大上ニ黒字アリ。

の荒年の法、大豆の(一)粒の細に平均したものをを用ゐ、生でよく揉んで光澤を出し、摩擦熱を豆の内部まで徹らせ、(二)豫め一日間絶食してから冷水で頓服する。服し訖つてからは一切の魚肉、菓菜を口に入れてはならぬ。渴けば冷水を飲む。當初には少し弱るけれども、十數日後には體力が壯健になつて食思が起らない』とある。○黃山谷の救荒法は、黑豆、貫衆各一升を煮熟して貫衆を去つて晒乾し、毎日空心に三十五粒を啖ふ。あらゆる木の枝葉を食つても、みな味があつて十分に飽食し得るやうになる。○王氏の農書には『辟穀の方が石刻に載せて遺つてゐる。水旱、蟲荒は孰れの朝代にもあることで、甚しきは金を(三)懷いて鵲の如く立ち、子を易いて骸で炊くといふこともある。民の父母たる者の心得置かねばならぬ法である。昔、晉の惠帝の永寧二年の黃門侍郎劉景先の奏表に

臣(四)太白山ノ隱民ニ遇フテ、濟饑辟穀ノ仙方ヲ傳フ。臣ガ家大小七十餘口、更ニ別物ヲ食セズ。若シ斯ノ如クナラザレバ、臣ガ一家甘ジテ刑戮ヲ受ケン。其ノ方ハ、(五)大豆五斗ヲ用キ、淘淨シテ蒸スコト三遍ニシテ皮ヲ去リ、大麻子三斗ヲ用キ、浸スコト一宿、亦タ蒸スコト三遍シテ口ヲ開カシメテ仁ヲ取り、各搗イテ

〔二四〕一頓ハ俗ニ一カ  
ダケ。

末トナシ、和シ搗イテ團ト爲スコト拳大ノ如クシ、甑内ニ入レテ蒸スコト戌ヨリ  
子ノ時ニ至リテ止メ、寅ノ時ニ甑ヨリ出シ、午ノ時ニ晒シ乾シテ末ト爲シ、乾シ  
テ之ヲ服シ、飽ヲ以テ度ト爲ス。一切ノ物ヲ食スルコトヲ得ザレ。〔第二四〕一頓ニシ  
テ七日饑エザルコトヲ得、第二頓ニシテ四十九日饑エズ、第三頓ニシテ三百日饑  
エザルコトヲ得、第四頓ニシテ二千四百日饑エザルコトヲ得。更ニ必ズシモ服セ  
ズシテ永ク饑エズ。老少ヲ問ハズ、但ダ法ニ依ツテ服食スレバ、人ヲシテ強壯ナ  
ラシメ、容貌紅白ニシテ永ク憔悴セザラシム。口渴スルトキハ、即チ大麻子ヲ研  
ツテ湯ニシテ之ヲ飲ム。轉々更ニ臟腑ヲ滋潤ス。若シ重テ物ヲ喫セント要セバ、  
葵子三合ヲ用キ、研末シテ湯ニ煎ジテ冷服ス。藥ノ金色ノ如クナルヲ取リ下シ、  
諸物ヲ任喫シテ竝ニ損スル所ナシ。

〔二五〕隨州ハ草部山草  
類丹參ノ註ヲ見ヨ。

とある。〔二五〕隨州の前知事朱頤が人民にこの法を用ゐしめて效驗があつたので、そ  
の顛末由來を序述して、漢陽大別山の太平興國寺境内に石に刻して建立した』とあ  
る。○又ある方では、黑豆五斗を淘淨して三回蒸して晒乾し、皮を去つて末にし、  
秋麻子三升を浸して皮を去り、晒して研り、糯米三斗で作つた粥と搗き和して拳ほ

(二六)大觀ニ斗下ニ半  
字アリ。  
(二七)大觀ニ炒豆トア  
リ。

(二八)大觀ニ伍ニ作  
ル。  
(二九)大觀ニ五升テ一  
斗ニ作ル。

どの大いさの劑にし、甌中に入れて一晝夜蒸し、取出して晒して末にし、紅小蘗五斗を煮て皮、核を去つたものと和して拳ほどの大いさの劑にし、再び一夜蒸して飽くを度として服す。もし渴するときは麻子水を飲めば臟腑を滋潤する。それには脂麻でもよし。但し一切の物を食つてはならぬ。「炒豆紫湯」頌曰く、古方に紫湯といふがある。血を破り、風を去り、氣を除き、熱を防ぎ、就中産後二日間に服するに適するものだ。烏豆五升、清酒一斗<sup>一六</sup>を用ゐ、烟の絶えるまで<sup>二七</sup>炒つて酒中に投じ、酒が紫赤色になるを待つて豆を去り、性を量<sup>はふ</sup>つて服す。晝夜に三盞服するがよい、神驗がある。口噤には雞屎白二升と炒り和して投ずる。【豆淋酒の法】宗奭曰く、産後のあらゆる病。或は血熱で餘血、水氣あるを覺え、或は中風で困篤になり、或は背強し、口噤し、或はただ煩熱し、癱瘓<sup>けいしろう</sup>し、口渴し、或は頭部、身體悉く腫れ、或は身體痒く、嘔逆し、直視し、或は手足頑痺し、頭旋し、眼眩する。これはみな虛熱中風である。大豆<sup>二八</sup>三升を微し烟が出るまでに熬つて甌中に入れ、酒<sup>二九</sup>五升を沃<sup>そそ</sup>ぎ、一日以上を経てその酒一升を服し、溫かに被<sup>き</sup>て身體が潤ほふほどに少し汗を出せば癒える。口噤するものには獨活半斤を細かに搥き破つて加へ、同様に酒を



沃ぐ。産後には常服して風氣を防ぐがよし。又、結血を消す。【中風口喎】即ち上記の方を日に一升服す。(千金) 【頭風の頭痛】即ち上記の方を七日間密封して温服する。(千金) 【破傷中風】口噤するには、千金方では、大豆一升を熬つて腥氣(せいき)を去り、熬り過ぎぬ程度にして末に杵き、蒸して蒸氣を平均に廻らせ、甑から取下して酒一升を淋(そそ)ぎ、一升を温服して汗を取り、膏を瘡上に傅ければ癒える。○經驗方では、黑豆四十箇、硃砂(しゆしゃ)二十文を共に研末し、酒半盞で調へて服す。【頸項の强硬】頸の廻らぬには、大豆一升を色が變るまで蒸し、囊に裹んで枕にする。(千金) 【暴(にや)かの風疾】四肢攣縮して歩行不能なるには、大豆三升を淘淨し濕して蒸し、醋二升と瓶中に傾け入れ、それを地上に鋪(し)いてその豆の上に席を設け、それに患者を臥さしめて寢具を五六層に重ね、豆の冷えるに随つて漸次に寢具を減じ、そこで他の一人がその寢具の中で攣急する處を引挽(いんべん)し、更に豆を蒸して同様に再び試み、同時に荆瀝湯を飲む。三晝夜これを試みて休める。(崔氏纂要) 【風の臓中に入りたるもの】急性、慢性の腫風が臓中に入りたるを治す。大豆一斗、水五斗を一斗二升に煮取つて滓(かす)を去り、美(よ)き酒一斗半を入れて九升に煎じ取り、早朝に服して汗を取る。神驗がある。



(二〇)大觀ニ腸ヲ腰ニ  
作ル。

〔千金翼〕「風毒攻心」煩躁し、恍惚たるには、大豆半升を淘淨し、水二升で七合に煮取る、食後に服す。(心鏡) 〔卒風で言語不能のもの〕大豆の煮汁しよじふを煎稠し、飴のやうにして含み、并に汁を飲む。(肘後方) 〔喉痺の言語不能〕上記の法に同じ。(千金) 〔突然の失音〕説曰く、生大豆一升、青竹算子の長さ四寸、濁ひろさ一分のもの四十九箇を水で煮熟し、晝夜に二服すれば瘥える。〔熱毒の眼を攻むるもの〕赤痛し、臉けん浮するには、黑豆一升を十袋に分け、沸湯中で蒸して更互に熨す。三回にして瘥える。(普濟方) 〔突然の中惡〕大豆十四箇、雞子黃けいしわう一箇、酒半升を和勻して頓服する。(千金) 〔陰毒傷寒〕危篤なるには、黑豆を炒り乾して酒に投じて熱飲する。或はこれを灌そそぎ、吐くときはまた飲ませ、汗の出るを度とする。(居家必用) 〔腸の打たれるやうな痛み〕大豆半升を熬焦して酒一升に入れ、煮沸して飲んで酔ふ。(肘後) 〔(二〇)腸、脇の卒痛〕大豆を炒つて二升、酒三升を二升到煮て頓服する。(肘後) 〔卒にはかの腰痛〕大豆六升到水を拌まぜて濕し、炒熱して布に裹んで熨し、冷えれば易へる。これは張文仲の處方である。(延年秘錄) 〔脚氣衝心〕煩悶して人事不省となるには、大豆一升、水三升の濃煮汁のうしじふを服し、なほ定らぬときは再服する。(廣利方) 〔身體、顔面の浮腫〕千

(三)大觀ニ三チニ  
作ル。

金では、烏豆一升、水五升を三升に煮取つた汁に酒五升を入れ、更に三升に煮取り、三回に分服する。瘡えぬときは再び合劑して用ゐる。○王璆の百一選方では、烏豆を皮が乾くまで煮て末にし、二錢づつを米飲で服す。宋の建炎の初年に吳内翰の女孫が突然腫凸を發したとき、吳檢外臺がこの方を得て服せると、立ろに奏效した。

【新、久の水腫】大豆一斗、清水一斗を八升到煮取り、豆を去つて薄酒八升を入れ、再び八升到煎じ取つて服し、再服、三服する。水は小便に従つて出るものである。

(范汪方)『腹中の痞硬』夏、秋の交、夜氣に露されて久しく坐り、ために腹中が痞して多くの石が腹に在るやうに覺ゆるには、大豆半升、生薑八分、水<sup>(二)</sup>三升を一升ほどに煎じて頓服すれば瘡える。(經驗方)『霍亂腹痛』大豆を生で水に研り、方寸匕を服す(普濟方)『水痢の止まぬもの』大豆一升を炒つて白朮半兩と末にし、三錢づつを米飲で服す。(指南方)『赤痢臍痛』黑豆、茱萸子二物を摩りみがいて嚙むが良し。

(經驗)『赤白下痢』方は猪膽の條下に掲げてある。『男子の便血』黑豆一升を炒り焦し、研末して熱酒を淋ぎ、豆を去つて酒を飲む。神效がある。(活人心統)『一切の下血』雄黑豆の緊つて小さいものを皂角湯に微し浸し、炒熟して皮を去つて末にし、煉猪

(二三)大觀ニ盡チ之ニ  
作ル、即百日間ニ之  
ヲ吞ムトヨムナリ。

脂で和して梧子大の丸にし、三十丸づつを陳米飲で服す。(華佗中藏經) 【小兒の沙淋】  
黑豆一百二十箇、生甘草一寸を新水で煮熟し、滑石末を入れて熱に乗じて飲むが良  
し。(全幼心鑑) 【腎虛消渴】難治のものである。黒大豆を炒り、天花粉てんくわふんと等分を末にし、  
糊で梧子大の丸にし、一日二回、七十丸づつを黒豆湯で服す。これを救活丸と名け  
る。(醫濟秘方) 【消渴飲水】烏豆を牛膽中に入れて陰乾し、百日間に吞み(二三)盡せば瘥  
える(肘後方) 【晝夜不眠のもの】新しい布を火で炙あぶつて目を熨し、并に大豆を蒸し  
て交互に囊に入れて枕にし、冷えれば易へる。終夜不斷にこれに枕すれば瘥える。  
(肘後方) 【疫癘の發腫】大黑豆二合を炒熟し、炙甘草一錢、水一盞で汁に煎じて時時  
に飲む。夷堅志に『靖康二年の春、京師に疫が流行したとき、ある異人がこの方を  
壁間に書いて置いていたので、それを用ゐて立ちに效驗があつた』とある。【乳石發動の  
熱】烏豆二升、水九升を銅器で五升到煮取り、その汁を一升到熬稠して飲む(外臺  
祕要) 【礪、砒びの毒を解す】大豆の煮汁を飲むが良し(肘後) 【酒食の諸毒】大豆一升  
の煮汁を服して吐すれば瘥える(廣記) 【諸魚の毒を解す】大豆の煮汁しんじふを飲む(衛生  
方) 【巴豆の毒を解す】下痢して止まぬには、大豆の煮汁一升を飲む(肘後方) 【惡刺

〔三〕大觀ニ飲之ヲ傳  
上ニ作ル。

瘡痛】大豆の煮汁に漬けて瘡效を取る。(千金) 【湯火灼瘡】大豆の煮汁を、<sup>二三</sup>飲む。

瘡を易くして斑がなくなる。(子母秘錄) 【頭を打つて生じた青腫】豆黃末<sup>づわうまつ</sup>を傳ける。

(千金方) 【折傷、墮墜】瘀血が腹に在り、氣短なるには、大豆五升、水一斗の煮汁二升を頓服する。劇しきものも三回に過ぎずしてよし。(千金方) 【豌豆で煩躁するもの】

大豆の煮汁を飲むが佳し。(子母秘錄) 【痘瘡濕爛】黒大豆を研末して傳ける。【小兒の

頭瘡】黒豆を炒つて性を存して研り、水で調へて傳ける。(普濟方) 【身體、面部の疣<sup>い</sup>

目】七月七日に大豆で疣上を拭ひ、三回拭つてから、その豆を本人に南面の屋根の東

側の第二の溜の中へ種<sup>う</sup>ふさせ、その豆に葉が生えたとき、熱湯をそれに沃<sup>そそ</sup>いで枯ら

す。それで癒える。(外臺秘要) 【髪を黒く染める】醋で黒豆を煮て豆を去り、その汁を

煎稠して<sup>二回</sup>染める。(千金) 【牙齒の生えぬもの】多年のもの、大人、小兒に拘らず、

黒豆三十粒を牛糞の中で烟が盡さるまで焼き、研つて麝香少量を入れ、豫め針で挑

破して血を出してから少量を搯<sup>す</sup>る。風に當ててはならぬ。酸、鹹のものを忌む。(經

驗方) 【牙齒の疼痛】黒豆を酒で煮て、その酒で頻りに漱<sup>くわ</sup>ぐが良し。(周密怡然齋抄) 【月

經の斷えぬもの】前に記した紫湯を服するが佳し。【妊娠腰痛】大豆一升、酒三升

(二回)大觀ニ染之ヲ傳  
髮ニ作ル。

(三五)大觀ニ類ニ作  
ル。

(二六)結ハ牡ノ誤。

を七合に煮て空心に飲む。(心鏡) 【胎兒死亡】月數足らず、母が悶絶せんとするには、大豆三升を醋で煮てその濃汁を頓服する。立ろに出る。(産乳) 【胞衣不下】大豆半升、醇酒三升を一升半に煮取り、三回に分服する。(産書) 【時氣の辟穢】新しい布に大豆一斗を盛り、井中に一夜納れて置いて取出し、七粒づつを服するが佳し。(二五)(領要) 【菜中の蛇蠱】蛇毒が中に入つた菜、果を食ふと、蛇蠱といふ病に罹る。大豆を末にして酒に漬け、汁を絞つて半升を服す。【身體上を蟲が行くやうに感ずるもの】大豆を水に漬けて漿を絞り、毎早朝洗ふ。或は少量の芎を加へて髪を沐するも良し。(千金方) 【小兒の丹毒】濃く煮た大豆汁を塗るが甚だ良し。(千金) 【風疽瘡疥】凡そ脚臍、及び臍臑の中が痒く、搔けば黃汁の出るものである。三尺長さの青竹筒の中へ大豆一升を入れ、馬屎と糠の火で燒熏し、滴る汁を器に承け取つて搽る。豫め清んだ汁に鹽を和して洗ふ。三回に過ぎずして極めて效がある。(千金) 【肝虚の目暗】風に向ふと涙の出るには、臘月の(二六)牯牛膽に黑豆を盛つて風の吹く場所に懸け、取り出して毎夜二十一粒づつを吞む。久しく繼續すれば自ら明になる。(龍木論) 【小兒の胎熱】黑豆二錢、甘草一錢に燈心七寸、淡竹葉一片を入れて水で煎じる。(不効心鑑)



ニセ天蛇頭膏ハ手指  
上或ハ足上ニ生シ、  
瘡傍ノ一塊ニ口ヲ開  
キ腫痛スルモノ。

（二九）鼠狼ハ鼯鼠、即  
イタチナリ。

（三〇）大觀ニ瘰癧ノ二  
字ヲ恰容蛇頭ノ四字  
ニ作ル。

【指の天<sup>ニセ</sup>蛇頭瘡】痛み、甚しく臭<sup>くさ</sup>きには、黑豆を生で研末し、繭の中に入れてそ  
れに指を差し込む（瘡急方）

大豆皮

主治

【生で用ゐて痘瘡<sup>いさやうしゅくたい</sup>目<sup>め</sup>醫<sup>い</sup>を療<sup>りやう</sup>ず、嚼<sup>か</sup>み爛<sup>らん</sup>して小兒の尿灰瘡に傅<sup>ふ</sup>け

る】（時珍）

豆葉

主治

【搗<sup>つ</sup>いて蛇咬に傅<sup>ふ</sup>け、頻りに易<sup>か</sup>へて瘡<sup>かさ</sup>を取る】（時珍）記載は廣利

方にある。

發明

時珍曰く、按ずるに、抱朴子内篇に『相國張文蔚の別莊の屋敷に<sup>ニガ</sup>鼠

狼の穴があつて、四匹の子を養つてゐた。ある時その四匹の子が蛇に吞<sup>の</sup>まれたので、  
親の雌雄が劇<sup>げつ</sup>しき驚<sup>おどろ</sup>きと悲<sup>かな</sup>みとの中に、咄<sup>とつ</sup>嗟<sup>さ</sup>に穴の外から土<sup>つち</sup>ぼこりを搔<sup>か</sup>き集めて  
（二九）入口を塞<sup>ふ</sup>ぎ、蛇が出て来るを待ち、頭が出なくなつてのた打<sup>う</sup>つところへ飛びかか  
つて腰<sup>こし</sup>を咬<sup>か</sup>斷<sup>き</sup>り、腹<sup>はら</sup>を食<sup>く</sup>ひ破<sup>やぶ</sup>つて遂に吞<sup>の</sup>まれた四匹の子を取り出した。見るとまだ  
呼吸があつたので、それを穴の外に列べて置いて豆の葉<sup>あひ</sup>を嚼<sup>か</sup>んで傅<sup>ふ</sup>けてやつてゐた  
が、それで四匹共復活した』とある。後世一般に豆の葉で蛇咬を治するは、蓋<sup>おほ</sup>して  
こから出たものである。



附方

新二。

【渴を止める急方】大豆の嫩い苗三五十本に酥を塗つて黄色に炙き末にして二錢づつを人參湯で服す。(聖濟總錄) 【小便血淋】大豆葉一把、水四升を二升に煮て頓服する。(聖惠方)

花 主 治

【目盲、翳膜に主效がある】(時珍)

大豆黃卷

(本經(一)中品)

和名 くろとめのまやし  
洋名 Soybean Sprouts.

釋 名

豆藥

弘景曰く、黒大豆を藥にし、五六寸長さに生えたとき乾したものを黃卷と名ける。用ゐるには熬る。服食に須用のものとしてある。

時珍曰く、ある法では、壬癸の日に井華水で大豆を浸し、芽が生えるを候つて皮を取つて陰乾して用ゐる。

氣 味

【甘し、平にして毒なし】 善曰く、前胡、杏子、牡蠣、烏喙、天雄、

鼠屎と配合し、いづれも蜜で和するがよし。海藻、龍膽を惡む。

主 治

【濕痺、筋攣、膝痛】(本經) 【五臓の不足、胃氣結積、氣を益し、痛を止

め、黒肝こくかんを去り、肌膚、皮毛を潤ほす（別錄）。【婦人の惡血（孟詵）】頤（頤）曰く、古方の產婦人の藥の中に多く用ゐてある。【腎に宜し（思邈）】【胃中の積熱しやくねつを除き、水病の脹滿を消す（時珍）】

附方

新四。

【大豆藥散だいづげつさん】

周痺を治す。周痺とは、邪が血脈中に在る水痺であ

つて、痛まない。上下身體に周あまねきものだから名けたのである。この藥は五臟の留滯、胃中の結聚を治し、氣を益し、毒を出し、皮毛を潤ほし、腎氣を補す。大豆藥一斤を香しく炒つて末にし、一日三回、半錢づつを溫酒で調へて服す（宣明方）。【頭

風濕痺】筋攣、膝痛、胃中積熱、大便結澀。黃卷散——大豆黃卷を炒つて一升、酥

半兩を末にし、一日二回、食前に一匙を溫水で服す（普濟方）。【水病腫滿】脾腸部（脾腸部）が急

し、大小便が澀るには、大豆黃卷を醋で炒り、大黃を炒つて等分を細末にし、早朝

に葱橘皮湯で二錢を服し、利するを度とする（聖濟總錄）。【小兒の撮口さつこう】初生の豆芽

を研り爛して汁を絞り、乳に和して少量を灌ぐが良し（普濟方）。

(一) 牧野云フ、此レハ白豆品デ最モ普通ノモノデアル、通常之レヲだいづト稱スル、彼ノ食用ニスルエだまめ(枝豆)モ此品デアル。

## 黄大豆 (食鑑)

和名 しろまめ  
學名 Glycine Max, Merr.  
科名 まめ科(豆科)

### 集解

時珍曰く、大豆には黒、青、黄、白、斑の數色あつて、黒いものだけを藥に入れ、黄、白豆は炒つて食ひ、豆腐にし、醬を醸造し、油を搾る。日用品として盛に用ゐられるものだから、その性、味に就いての智識が必要だ。

周憲王曰く、黄豆は、苗は高さ一二尺、葉は黒大豆の葉に似て大きく、黑豆の角ほどのやや肥大なる角を結ぶ。その莢、葉の嫩いうちは食料となり、甘美なものだ。

### 氣味

【甘し、溫にして毒なし】時珍曰く、生では溫、炒れば熱であつて、微毒があり、多く食へば氣を壅し、痰を生じ、嗽を動じ、身體を重からしめ、面黄、瘡疥を發せしめる。

### 主治

【中を寛にし、氣を下し、大腸を利し、水脹、腫毒を消す】(寧原) 【研末し、熱水で和して痘後の癰に塗る】(時珍)

### 附方

新一。【痘後に生じた瘡】黄豆を黒く焼いて研末し、香油で調へて塗

る。

豆油

氣味

【辛く甘し、熱にして微毒あり】

主治

【瘡疥に塗り、髮腫

を解す】(時珍)

楷

主治

【焼灰を痣に點け、惡肉を去る藥に入れる】(時珍)

赤小豆 (本經中品)

和名 あづき  
學名 *Phaseolus angularis*, Wight.  
科名 まめ科(豇科)

校正

大豆の條より分離す。

釋名

赤豆(恭) 紅豆(俗) 荅(廣雅) 葉を藿と名ける。時珍曰く、按ず

るに、詩に『黍稷稻粱、禾麻菽麥』とあつて、これは即ち八穀である。董仲舒の註に『菽とは大豆のことで兩種あり、小豆は荅と名けて三四種ある』とある。王禎は『今の赤豆、白豆、綠豆、豇豆はいづれも小豆だ』といつた。此にいふは藥に入れて用ゐる赤い小さいもののことである。

集解

頌曰く、赤小豆は、今は江淮地方で多く種ゑる。

(一) 牧野云フ、あづきは亞細亞ノ原産デ今我邦ニモ普通之ヲ見、重要ナル食料品ノ一トナツデキル、西洋デハ俗ニ Atlantic Bean ト稱スル。

二 江淮ハ今ノ安徽、江蘇地方。

(三) 關西ハ今ノ陝西省中部、及ビ南半。河北ハ今ノ河北省ノ地。汴洛ハ今ノ河南省北半、黄河以南ノ地ヲ指ス。

(四) 木村(康)曰ク、食用植物誌ニヨレバあづきノ組成左表ノ如シ。

種類	水分	蛋白質	脂肪	其 他 含 窒 素	纖維	灰分
下野	12.70	22.01	0.40	55.59	6.44	3.06
北海産	17.00	22.97	0.38	51.67	4.44	3.54

(應用) あづきノ種子ハ單ニ煮テ食ヒ、或

宗奭曰く、關西、河北、汴洛では多くこれを喰ふ。

時珍曰く、この豆は、緊小にして赤黯色なるものを薬に入れる。そのやや大にして鮮紅、淡紅色なるものはみな治病の功がない。いづれも夏至後に種を下し、苗科



〔豆 小〕

諸小豆みな彷彿たり。ただ形にて分つ。

なる割合に成つたとき採收する。煮ても、炒つても、粥、飯、餛飩、餡にしてもいづれも良し。

氣味

【甘く酸し、平にして毒なし】

思邈曰く、甘く鹹し、冷なり。魚鮮

と食合せれば消渴となり、醬に作つたものと飯と食合せれば口瘡となる。藏器曰

く、驢が食へば足が軽くなり、人が食へば<sup>五</sup>身が重くなる。

### 主治

【水<sup>水</sup>腫を下し、癰腫の膿血を排す】<sup>〔本草〕</sup>【寒熱、熱中、消渴を療じ、

洩痢<sup>せうり</sup>を止め、小便を利し、腹脹滿を下す。吐逆<sup>さつぎ</sup>、卒澀<sup>さつぎ</sup>別錄】<sup>〔熱毒を七治し、惡血</sup>

を散じ、煩滿を除き、氣を通じ、脾、胃を健にし、食物の味を美ならしめる。末に

擣き、鷄子白と共に一切の熱毒癰腫に塗る。煮汁で小兒の黃爛瘡<sup>くわらんそう</sup>を洗ふ。三回に過

ぎてはならぬ<sup>〔權〕</sup>【氣を縮し、風を行<sup>や</sup>り、筋骨を堅くし、肌肉を抽く。久しく食す

れば瘦せる<sup>〔土真〕</sup>【氣を散じ、關節の煩熱を去り、人の心孔を開かしめる。暴痢後

の氣滿で食事不能なるには、煮て一頓に食へば癒える。鯉魚に和して煮て食へば甚

だ脚氣を治す<sup>〔譜〕</sup>【小麥の熱毒を解す。煮汁は酒病を解し、衣服の粘綴を解く<sup>〔日華〕</sup>

【瘰癧<sup>ろんぎ</sup>を辟<sup>しりぞ</sup>け、産難を治し、胞衣を下し、乳汁を通ずる。鯉魚、鱖魚、鮒魚、黃雌

雞と和して煮て食へば、いづれも能く水を利し、腫を消す<sup>〔時珍〕</sup>

### 發明

弘景曰く、小豆は津液<sup>じんぎ</sup>を逐ひ、小便を利す。久しく服すれば肌膚を枯

燥せしめる。

頤曰く、水氣脚氣には最も必要なもので、ある者が脚氣を患つたとき、袋にこの

ハ粳米ヲ交セテ飯ニ炊キ、或ハ強飯ニ色ヲ添ヘ、或ハ餛トナシ、或ハ穉葉子等ノ料トナス。葉溫煮シテ醬油ニ浸シ、或ハ胡麻味噌ニ和ヘ以テ食用ニ充ツルコトヲ得ベシ。  
民間ニ脚氣ニ效アリトシテ、種子チ癰茹デニシテ食ス。  
<sup>五</sup>大觀ニ體ニ作ル。  
<sup>六</sup>大觀ニ臍字ナシ。  
<sup>七</sup>大觀ニ治ヲ消ニ作ル。



豆を盛つて朝夕それを踏み轉がさせると、久しくして遂に癒えた。

好古曰く、水を治する場合、單に水を治するだけで胃を補することに注意を缺くと、それがために壅滯せしめるの過失に陷るものだ。赤小豆は水を消し、氣を通じて脾、胃を健にするものだから、その場合に適當な藥である。

藏器曰く、赤小豆は、桑根白皮と和して煮て食へば濕氣痺腫を去る、通草と和して煮て食へば無限に氣を下す。これを脱氣丸と名ける。

時珍曰く、赤小豆は小さくして色が赤い。心の穀である。その性は下行して小腸に通じ、能く陰分に入つて有形の病を治するものだ。故に津液を行り、小便を利し、脹を消し、腫を除き、吐を止めて下痢、腸澼を治し、酒病を解し、寒熱癰腫を除き、膿を排し、血を散じて乳汁を通じ、胞衣、産難を下すのであつて、これはいづれも病の有形なるものだ。久しく服すれば降の作用が太だ過ぎて、津、血が滲洩する結果は肌瘦せしめ、身體を重からしめるものである。かの鼻に吹く瓜蒂散や鹽疫を辟けるに用ゐるのは、やはりその氣を通じ、濕を除き、熱を散ずる作用の應用である。或は、共工氏に不才の子があつて、冬至の日に死んで疫鬼になつた。そ

水官ノ官名ニシテ、  
後ニ氏トナセルモ  
ノ、世江淮ノ間ニ居  
ル、堯ノ時ハ已ニ逐  
ハレテ邊境ニ在リ、  
四國ノ一トセラル。

（み）疝腮トハ兩ノ腮  
ガ腫ルル病、俗ニオ  
タフク風ト云フモ  
ノ。

れが赤豆を畏れたので、それでこの日に小豆粥を作つて禁厭きんえんするのだといふが、これはやはり傳會の妄説だ。又按ずるに、陳自明の婦人良方に『予が家の婦よめは主に菜食で、産後七日間乳脈のけが行らず、藥を服しても效がなかつたが、偶然赤小豆一升で粥を煮て食つたところ、その夜のうちに乳が出た。そこで本草を調べて見ると、やはりこの事が載つてゐた。思ひ寄るままに記して置く』とある。又、朱氏集驗方には『宋の仁宗皇帝がまだ東宮さしきに在したとき（九）疝腮ささいを患ひ、道士贊寧にその治療を命ぜられ、小豆四十九粒を末にして傳けてそれで癒えた。中貴人任承亮が、後に惡瘡を患つて瀕死に陥つたとき、尙書郎傅永が授けた藥で立ろに癒えた。その方を尋ねて見ると赤小豆であつた。予が脇疽けふそに苦んで既に五臟を犯されんとしたとき、ある醫師の治療に用ゐた藥が非常に奏效した。居合せた承亮が「それは赤小豆ではないか」といふと、醫師は恐縮きようしゆくして「實は私はこの方で、只今三十人の家族を養つてゐるやうな次第です。どうぞ公表しないことにして戴きたい」といつた。ある僧が發背で瓜の爛れたやうになつたとき、隣家の乳母がこれで治療してやると神の如き效を奏した。この藥は、一切の癰疽ようそ、瘡疥、及び赤腫は善惡に拘はらず、ただ水で

(一〇) 搗、本草洞玄ニ  
搗ニ作ル。

(一一) 大觀ニ五錢チ一  
分ニ作ル。

(一二) 大觀ニ肘後方ノ  
三字アリ。  
(一三) 大觀ニ男十粒女  
二十粒ニ作ル。

調へて塗る。癒えぬといふことなし。しかしただその性が粘するもので、乾くと容易に<sup>(一〇)</sup>搗けなくなるが、芋根末<sup>ちやいじんまっ</sup>を入れると粘せなくなる。この法は就中佳し』とある。

### 附 方

舊十八、新十九。

【水氣腫脹】<sup>〇</sup>頤曰く、赤小豆五合、大蒜<sup>だいさん</sup>一顆、生薑<sup>せいしょう</sup>二、五

錢、商陸根一條を用ゐ、いづれも碎き破つて水で共に煮爛し、藥を去つて空心にその豆を食ひ、汁を少しづつ全部を<sup>すす</sup>啗る。腫は立ろに消<sup>ひ</sup>く。○韋宙の獨行方では、水腫を治す。脚から起つて腹に入れば死亡する。赤小豆一斗を極端に煮爛して汁五升を取り、温めて足膝を漬ける。已に腹に入つた場合には、ただ小豆を食つて他の雜食を止めればやはり癒える。○梅師の水腫を治する方では、東行花桑枝の燒灰一升で淋汁を取り、赤小豆一升を煮て飯の代に食ふが良し。【水蠱腹大】動搖すれば聲があり、皮膚の黒きには、赤小豆三升、白茅根<sup>はくぼうこん</sup>一握を水で煮て豆を食ふ。消くを度とする。(肘後) 【瘟疫の辟穢】五行書に『正月元日と十五日に、赤小豆十四箇、麻子七個を井中<sup>せいちゆう</sup>に投ずる。瘟疫を辟けるに甚だ效がある』とある。<sup>(一三)</sup> ○又、正月七日に、赤小豆を新布囊に盛り、三日間井中に置いて取出し、男は<sup>(一三)</sup>七粒を、女は十四粒を

吞む。その一个年間病に罹らぬ。【疾病の辟厭】正月元旦に、東に向ひて藳水（さいずい）で赤小豆二十一箇を吞む。一个年間諸病に罹らない。○又、七月立秋の日に、西に向ひて井華水で赤小豆七箇を吞む。その秋一期間痢疾に犯されない。【傷寒狐惑】張仲景曰く、狐惑の病は、脈數が多くして熱がなく、微（ささ）し煩し、默默としてただ臥さんとし、汗が流れ出で、發病三四日間は鳩のやうに目が赤くなり、七八日で目眦（めいゐ）が全部黃黑になる。かくてよく物を食ふものならば膿が已に成つたのである。赤豆當歸散を主として用ゐる。赤小豆三升を水に浸して芽を出させ、當歸三兩と末にし、一日三回、方寸匕づつを漿水で服す。（金匱要略）【下部の卒痛】鳥の喙（くちばし）のやうな形狀になりたるには、小豆、大豆各一升を蒸熟し、二箇の囊を作つてそれに入れ、更互にその上に坐れば止む。（肘後方）【水穀痢疾】小豆一合、鎔（と）かした蠟三兩を頓服して效を取る。（必效方）【熱毒下血】熱物などを食つたことから發動したものは、赤小豆末方寸匕を水で服す。（梅師方）【腸痔下血】小豆（一）三升を苦酒五升で煮熟し、日光で乾して再び浸し、苦酒がなくなるまで繰返してから末にし、一日三回、酒で一錢づつを服す。（肘後方）【舌上の出血】簪（さし）ほどの孔あるには、小豆一升を杵き碎き、水

（二五六）観ニ慢下ニ火  
字アリ。

（二五六）大観ニ二十一箇  
ニ作ル。

三升に和して汁を絞つて服す。（射後方）【熱淋、血淋】男、女に拘らず、赤小豆三合を（二五六）慢に炒いて末にし、葱一莖を煨いて酒に搗り、熱して末二錢を調へて服す。（修真秘旨）【重舌、驚口】赤小豆末を醋で和して塗る。（普濟方）【小兒の言語不能のもの】四五歳にして物を言はぬものである。赤小豆末を酒で和して舌下に傳ける。（千金）【牙齒疼痛】紅豆末を牙に擦つて涎を吐き、また鼻中に吹く、ある方では、銅青少量を入れる。ある方では、花鹼少量を入れる。（家寶方）【酒の中毒で嘔逆するもの】赤小豆の煮汁を徐徐に飲む。（食鑑本草）【頻頻墮胎するもの】赤小豆末を、一日二回、酒で方寸匕づつ服す。（千金）【妊娠中月經あるもの】方は上に同じ。【婦人の難産】産實では、赤小豆七箇を生で飲むが佳し。○集驗では、難産日久しくして氣乏するものを治す。赤小豆一升を水九升で煮て汁を取り、炙いた黃明膠一兩を入れて共に少時煎じ、一回に五合を服す。三四服に過ぎずして産する。【胞衣不下】赤小豆を、産兒の男の場合には七箇、女の場合には十四箇を東流水で吞む。（救急方）【産後の目閉】心悶するには、赤小豆を生で研り、方寸匕を東流水で服す。瘧えぬときは更に服す。（射後方）【産後の悶滿】食事不能なるには、小豆（二五六）十四箇を焼いて研り、冷



二七六觀ニ水ヲ醋ニ  
作ル。

水で服するが佳し。(千金方) 【乳汁不通】赤小豆の煮汁を飲む。(產書) 【婦人の吹奶】赤小豆を酒に研つて溫服し、滓を傳ける。(無氏) 【婦人の乳腫】小豆、莽草等分を末にし、苦酒で和して傳けるが佳し。(梅師) 【癰疽の初期】赤小豆末を(こ)水で和して塗る。毒は直ちに消散する。頻りに用ゐて有效だ。(小品方) 【石癰、諸癰】赤小豆五合を苦酒中に五晝夜納れて置いてから炒つて研り、苦酒で和して塗れば消く。栝樓根等分を加へる。(范汪方) 【痘後の癰毒】赤小豆末を雞子白で調へて塗傳する。【顯頰の熱腫】赤小豆末を蜜で和して塗る。一夜にして消く。或は芙蓉葉末を加へるが就中妙である。【火の如き丹毒】赤小豆末を雞子白で和し、時時に怠らず塗れば手は逐ふて消く。(小品方) 【風癰總癰】赤小豆、荊芥穗等分を末にし、雞子清で調へて塗る。【金瘡煩滿】赤小豆一升を苦酒に一日浸して熬り燥し、再び滿三日間浸して黒色にして末にし、一日三回、方寸匕づつを服す。(千金) 【六畜肉の中毒】小豆一升を焼いて研り、三方寸匕づつを水で服するが神效がある。(千金方)

### 葉

#### 主 治

【煩熱を去り、小便數を止める】(別錄) 【煮て食へば目を明にする】

(日華)



發明

時珍曰く、小豆は小便を利するものだが菴くわくは小便を止める。麻黃は發汗するが根は汗を止めると同様の關係である。物界の現象にはかやうな不思議な點がある。

附方

舊一、新二。【小便頻數】小豆葉一斤を豉汁しじふの中に入れ、煮和して羹にして食ふ（心鏡）【小兒の遺尿】小豆葉を搗いて汁を服す（千金）

芽主治

「妊娠數月にしてともすれば經水の潮するものを漏胎ろうたと名ける。房事などのために起つたものを傷胎と名ける。この物を末にし、一日三回、方寸匕づつを溫酒で服し、效があつたときは止める」時珍記載は普濟にある。

(一) 腐婢

(本經下品)

和名 あづきのほな  
洋名 Flowers of Adzuki Bean.

集解

別錄に曰く、腐婢ふびは漢中に生ずる。小豆の花であつて、七月に採つて四十日間陰乾する。

弘景曰く、花と實とで用途が異ふ。故に品級が同じくないのだ。方家では用ゐない。何故に腐婢なる名稱があるのか判らない。本經にはこれが小豆の花だとはいふ

(一) 牧野云フ、之レチあづき(赤小豆)ノ花ト定ム、集解ノ海邊有小樹云云ノ品ヲ本草綱目啓蒙ニハまぐさ(Premna microphylla, Turcz.)ニ充テテアルガ或ハサウカモ知レナイ。  
(二) 大觀ニ四十日ノ三字ナシ。

(三)大觀二條ニ作ル。

てないが、別錄にさういつてある いづれが正、否とも判ぜられない。現に海岸地方に<sup>じし</sup>厄子のやうな形状の小さい樹で莖、<sup>みづ</sup>葉が多く曲り、腐臭のやうな臭氣のある樹がある。その物をその地の者は腐婢と呼び、瘡の治療に有効で、酒に皮を浸して服すれば心腹の疾を療ずる。これが眞のその物ではないかと思ふ。この條は木部に編入すべきものであらう。

恭曰く、腐婢は葛花だといふことになつてゐる。葛花は酒を消するに大いに<sup>す</sup>勝れたものだが、小豆には全然その効力がない。葛花が眞の物に相違ない。

禹錫曰く、按ずるに、別本に『小豆花にはやはり葛花と同じ腐氣がある。服してから酒を飲めば酔はない』とあつて、本經の酒病を治すとある説と合致<sup>がっち</sup>する。陶、蘇二氏の説はいづれも誤だ。

甄權曰く、腐婢、即ち赤小豆の花である。

頤曰く、海岸地方の小樹と、葛花と、赤小豆花との三物にいづれも腐婢なる名稱はあるが、これは同名異物である。

宗奭曰く、腐婢に關する記載が穀部に在る以上、豆花説の正しいことは兎角の論

議を容れる餘地がない。

時珍曰く、葛花に就いては已にその本條に記載がある。小豆は能く小便を利し、熱中を治し、氣を下し、渴を止める點に於いて腐婢の主治効功と同じであつて、豆花そのものなることに疑ない。但し小豆にも數種あるが、甄氏の藥性論には特に赤小豆だけを指定してあるから、今姑くそれに從ふ。

(白)大觀ニ痰ヲ痰ニ作ル。

(五)大觀ニ核ヲ腫ニ作ル。

### 氣味

【辛し、平にして毒なし】

### 主治

【白痰瘧、寒熱邪氣、洩痢、陰不起、消渴病、酒頭痛を止める】(本經)

○心鏡には『上記の病證には、花を豉汁、五味と共に煮て羹にして食ふ』とある。【酒毒を消し、目を明にし、水氣を下し、小兒の丹毒、熱毒核を治す。氣滿で食事不能なるを散ずるには、煮て一頓に食ふ】(藥性)【熱中、積熱、痔瘻、下血を治す】(時珍) ○宣明方の葛花丸中にこれを用うとある。

### 附方

新二。

【酒を飲んで酔はぬ法】小豆花葉を百日間陰乾して末にし、水

で方寸匕を服す。或は葛花等分を加へる。(千金) 【疔瘡惡腫】小豆花末を傅ける。(普濟方)

(二) 綠豆 (宋開寶)

和名 ぶんどう、やへなり  
學名 *Musculus aureus*, Roxl.  
科名 まめ科(莢科)

(一) 牧野云フ、私ハ此ぶんどうヲ下ノ學名ノモノト定ム、即チ此學名ノ品ハ今日テハ其野生品ハ見ナイガ多分其原產地ハ印度デアラウトノ事デアアル、俗ニ Mur 或ハ Green Gram ト稱スル。

釋名

時珍曰く、綠とは色を以て名けたものだ。舊本に菉と書いたのは正しくない。

集解

志曰く、綠豆は圓くして小なるものが佳く、粉にして食物にし、炙いて食ふが良し。大なるものをば植豆と名ける。苗、子は似たもので、やはり能く氣を下し、霍亂を治す。

瑞曰く、官綠と油綠とがあるが、主たる療病上の效力は同一だ。

時珍曰く、綠豆は處處で種ゑるものだ。三四月に種を下し、苗は高さ一尺ばかりになり、葉は小さくして毛があり、秋になつて小さい花を開き、莢は赤豆の莢のやうだ。粒が粗くして色の鮮かなものが官綠、皮が薄くして粉が多く、粒が小さくして色の深いものが油綠である。皮が厚くして粉が少く、早く種ゑるものをば摘綠と呼ぶ。幾回も摘み取れるものだ。遅く種ゑるものをば拔綠と呼ぶ。これはただ一回

(二) 木村(康)曰ク、  
 (成分)ハ澱粉五五・  
 五七%、脂肪一一・  
 五%、蛋白質二一・  
 二七%、細胞質三・四  
 一四・五%、灰分三・  
 四一四・五%、水分  
 九・四一三%、青酸  
 ナ生成シ得。  
 (應用)種子ハ煮テ食  
 ヒ又綠色ノ餌ヲ作ル  
 ベク、或ハ水ヲ以テ  
 浸漬シ白芽ヲ作り蔬  
 トナス、味佳ナリ。  
 (三) 大觀ニ熱毒ニ作  
 用ス。

抜き取れるだけのものだ。北方地方ではこれの利用が甚だ廣く、豆粥にし、豆飯にし、豆酒にし、燻つても食ひ、麴にしても食ひ、磨つて麴にし、それを水に入れ澄し濾して粉を取り、それを餌、即ち食品とし、餛飩に頓する。一頓は蒸す事を言ふ。皮に盪して豆皮、即ちゆばとし、又粉案に搓る、此等は重要な食品である。又、水で浸濕して生えしめた白芽は菜としても佳品である。牛馬の飼糧も多くこれに頼る。眞に經濟的穀物としての理想的なものである。

### (三) 氣味

【甘し、寒にして毒なし】藏器曰く、これを用ゐるには皮のまま用うべきもので、皮を去れば少し壅氣する。蓋し皮は寒であり、肉は平である。○榧子殼と反し、人體を害ふ。鯉魚鮓と食合せて久しきに互れば、肝黄を發し、渴病と成る。

### 主治

【煮て食へば、腫を消し、氣を下し、熱を壓し、毒を解す。生で研り汁を絞つて服すれば、丹毒、煩熱、風癰、藥石の發動、熱氣奔豚を治す】(爾實) 【寒熱、熱中を治し、泄痢、卒澀を止め、小便秘滿を利す】(思邈) 【腸、胃を厚くする。枕にすれば、目を明にし、頭風、頭痛を治し、(三)吐逆を除く】(日華) 【元氣を補益し、五

臟を和調し、精神を安じ、十二經脈を行らし、浮風を去り、皮膚を潤ほす。常にこれを食ふがよし。煮汁は消渴を止める。（孟詵）【一切の藥草、牛馬、金石の諸毒を解す】（雲原）【痘毒を治し、腫脹を利す】（時珍）

### 發明

時珍曰く、綠豆は、肉は平、皮は寒であつて、金石、砒霜、草木、一切の諸毒を解するには、皮のまま生で研つて水で服するがよし。按ずるに、夷堅志に『ある者が、附子酒を過量に服して頭が斗ほどに腫れ、唇が裂けて血が流れたが、急に綠豆、黑豆各數合を取り寄せ、嚼んで食ひ、并に湯に煎じて飲み、それで解した』とある。

### 附方

新十。

【扁鵲の三豆飲】（てんかうとうりやう）天行豆瘡を治す。豫めこの飲を服すれば、熱毒

を疎解し、たとひ出ても少い。綠豆、赤小豆、黒大豆各一升、甘草節二兩を水八升で極端に煮熟し、任意に豆を食ひ汁を飲み、七日にして止める。○ある方では、黃大豆、白大豆を加へて五豆飲と名ける。【痘後の癰毒】（ようどく）初期に三豆膏で治すれば神效がある。綠豆、赤小豆、黒大豆等分を末にし、醋で調へて時時に刷き塗れば消く。（醫學正傳）【痘の目に入るを防ぐ】綠豆七粒を用ゐ、小兒をして自ら井中に投げ込ま



せ、七遍振り返つて視て還らせる。【小兒の丹腫】綠豆五錢、大黃二錢を末にし、蜜を入れた生薄荷汁で調へて塗る（全効心鑑）。【赤痢の止まぬもの】大麻子を水に研り、濾した汁で綠豆を煮て食ふ。極めて效がある。粥にして食ふもよし（必效方）。【老人の淋痛】青豆二升、橘皮二兩で豆粥を煮て、麻子汁一升を投じて空心に漸次に食ひ、并にその汁を飲む。甚だ效驗がある（養老書）。【消渴飲水】綠豆の煮汁でいづれも粥にして食ふ（普濟方）。【心氣疼痛】綠豆二十一粒、胡椒十四粒を共に研り、白湯で調へて服すれば止まる。【多食して饑ゑ易きもの】綠豆、黃麥、糯米各一升を炒熟して粉に磨り、一盃づつを白湯で服す。三五日で效が現れる。【十種の水氣】綠豆二合半、大附子一箇を用ゐ、附子を皮臍を去つて兩片に切り、共に水三椀で煮熟し、就寢時に空心にして豆を食ひ、次の日はその兩片の附子を四片にして、再び綠豆二合半と前日の如く煮て食ひ、第三日は別の綠豆と附子とで第一日と同じくして煮て食ひ、第四日には第二日と同じくして煮て食ふ。水は小便から下つて腫は自ら消く。なほ消かぬときは再服する。生、冷、毒物、鹽、酒を忌む。六十日繼續すれば奏效せぬといふことなし（朱氏集驗方）。

綠豆粉

〔氣味〕

〔甘し、涼、平にして毒なし〕

原曰く、その膠粘かうねんするものを

ば、脾、胃の虚せる者は多食されぬ。瑞すい曰く、杏仁に近づけてはならぬ。近ければ爛れて索にし得なくなるものだ。

〔主治〕

〔諸熱を解し、氣を益し、酒食の諸毒を解し、發背癰疽、瘡腫、及び湯

火傷灼を治す〕

〔吳瑞〕

〔痘瘡が濕爛して癰疽かびを結せぬには、乾して撲うつが良し〕

〔實原〕

〔新水で調へて服すれば、霍亂轉筋を治し、諸種の藥毒で死して心頭のなほ温なるものを解す〕

〔時珍〕

〔菰菌こきん、砒の毒を解す〕

〔汪穎〕

〔發明〕

時珍曰く、綠豆は色が綠にして小さい。豆にして木に屬するものであ

つて、厥陰けつゐん、陽明に通ずる。その性はやや平である。腫を消し、痘を治する功力は赤豆と同一だが、熱を壓し、毒を解する功力はそれ以上だ。且つ氣を益し、腸、胃を厚くし、經脈を通ずるもので、久しく服しても人體を枯らす嫌がない。ただ涼粉にし、豆酒に造つたものは、或は冷に偏し、或は熱に偏するためによく病を起すことがあるが、それはみな人間が爲すことで、豆その物に咎とがはない。豆粉は綠色にして粘膩ねんじなるものを用ゐるを正しとする。

外科に、癰疽の治療に用ゐる内托護心散といふがあつて、極めて神效あるものとされ、丹溪朱氏は左の如く詳説して宣明した。

震亨曰く、外科精要に『内托散は、發病一日乃至三日に十數服を進めて、毒氣の臟腑に内攻することを免れる』とあるが、更に切實な推究を試みれば、綠豆の丹毒を解し、石毒を治し、味甘くして陽明に入り、性寒にして能く補するを君とし、乳香の惡腫を去り、少陰に入り、性溫にして善く竄するを佐とし、甘草の性緩にして五金、八石、百藥の毒を解するを使としたのであつて、想ふにこの方は、専ら丹石を服して發した疽に對して設けたもので、老年の者、病深き者にして、その證狀が完全に現れ、體の虛せる者の場合であつては、綠豆は補するものとはいひながら、その効果を現はすに堪へないといふ虞がある。五香連翹湯でも、やはり必ずしも適當なものとはいひ兼ねるので、この場合には、必ず氣を助け、胃を壯にし、根本を堅固にして、經に行り血を活かさしめるものを佐とし、參ふるに經絡、時令を以てして毒氣を外發せしめねばならぬものである。かくするが内托の根本的意治方法であつて、治療を施すことが早ければそれで内消するものである。

## 附 方

新十二。

【護心散】又、内托散、乳香萬全散と名ける。凡そ痘疾が發して一日乃至三日以内のものには、これを十餘服連進するがよし。それで變證を免れ、毒氣を外に驅出するものである。服用がやや遅れては毒氣が内攻し、漸次に嘔吐を催し、或は鼻に瘡菌を生じ、食事を攝らずして危篤に陷る。四五日經過してもやはりこれを間服するがよし。眞綠豆粉一兩、乳香半兩を燈心と共に研つて和勻し、生甘草の濃煎湯で調へ、一錢づつを時時に呷ふ。もし毒氣が心に冲し、嘔逆を催ほす證狀のあるときは、大いにこれを服するがよし。蓋し綠豆は熱を壓し、氣を下し、腫を消し、毒を解し、乳香は諸癰腫の毒を消するもので、一兩まで服すれば香が瘡孔中に徹するものだ。眞に聖藥である。（李嗣立外科方）【瘡氣嘔吐】綠豆粉三錢、乾胭脂半錢を研り勻ぜ、新汲水で調へて服す。一服で立るに止む。（普濟）【霍亂吐利】綠豆粉、白糖各二兩を新汲水で調へて服す。直ちに癒える。（生生編）【燒酒の毒を解す】綠豆粉の盪した皮を多く食へば解す。【燒酒の毒を解す】綠豆粉三合を水で調へて服す。【砒石の毒を解す】綠豆粉、寒水石等分を藍根汁で調へて三五錢を服す。（衛生易簡）【諸藥の毒を解す】已に死んでも、ただ心頭の溫なるには、綠豆粉を水で調へて

服す。(衛生易簡方) 【打撲損傷】綠豆粉を新しい銚てうで紫に炒り、新汲水で調へて傳け、杉木皮で縛定する。その效神の如きものだ。これは汀人陳氏が夢傳の方である。(審察方) 【杖瘡疼痛】綠豆粉を炒つて研り、雞子白で和して塗る。妙である。(生生編) 【外腎に生じた瘡】綠豆粉、蚯蚓糞きうりんふん等分を研つて塗る。【暑期の癰瘡ひさう】綠豆粉二兩、滑石一兩を和勻して撲つ。一には蛤粉かふん二兩を加へる。(簡易方) 【一切の腫毒】初期には、綠豆粉を黃黑色に炒り、豬牙皂莢ちんがさうけふ一兩と末にし、米醋で調べて敷く。皮の破れたものには油で調へる。(邵真人經驗方)

豆皮 氣味

【甘し、寒にして毒なし】

主治

【熱毒を解し、目翳を退け

る】(時珍)

附方

新一

【通神散】

癰疽はんとう

で目に翳を生じたるを治す。綠豆皮、白菊花、

(附)本草經疏ニ白サ  
甘ニ作ル

穀精草等分を末にし、一錢づつを、乾柿餅一箇、粟米泔ぞくべいかん一盞で共に煮乾し、一日三回、その柿を食ふ。浅きものは五七日で效が現れ、遠きものも半个月で效が現れる。(直指方)

豆莢 主治

【赤痢の年を経て癒えぬには、蒸熟して隨意に食ふが良し】(時珍)

記載は普濟にある。

豆花

〔主治〕

〔酒毒を解す〕(時珍)

豆芽

〔氣味〕

〔甘し、平にして毒なし〕

〔主治〕

〔酒毒、熱毒を解し、三焦

を利す〕(時珍)

〔發明〕

時珍曰く、諸豆に生える芽はいづれもなまぐさ腥くこは韌くして用ゐられないが、

ただこの豆の芽だけは白美なもので、獨特である。現在では一般に普通のことと考へてゐるが、古代にはまだそれを知らなかつた。但し濕熱、鬱泡うつぱうの氣を受けるものだから、頗る瘡を發し、氣を動ずるもので、綠豆の性とはやや異ふところがある。

豆葉

〔主治〕

〔霍亂吐下には、汁を絞つて醋を和し、少量を溫服する〕(開寶)

白豆

(宋嘉祐)

和名 しろあづき、しやばんまめ  
學名 *Phaseolus angularis*, Wight, var.  
科名 まめ科(豆科)

(一)牧野云フ、あづき(赤小豆)ノ豆ノ白キモノヲ其一品デア

釋名

飯豆



〔集解〕

洗（ひ）曰く、白豆の苗（や）の嫩（ら）いうちは菜にして食へる。生で食ふも妙だ。

穎（えい）曰く、浙東にある一種は味が甚だ勝れ、醬を作り、腐を作るに用ゐて極めて佳し。北方の地にある水白豆といふは、よく似てはゐるがこれには及ばない。

原（げん）曰く、白豆とは飯豆のことだ。粥、飯にいづれも拌（ま）ぜて食へる。

時珍（し）曰く、飯豆は小豆の白いもので、また土黄色のものもある。豆の大きさは綠豆ほどで長く、四五月に種（う）ゑ、苗、葉は赤小豆に似てやや大きくして食へるものだ。莢もやはり小豆に似てゐる。蓂豆（こんづ）といふ一種は、葉は大豆のやうで、飯にもなり、腐にもなる。やはりその類のものだ。

氣味

〔甘し、平にして毒なし〕原（げん）曰く、鹹し、平なり。主 治 〔五臓を

補し、中を調へ、十二經脈を助ける〕（孟詵）〔腸、胃を煖（あたた）める〕（日華）〔鬼氣を殺す。

腎の穀であつて、腎病の者の食物に適する〕（思邈）

葉

〔主治〕

〔煮て食へば、五臓を利し、氣を下す〕（日華）

(一) 魯豆

魯（音ミロ）（拾遺）

和名 未詳  
學名 未詳  
科名 まめ科（豆科）

(一) 牧野云フ、本品ハ未詳ノ種デアル、或ハ大豆屬ノつるまめ (Glycine ussuriensis, Reg. et. Mansch.) ノ様ナモノカ、或ハ赤小豆屬ノやぶつるあづき (Phaseolus trilobus, sit.) カモ知レスガ今遽カニ判然セス、本草綱目啓蒙ニ之レチ黑豆ノ一種ノたんきいさめ（同名ガアル）一名のみまめ、一名くはしまめニ充テアレドモ想像デアル。

釋名

時珍曰く、魯とは自生する稻を呼ぶ名稱であつて、この豆は本來野生のものだからかく名けたのだ。今は一般にこれも下地に種ゑる。

集解

藏器曰く、魯豆は田野に生える小さくして黒いものだ。醬になる。爾雅に『戎菽、一名驢豆。古は豇豆らうづと名く』とあるがこの物だ。

瑞曰く、魯豆とは黑豆中の最も細なもののことだ。

時珍曰く、これは黒小豆のことだ。科が小さく、粒が細かく、霜後に熟する。陳氏がこれを指して戎菽としたのは誤である。爾雅にもやはりこの文はないが、戎菽とは胡豆こづのこと、豇豆とは鹿豆のこと、菜部に掲げてある。いづれも四月に熟する。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【賊風、風痺、婦人産後の冷血を

去る。黒焦くろこげに炒つて熱したところを酒中に投じて漸漸に飲む】（藏器）

(一) 豌豆 (拾遺)

和名 ゑんどう  
學名 Pisum sativum, L.  
科名 まめ科(豆科)

(一) 牧野云フ、豌豆ニ二品アツテ其一チあかえんどうト云ヒ其一チしろえんどうト稱ヘル、あかえんどうハ Pisum sativum L. β. arvense, Truaty. しろえんどうハ P. sativum L. α. genina Truaty. ノ學名ヲ有スル。

(二) 同國ハ石部青琅苣ノ註、同國國ハ同寶石ノ註參照。此ニ時珍ガ『同國即同國』ト註セシハ蓋シ元史記述ノ妄ヲ承ケタルモノナラン。同國ト同國トハ本相涉ラズ同國ト稱セシハ土耳其斯坦ノシル河、アマ河ノ兩流域、即國古ノコラヅム國、及ビ今ノ新疆省カジカキノ地、或ハ今ノ波羅ノ地ニ指ス。同國

釋名

胡豆(拾遺) 戎菽(爾雅) 同鶻豆(遼志) 飲膳正要には同鶻豆と書いてある。三 同國とは同鶻國のことである。畢豆(唐史) 崔寔の月令には躍豆と書いてある。青小豆(千金) 青斑豆(別錄) 麻累 時珍曰く、胡豆は豌豆である。その



〔豆 豌豆〕

苗が柔弱で宛宛たるものだから豌豆と呼ばれるたので、種は胡、或から出たものだ。嫩いときは青色だが、老いると斑麻になるものだ。故に胡、戎、青斑、麻累などの名稱がある。陳藏器の拾遺に胡豆は掲げてあるけれども、但だ『苗は豆に似て、田野の間に生ずる。米の中に往往ある』とある。しかし豌豆にも蠶豆にも胡豆なる名稱がある。陳氏のいふ物は蓋し豌豆のことで、豌豆の粒は小さい

ハ隋、唐ニ蒙古ノ庫倫、科布多地方ニ據ル。同乾可汗ノ國ニシテ、唐末ニソノ地ヲ遷ハレ、元ノ明ニ今ノ新疆省ノ東北部ト魯番、哈密地方ニ據ル。元ニ所謂畏吾兒ノ地ナリ。故ニ遼志ト飲膳正要トノ記載ハ各ソノ傳來地ヲ殊ニスト見ルヲ正トスベキカ。

ものだから米の中にあるのだ。爾雅には、戎菽を荏菽といひ、管子には、山戎から荏菽が出て天下に布くなつたとあり、いづれもその註に『即ち胡豆なり』とある。唐史には、畢豆は西戎回鶻の地面から出たとあり、張揖の廣雅には、畢豆は豌豆、留豆なりとし、別錄の序例には『丸藥は胡豆ほどにする。大なるは即ち青斑豆だ』とあり、孫思邈の千金方には『青小豆、一名胡豆、一名麻累』とあり、鄴中記には『石虎は胡といふを諱んで胡豆を國豆と呼び改めた』とある。この數説はいづれも豌豆を指したものだ。蓋し昔は豌豆を胡豆と呼んだのである。今では蜀地方で専ら蠶豆を胡豆と呼ぶだけで、豌豆を胡豆と名けることは一般人は知らない。又、郷里の方では、豌豆の大なるものを淮豆と呼ぶ。蓋し回鶻と音が近いからだ。

### 集解

時珍曰く、豌豆の種は西胡から出たもので、今では北方の地に甚だ多く、八九月に種を下して苗が生え、蔓のやうに柔弱で鬚があり、葉は莢藜に似て兩兩對生し、嫩いときは食へる。三四月に蛾のやうな形で淡紫色の小さい花を開き、長き一寸ばかりの莢を結ぶ。子は藥丸のやうに圓いもので、また甘草子にも似てゐる。胡地に産するものは大いさ杏仁ほどあり、煮ても炒つても佳し。粉麪に磨れば

(三) 木料(藤)曰ク、  
豌豆ノ未熟ノ果實  
(莢、青豌豆)ハ蔗糖  
「インシット」トツリ  
ゴネリン、レプロ  
ーゼ、ガラクトー  
ゼ、「アラビノーゼ」  
等ヲ含ム、成熟セル  
種子ノ組成(%)ハ含  
窒素物二三・三五、無  
窒素物五二・六五、粗  
纖維五・五七、脂肪  
一・八八、灰分二・七  
五、水分一三・八。而  
シテ澱粉ノ含量ハ凡  
ソ五(%)ニ及ブ、又  
諸種ノ蛋白質酵素等  
ノ他植物鹽基「ツリ  
コネシン」、「ヒヨリ  
ン」及ビ「ベタイン」  
糖ノ鹽基ヲ含ム。

甚だ白くして細膩なもので、あらゆる穀物中で最も先に登るものだ。又、野豌豆といふものがあるが、粒は小さく、役に立たない。ただ苗を茹へるだけのもので、名稱を翹搖けうぎょうといふ。菜部に掲げてある。

(三) 氣味 「甘し、平にして毒なし」 思邈しゐゐ曰く、甘く鹹し、溫、平にして瀉くさし。瑞くわい曰く、多く食へば氣病を發する。

### 主治

【消渴には、淡煮して食ふが良し】(藏器) 【寒熱、熱中を治し、吐逆を除き、泄痢、瀉下へきげを止め、小便、腹脹滿を利す】(思邈) 【營衛を調へ、中を益し、氣を平にする】 煮て食へば鬼毒心病を殺し、乳石の毒發を解す。研末して癰腫、痘瘡に塗る。 澡豆さうづにして用ゐれば野黯かんそうを去り、顔を光澤あらしめる】(時珍)

### 發明

時珍ししん曰く、豌豆は土に屬する。故にその主治たる病は多くは脾、胃に關するものだ。元時代には膳部ぜんぶに毎にこの豆を用ゐたもので、擣ついて皮を去り、羊肉と共に調理して食ひ「中を補し、氣を益す」といつた。今では日用の物となつてゐるが、唐、宋の本草に遺漏したのは學術としての迂濶であつた。千金、外臺の洗面用の澡豆の方に畢豆麪びとを盛んに用ゐてゐるのは、やりその白膩はくじなる點を取つたも

のだ

〔附方〕

新三。

【四聖丹】小兒の痘中に疔があつて、或は紫黒にして大きく、或は黒く壞れて臭く、或は中に黒線あるものを治す。この症は十中の八九まで絶望だが、ただ牛都御史が秘傳を得たこの方を點けるが最も妙である。豌豆四十九粒を燒いて性を存し、頭髮灰三分、眞珠十四粒を炒り、研つて末にし、油、燕脂と共に杵いて膏にし、豫め簪で疔を挑破し、惡血を嘔ひ去つてから少量を點ける。即時に紅活色に變ずるものだ。【服した石藥の毒發】胡豆半升を擣き研つて水八合を入れ、絞つて汁を飲む。直ちに癒える。(外臺)【霍亂吐利】豌豆三合、香棗三兩を末にし、水三盞で一盞に煎じ、二回に分服する。(聖惠)

〔二〕

蠶豆 (食物)

和名 そらまめ  
學名 *Vicia Faba*, L.  
科名 まめ科(豆科)

釋名

胡豆

時珍曰く、豆莢の形狀が老蠶のやうだから名けたものだ。王禎

の農書に『この豆は養蠶期に始めて熟するから名けたのだ』とあるが、それでも通

(一) 牧野云フ、今日我邦ニハ普通ニ之レヲ作り其豆ヲ食料トシ、又其莢葉ヲ綠肥ニ使用スル、一種おなふくまめト云フノハ豆ノ極メテ扁大ナモノデ、通常此レハ料理ニ使ハレテキル。



じる。吳瑞の本草に、これを豌豆ふんそうとしたのは誤だ。この豆の種もやはり西胡から來たもので、豌豆と同名を呼ばれ、同一時期に種くふるのではあるが、しかしその形狀、性質は迥はるかに相異がある。太平御覽に『張騫が外國へ使したとき、胡豆の種を持ち歸つた』とあるはこの豆を指したのだ。今蜀地方にはこれを胡豆こづと呼ぶが、豌豆をば胡豆といはない。

【集 解】

時珍曰く、蠶豆は南方の地で種ふ、蜀中に就中多い。八月種を下し、冬嫩苗ざんべうが生え、それは茹くへる。莖は四角で中が空になり、葉の形狀は匙頭のやうで、



【蠶 豆】  
 胡 豆

本が圓く末が尖り、表面は緑、背面は白で柔かく厚く、一枝に三葉あり、二月に花を開く。その花は蛾がの形のやうで紫白色だ。また豇豆こうづの花のやうでもある。それに結ぶ角さやは大豆のやうで連り合ひ、頗る蠶の形に似てゐる。蜀地

方ではその子を收獲して凶作の歳の備にする。

(二) 木村(康)曰ク、食用穀物誌ニヨレバ、そらまめノ種子ノ組成(%)ハ水分一五・七六、蛋白質二・八八、脂肪一・二九、含水炭素四九・七四、纖維一・二三、灰分三・一一、又 Kerner氏ニヨレバ水分一四、含窒素物二五・六五、無窒素物四七・二九、脂肪一・六八、粗纖維一・二五、灰分三・一〇、織野凡三三・三六ニ對シ、葡萄糖一・二、バグチン(質四、ゴム質四・五、又植物鹽基(或含窒素配糖體)「グイチン」及ビ「コシグイチン」等ヲ含ム。莢ハ「ロイチン」、「アスバラジン」、「チロジン」等ヲ含ム。葉ハ又莢ト共ニ「デオキシフエニルアラニン」ニ富ム。花ノ黒點チナス色素ハ「アントフエイン」ナリ。(應用)種子ヲトリ煮食シ炒リテ食シ、或ハ餡ヲ作り或ハ味噌ノ原料トナス。軟莢モ亦食スベシ。葉ハ燥熱シテ救荒時ノ食料ニ充ツベシ。

(一) 牧野云フ、今日我邦デモ一般ニ作ツテキル、其一種ニ十六ささげ一名ふろうト云フモノガアツテ *V. sesquipedalis* W.

二 氣味 和す(注願)

【甘く微し辛し、平にして毒なし】

主治

【胃を快くし、臟腑を

發明

時珍曰く、蠶豆は、本草には記載がないが、萬表の積善堂方に『ある婦人が誤つて針を呑んだとき、それが腹に入つて、多くの醫師も治療し得なかつたが、ある者に教へられて蠶豆と韭菜とを共に煮て食つたところ、針が大便と共に出た』とある。これはやはりその性の臟腑を利するの例證だ。

苗氣味

【苦く微し甘し、溫なり】

主治

【酒酔の醒めぬには、油、鹽

で炒熟し、湯に煮て灌げば效がある】(願)

## 豆

豆は江(カウ)絳(コウ)の二種の發音がある。

(綱目)

和名 *アサヒ*  
學名 *Vicia faba* L.  
科名 *豆科(豆科)*

釋名

絳豆

音は絳(コウサウ)である。時珍曰く、この豆は紅色のものが大

Er. Wright ノ學名ヲ  
有スル、又はたけさ  
さげト云フ種ガアツ  
テ其學名ハ、(Crot-  
alaria) Muthy テアル。

(二) 未附(藤)曰ク、  
紅豆ハ蠶絲ニミテ種  
類多シ、あづきささ  
げ、しろさげ、じ  
ふろくささげ等はナ

部分で、莢が必ず幾<sup>な</sup>んで生えるから、紅、蜂蟻と呼ぶ名があるのだ。廣雅に、これ  
を胡豆としたのは誤だ。

### 【集 解】

時珍曰く、紅豆は處處で三四月に種える。一種は蔓<sup>つる</sup>が一丈餘の長さに  
なり、一種は蔓が短く、いづれも葉は本が太く末が尖り、嫩<sup>わか</sup>いときは茹<sup>く</sup>へる。花に



〔豆 紅〕

は紅、白の二色あり、莢には白、  
紅、紫、赤、斑駁の數色あつて、  
長きは二尺にもなり、嫩<sup>わか</sup>いときは  
菜として食ひ、老いればその子を  
收穫する。この豆は、菜にもなり、  
菓子にもなり、穀にもなり、用途  
の最も多いもので、豆の中での上  
品であるが、本草に記載の漏れた

のは合點が行かぬ。

### 【氣 味】

「甘く鹹し、平にして毒なし」

### 【主 治】

「中を理し、氣を益し、腎を

成分ハ

品名	水分	蛋白質	脂肪	含水炭素	纖維	灰分
やつき	15.21	21.77	3.18	57.32	1.17	1.39
金さげ	12.90	37.83	17.91	20.54	7.51	4.00

豇豆ハ莢中ノ上品ニシテ嫩莢ヲ煮、或ハ胡麻油、味噌和、芥子同等トナシテ食ヒ、種子ヲ煮食シ或ハ白飯トス、救荒時ニハ其葉ヲ食川ニ供ス。

(一) 牧野云フ、我邦一般ニ栽培ヤラレテ

補し、胃を健にし、五臓を和し、營衛を調へ、精髓を生じ、消渴、吐逆、泄痢、小便頻數を止め、鼠莽の毒を解す。(時珍)

### 發明

時珍曰く、豇豆は、花を開き莢を結ぶに必ず兩兩並び垂れ、そこに習坎の意味がある。豆子は微し曲つて人の腎臓の形のやうになつてゐる。所謂「豆は腎の穀だ」といふはこの豆がそれに當るわけである。昔、盧廉夫が人に腎を補することを教へて、毎日空心に豇豆を煮て少量の鹽を入れて食はせたといふが、蓋しこの意味を知つてゐたものであらう。諸種の疾病の者に與へて差閤ないが、ただ水腫は腎を補することを忌むものだから多食されないだけである。又、袖珍方に「鼠莽の中毒は、豇豆の煮汁を飲めば解す。もしその事實を試みやうとならば、先づ鼠莽の苗を刈つて汁を濃けて見る。根がそれで爛れて生えなくなるものだ」とある。これは物に有する特殊性に因る現象だ。

### 藕

### 豆

藕の音は(へん)である。(別錄中品)

和名 ふちまめ、いんげんまめ(同名がある)  
學名 *Dolichos Lablab, L.*  
科名 まめ科(豆科)

キルモノデ、いんげんまめト云フノが其正名デアッテ、關西地方デハ其名デ呼ンテキル處が少ナクナイ、然シ今日又菜豆即チ *Phaseolus vulgaris*、*L.*、サいんげんまめト呼ブノデ此二ツガ混雜シ固ツタ有様デアアル、然シ此いんげんまめノ名ハ本當ハ前種ノ有スベキモノデアアル、本種ノ黒豆品ヲ鵲豆ト稱スル即チ紫蠶豆デアアル、又白豆品ヲ白蠶豆ト稱シおちまめ又ハひらまめノ名ガアル。

釋名

沿籬豆(俗)

蛾眉豆

時珍曰く、

蠶の字はもと扁と書いた。莢の形が

扁たく、籬に沿ふて蔓延するものだ。蛾眉とは豆の脊に通つてゐる白い路に象つた

ものである。

集解

弘景曰く、蠶豆は人家で籬垣に種ゑてあるものだ。その莢は、蒸して

食ふと甚だ美味だ。

頤曰く、蔓は延びて上り、葉は大きく、花は細かく、花に紫、白の二色あつて、



〔豆 蠶〕 多は莢——  
——いなくじ同く

莢は花の下に生え、その實には黑白の二種あつて、白いものは温だが黒いものは少し冷である。薬には白いものを用ゐる。黒いものは鵲豆と名ける。蓋しその黒い筋が鵲の羽のやうに通つてゐるからである。

時珍曰く、扁豆は二月に種を下し、蔓生して延纏し、葉は盃ほどの大いさで開く



して尖があり、その花の形状は小蛾に翅や尾があるやうだ。莢には凡そ十餘通りあつて、或は長く、或は圓く、或は龍爪、虎爪などのやう、或は猪耳、刀鎌などのやう、種種さまざまだが、いづれも纍纍として枝をなし、白露の節後に實つて更に繁衍する。嫩いうちには蔬菜にもなり、花菓子にもなり、老いれば子を取收めて煮て食ふ。子には黒、白、赤、斑の四種ある。一種は莢が硬くて食へない。ただ豆子の粗く圓くして色の白いものだけを藥に用ゐられる。本草にその區別を記さなかつたのは缺點だ。

### 白扁豆

#### 修治

時珍曰く、凡そ使用するには、殻の硬い扁豆子を取り、皮のまま炒熟して藥に入れる。また水に浸して皮を去る場合、生で用ゐる場合もある。それぞれの方に従ふ。

#### (三) 氣味

【甘し、微温にして毒なし】 詵曰く、微寒である。冷の患者は食つてはならぬ。弘景曰く、寒熱の患者は食つてはならぬ。

#### 主治

【中を和し、氣を下す】(別錄) 【五臟を補し、嘔逆に主效がある。久しく服すれば頭が白くならぬ】(孟詵) 【霍亂吐利の止まぬを療ず。研末して醋に和して服

(二) 本村(廉)曰く、果實未熟ノモノノ組成ハ水分九二・一六、蛋白質二・二六、脂肪〇・一五、含水炭素二・三五、纖維二・四六、灰分〇・六二、種子ノ組成ハ水分一〇



一二、含窒素物一  
八・二一二・五・七、無  
窒素物五四・六二、  
脂肪〇・八一・四二  
粗纖維二・六・六・五  
灰分二・五二・四・九  
四、青酸ヲ發生シ得  
ベシト。

二三 中宮ハ臟腑ヲ指  
スモノナラン。

す〔蘇恭〕【風氣を行り、婦人の帶下を治し、酒毒、河豚魚の毒を解す】〔蘇頌〕【一切の草木の毒を解す。生で嚼み、また煮汁を飲んで效を取る】〔甄權〕【泄痢を止め、暑を消し、脾、胃を暖め、濕熱を除き、消渴を止める】〔時珍〕

### 發明

時珍曰く、硬殼白扁豆は、その子がよく實し、白くして微し黄に、その風は腥香で、性は溫、平にして中和を得てゐる。脾の穀であつて、かの太陰の氣分に入り、三焦を通利し、能く清を化して濁を降すものだ。故に専ら中宮の病を治し、暑を消し、濕を除き、また毒を解するのである。その軟殼のもの、及び黒鵲色のものは性が微涼であつて、ただ食料になるだけだが、やはり脾、胃を調へるものだ。

### 附方

新九。【霍亂吐利】扁豆、香薷各一升、水六升を二升に煮て分服する。

〔千金〕【霍亂轉筋】白扁豆を末にし、醋で和して服す。〔普濟方〕【消渴飲水】金豆丸

——白扁豆を浸して皮を去つて末にし、天花粉汁と蜜とで和して梧子大の丸にし、金箔を衣にかけ、一日二回、二三十丸づつを天花粉汁で服す。炙燂したもの、酒色を忌む。次いで滋腎の藥を服す。〔仁存堂方〕【赤、白帶下】白扁豆を炒つて末にし、二

(同) 塗ハ冷ノ誤。

錢づつを米飲で服す。【毒藥で胎を墮したものの】婦人が草藥を服して墮胎し、腹痛するには、生白扁豆を皮を去つて末にし、米飲で方寸匕を服し、濃煎汁を飲む。丸にして服するもよし。もし胎氣が已に傷れて未だ墮せぬもの、或は口噤し、手強し、自汗し、頭を低れて中風に似た症狀ならば九死一生である。醫師は多くはそれを識らずして風としては治療を施すことがあるが、それでは必ず死亡すること疑ない。【砒霜の中毒】白扁豆を生で水に研り、絞つてその汁を飲む。(いづれも永類方) 【六畜の肉の中毒】白扁豆を焼いて性を存して研り、塗水で服するが良し(華林廣記) 【諸鳥肉の中毒】生扁豆末を冷水で服す。(同上) 【惡瘡癰痒】痛むには、扁豆を搗いて封すれば癰が落ちて癒える。(肘後)

### 花 主治

【婦人の赤白帶下には、乾して末にし、米飲で服す】(蘇頌) 【焙じ研つて服すれば崩、帶を治す。鯢鮓にして食へば泄痢を治す。水に搗つて飲めば一切の藥毒の中毒で死に垂たるを解す。功力は扁豆と同じ】(時珍)

### 附 方

新二。【血崩の止まぬもの】白扁豆花を焙じ乾して末にし、二錢づつを、炒米を煮た飲に鹽少量を入れて調へて空心に服す。即效がある(奇效良方) 【一切

〔五〕 腦、恐クハ略ノ誤

〔一〕 牧野云フ、一般ニ栽培セラレテ其嫩莢ヲ食用ニ供シ其豆ハ食セヌ、豆ハ多少有毒ダト稱スル人ガアル、處ニヨリたてハネト呼バルル、近時藏ガ直立シテ矮生ノモノガアル、之レヲ「なたまめ」(新稱)ト稱スル、即チ其學名トC. grassiaior

の泄痢】白扁豆花の正しく開いた清淨なものを擇り取り、洗はずに滾湯こんたうで瀹ゆき、小豬の脊せ 腦肉一條、葱一根、胡椒七粒を和して醬汁で拌勻し、適度になつたとき、豆花を瀹いた汁で麪を和してそれを包み、小鯢鮓にして炙熟して食ふ(必用食治方)

**葉** **主治** 【霍亂吐下のやまぬもの】(別錄) 【吐利後の轉筋には、生で一把を擣いて酢少量を入れ、汁を絞つて服す。立ろに瘥える】(蘇恭) 【醋で炙いて研つて服すれば瘕疾を治す】(孟詵) 【杵いて蛇咬に傅ける】(大明)

**藤** **主治** 【霍亂には、蘆擇ろく、人參、倉米と等分を煎じて服す】(時珍)

## 刀 豆 (綱目)

和名 なたまめ  
學名 *Canavalia gladiata*, DC.  
科名 まめ科(豆科)

### 釋名

**挾劔豆**

時珍曰く、莢の形から名けたものだ。按ずるに、段成式の酉陽雜俎に『三樂浪に挾劔豆けふけんづといふがある。莢が横斜なに生つたさまが人が劔たちざを挾んだ


やうだ』とあるはこの豆のことだ。

### 集解

穎曰く、刀豆は長さ一尺ばかりのものだ。醬に入れるに用ゐる。

mis. DC. アル。  
 (一) 樂浪ノ鱗部無鱗  
 部類鱗魚ノ註ヲ見  
 目。

(三) 木村(康)曰ク、  
 なたまめノ種子ノ組  
 成(%)ハ水分八一  
 三、蛋白質二・七  
 二・六・八、無窒素物四  
 九・六二、脂肪二・六  
 一三、粗纖維一・一  
 六・六、灰分二・二五  
 一三・八三、果實ハ蛋  
 白質一七・七六、無窒  
 素物六五・一、粗纖維  
 一九・三、灰分三・七  
 九、各種ノ「アミノ」  
 酸酵素等ト共ニ有力  
 ナル「ウレトローゼ」ヲ  
 有ス。民間藥トシテ



〔豆〕 刀

がら名にいふ通りだ。嫩いうちは煮て食ひ、醬で食ひ、蜜で煎してもいづれも佳し。老いると子を取收める。子の大いさは拇指の頭ほどで淡紅色だ。猪肉、雞肉と共に煮て食ふが尤も美味である。

〔氣味〕

【甘し、平にして毒なし】

〔主治〕 【中を溫め、氣を下し、腸、胃

を利し、おくきやく 飢逆を止め、腎を益し、元を補す】(時珍)

〔發明〕

時珍曰く、刀豆は本草に記載がない。ただ近頃の零細な書籍に記事があつて、この豆が元陽を補することを記載し、又『ある者が病後に飢逆が止まず、その聲が隣家まで聞えたが、ある人が刀豆子を焼いて性を存し、二錢を白湯で調へ

時珍曰く、刀豆は一般に多く種くゑるもので、三月種を下し、蔓生で一二丈に引き延び、葉は豇豆の葉のやうでやや長く大きく、五六七月に紫色で蛾の形のやうな花を開き、結ぶ莢は長さは一尺に近く、微し皂莢さうけふに似て扁く、劍脊の三稜がさな

舊籍ニ「子ヲ用ル  
地方アリ」。

(一)牧野云フ、黎豆  
ハ本草綱目啓蒙ニ從  
テ下ノ品ニ充ツルヲ  
正當ト考ヘル、此レ  
ハ我邦テ偶マニ作ラ  
レテキルガ下等ナ豆  
デアル、植物名實圖  
考ニハ黎豆ヲ *Thunbergia*  
*colas* 屬ノつるあづ  
きニ似タ一種ノモノ  
トシテアルガ、釋名  
並ニ集解ノ文ニ考フ  
レバ前者トスル方適  
當デアアル。

て服ませると直ちに止んだ』とある。これはやはり氣を下し、元に歸する意味を應  
用したもので、それで逆が自から止んだのだ。  
おのづ

## (二) 黎 豆 (拾 遺)

### 校 正

和名 はつしやうまめ、おしやらくまめ  
學名 *Sisymbrium Irujo*, *Piper de Tracy*.  
科名 まめ科(莢科)  
草部より此に移し入る。

### 釋 名

狸豆(綱目) 虎豆

藏器曰く、豆子に狸の首の文のやうな文があるか  
ら名けたものだ。時珍曰く、黎はや



〔豆 黎〕  
——豆 爪 熊——

はり黒色をいつたのだ。この豆は、  
莢が老いると黒色になり、毛があつ  
て筋が露れ、虎か狸の指爪のやうに  
なり、その子にも虎、狸の斑のやう  
な點があり、煮れば汁が黒くなる。

故にこれ等の諸名が生じたのだ。

## 集解

藏器曰く、黎豆は江南に生ずる。蔓は葛のやう、子は皂莢子のやうで狸首の文がある。一般に炒つて食ふ。格別の功はない。陶氏の蝸蛇せんじやの註に『黎豆のやうだ』といったのはこれをいつたのだ。爾雅には『諸慮、一名虎涉』とあり、又、巢根の註に『苗は豆のやうだ』といひ、爾雅に『攝は虎巢こなんなり』とあつて、郭璞の註に『江東では巢と呼ぶ。葛に似た藤になり、粗大で林樹に纏蔓し、莢に毛刺がある。一名豆莢とうしやうといふ』とある。これは今の虎豆で、千歲巢のことだ。

時珍曰く、爾雅にいふ虎巢は狸豆のことで、古代には藤を巢といつた。後世のものがその巢を狸なまと訛つたのである。爾雅に、山巢、虎巢とあるは元來二種のものであつて、陳氏がそれを合して一とし、諸慮、一名虎涉といひ、又、これを千歲巢としたのはいづれも誤である。千歲巢は草部に記載してある。狸豆は野生のものだが、山地住民中にはこれを種ゑるものもあつて、三月に種を下せば蔓が生え、葉は豇豆の葉のやうだが、ただ文理が偏斜ちんりになつてゐる。六七月に簇むらつた花を開き、その花の色は紫で、形状は扁豆の花のやうだ。一本の枝に十餘の莢を結び、その莢は長さ三四寸、太さ拇指ほどで白茸毛はくじんもうがあり、老いれば黒くなつて筋が露れ、宛ら乾いた



(一) 木村(康)曰ク、  
種子ハ二%ノ脂肪油  
ト共ニ「バルミチン」  
酸、ステアリン酸、  
油酸(?)其他植物鹽  
基、鞣酸等ヲ含ム。  
種子ヲ煮テ食用トス  
多食スレベ逆上スル  
氣味アリ。

熊の指の爪のやうな形状になる。その子の大いさは刀豆の子ほどで、淡紫色で狸の文のやうな斑點がある。煮て黒汁を去り、猪、雞の肉と再び煮て食ふと味が佳くなる。

三 氣味

【甘く微し苦し、溫にして小毒あり】 多く食へば人をして悶せしめ

る。

主治

【中を溫め、氣を益す】(時珍)

本草綱目穀部第二十四卷 終



本草綱目穀部

第二十五卷



本草綱目穀部目錄第二十五卷

穀の四 造釀類二十九種

大豆 鼓 別錄

豆黃 食療

豆腐 日用

陳廩米 別錄

飯 拾遺

青精乾石餽飯 圖經

粥 拾遺 諸藥粥を附す。

麩 拾遺

米饅 綱目

糴 綱目

寒具 綱目

蒸餅 綱目

女麴 唐本

黃蒸 唐本

麴 嘉祐

神麴 藥性

紅麴 丹溪補遺

蘖米 別錄 即ち麥芽、穀芽。

飴糖 別錄

醬 別錄

榆仁醬 食療

燕荑醬 食療

醋 別錄

酒 別錄 諸藥酒を附す。

燒酒 綱目

葡萄酒 綱目

糟 綱目

米粃 食物

春杵頭細糠 別錄

右附方 舊八十、新一百。





# 穀の四 造釀類二十九種

## 大豆豉 (別錄中品)

和名 からなつとう  
洋名 Bean relish.

### 釋名

時珍曰く、按ずるに、劉熙の釋名に『豉は嗜である。五味を調和して甘嗜にする』とある。許慎の説文に、豉を『配鹽幽菽』といつてあるは鹹豉のことである。

### 集解

弘景曰く、豉は、(一)襄陽、(二)錢塘に産するものが香美にして濃い。藥に入れるには中心のものを取つて用ゐるのが佳し。

藏器曰く、(三)蒲州の豉は味が鹹い。作る方法が諸種の豉と異ふので、その味が烈いのだ。(四)陝州にある豉汁は、(五)十年経ても腐敗せぬ。藥に入れるには今用ゐてゐる豉心に如くはない。それは鹽がないからである。

詵曰く、陝府の豉汁が通常の豉に比して甚だ勝れてゐる。その釀造法は、大豆を黃に蒸し、一斗に對てし鹽四升、椒四兩を加へ、春は三日、夏は二日、置いて半熟

(一)襄陽ハ石都握等  
礬石ノ註チ見ヨ。  
(二)錢塘ハ石都石膏  
ノ註チ見ヨ。  
(三)蒲州ハ石都石膽  
ノ註チ見ヨ。  
(四)陝州、陝府ハ石  
都石鍾乳ノ註チ見  
ヨ。  
(五)大觀ニ十字ナシ。  
(六)大觀ニ冬五日ノ  
三字アリ。

となつたとき、生薑五兩を加へるのである。十分潔淨であり、且つ精良なものである。時珍曰く、豉は諸大豆いづれも造れるものだが、黑豆で造つたものを薬に入れ、淡豉と鹹豉とあるが、治病には多く淡豉を用ゐる。汁、及び鹹かんいものはそれぞれの方に従つてその方法を取つて用ゐる。豉心と稱するは、豉を合せてあるその内の中の部分から取出して用ゐるをいふのであつて、皮を剥はいで心を取るといふのではない。この説は外臺祕要に記載されてある。

淡豉製造法——黒大豆二三斗を用ゐる。時期は六月中。その豆を淘たう淨じやうし、一夜水に浸してからその水を切つて乾し、蒸熟して蓆の上に取出して攤ひらげ、微温になるを候まつて蒿かうで覆ふひ、三日に一回づつ覆ふた中を見て、黄衣が全面にかつたとき取り出す。黄衣が厚くかかり過ぎてはならぬ。それを晒して清淨せいじやうに簸ふるひ、水を拌まぜて乾濕の適度を計り、汁が指の間につく位を程度として甕そう中にぎつゝに填つめ、桑葉で厚さ三寸に蓋ひ、泥で目塗をし、それを七日間日中に晒してから取出して一時曝し、また水を拌まぜて甕そうに入れる。かく七回繰返してから再び蒸し、攤ひげて火氣を去つてから甕そうに收めて、よく押し詰めて封じて置けば出

來上る。

鹹豉製造法——大豆一斗を用ゐ、水に三日間浸して洵り、蒸して攤げ、それを置ひ、黄衣のかかるを候つて取出して簸ひ清め、水で洵つてから灑して乾し、それを四斤毎に鹽一升、薑絲半斤、椒、橘、蘇、茴、杏仁きやうにんを入れてよく拌ぜ、甕に入れて水を表面から一寸深さまでに浸し、箬じやくで蓋ひ、口を封じて一个月晒して置けば出來上る。

豉汁を造る法——時期は十月から正月まで。好き豉三斗を用ゐ、清麻油を烟がなくなるまで熱つて一升をその豉に拌ぜて蒸し、攤し冷して晒し乾し、また拌ぜて再び蒸す。かく三回繰返してから、白鹽一斗と搗きつ和して湯で淋汁三四斗を取り、清淨な釜に入れて椒、薑、葱、橘、絲を投じ、共に煎じて三分の一を減じたとき、外部に津液しんえきの滲出せぬ器に貯藏する。かくすれば香氣の非常に勝れたものが出來上る。

また豉、瓜豉くわし、醬豉などさまざまのものも造れるが、それは食品に供し得るだけのもので藥用には入れない。

淡鼓 氣味 【苦し、寒にして毒なし】 思邈曰く、苦く甘し、寒にして瀋る。

醢けと配合するが良し。 杲曰く、陰中の陰である。

主治

【傷寒で頭痛し、寒熱するもの、瘴氣惡毒で煩躁し、滿悶するもの、虚勞で喘吸するもの、兩脚の疼冷。六畜胎子の諸毒を殺す】（別錄） 【時疾熱病を治し、汗を發す。熬つて末にしたものは、能く盜汗を止め、煩を除く。生で搗いて丸にして服すれば、寒熱風で胸中に瘡の生じたるを治す。煮て服すれば、血痢、腹痛を治す。研つて陰莖に生じた瘡に塗る】（藥性） 【瘧疾、骨蒸、藥の中毒、蠱氣、犬咬を治す】（大明） 【氣を下し、中を調へ、傷寒、溫毒、發癍、嘔逆を治す】（時珍） 千金の溫毒を治する黑膏中にこれを用ゐてある。

蒲州鼓

氣味

【鹹し、寒にして毒なし】

主治

【煩熱熱毒、寒熱虚勞を

治し、中を調へ、汗を發し、關節を通じ、腥氣を殺す。傷寒鼻塞。陝州の鼓汁もやはり煩熱を除く】（藏器）

發明

弘景曰く、鼓は食事の際に常に用ゐる。春、夏期の（七）氣不和には、蒸し炒つて酒に漬けて服するが至つて佳し。康伯の法に依ると、先づ醋、酒を洩ぜ、

（七）大觀ニ春夏之氣  
ニ春夏天氣ニ作ル。

(ハ)大觀ニ飲ヲ浸ニ  
作ル。

蒸して曝し燥し、麻油を和して再び蒸して曝し、凡そ三回繰返してから、末椒、薑を和して調理するのであつて、食欲を進める點に於て當今の油豉に甚だ勝るものだ。脚疾を患ふ人は、常に酒に漬けたものを<sup>ハ</sup>飲み、滓を脚に傳ける。いづれも瘥える。頤曰く、古今の方書に、豉を治病に用ゐた事實がなかなか多い。江南地方では豉を善く作る。凡そ時氣に罹つた場合には、取りあへず葱豉湯<sup>そうしだう</sup>を服して汗を取れば往往にして瘥えるものだ。

時珍曰く、陶氏の説の康伯豉法は博物志に記載があつて『もとは外國に産したものだ』とある。中國で康伯と謂ふは、その方法を傳來した人の姓名だ。この豉は中、下の氣を調へるに最も妙なるものである。黑豆の性は平であるが、豉に作れば溫となり、一旦蒸罏<sup>じやうあん</sup>の加功を経てゐるものだから、能く<sup>のほ</sup>升り、能く散じ、葱と配合すれば汗を發し、鹽と配合すれば能く吐し、酒と配合すれば風を治し、薤<sup>わい</sup>と配合すれば痢を治し、蒜<sup>さん</sup>と配合すれば血を止め、炒熟すればまた能く汗を止める。やはり麻黃の根と節とのやうな意味である。

【附方】

舊三十一、新十八。

【傷寒に汗を發す】頤曰く、葛洪の肘後方に『傷寒に

(九)大觀ニ身ヲ肉ニ作ル。

(一〇)大觀ニ此處ニ若不汗ノ三字アリ。

(一一)大觀ニ傷寒不止ヲ傷寒汗出ニ作ル。

數種あつて、凡庸の者には卒かに區別はつかないものだ。ここにこの一葉でそれだけのものを兼ね療ずる。凡そ初めは頭痛し、<sup>(九)</sup>身熱あるを覚え、脈洪にして一二日のものは葱豉湯で治す。葱白一虎口、豉一升を綿で裹み、水三升で一升に煮て頓服し、汗を取る。<sup>(一〇)</sup>更に作るときは葛根三兩を加へ、再び汗せぬときは麻黄三兩を加へる。○肘後の又ある方では、葱湯で煮た米粥に鹽豉を入れて食つて汗を取る。○又ある方では、豉一升を男童の尿三升で一升に煎じ、分服して汗を取る。【傷寒の解せぬもの】傷寒が<sup>(一一)</sup>解せぬのみに止らず、已に三四日にして胸中の悶惡するに、豉一升、鹽一合、水四升を一升半に煮て分服し、吐を取る。これは祕法である。<sup>(梅師方)</sup>【溫疫の辟除】豉に白朮を和し、酒に浸して常服する。<sup>(梅師)</sup>【傷寒懊憹】吐下の後に心中が懊憹するもの、甚しく下して後身熱が去らずして心中の痛むものは、いづれも<sup>(一二)</sup>梔子豉湯を用ゐて吐かす。肥梔子十四箇を水二盞で一盞に煮て豉半兩を入れ、共に七分までに煮て滓を去つて服す。吐が止んで後に服するのである。<sup>(傷寒論)</sup>【傷寒の餘毒】傷寒後に毒氣が手足、及び身體を攻めて虚腫するには、豉五合を微し炒つて酒一升半と共に煎じ、五七沸して適宜に飲む。<sup>(簡要濟衆)</sup>【傷寒の目翳】燒



(二)大觀ニ肘後ヲ傷寒類要ニ作ル。

(三)大觀ニ藏毒下血不止ニ作ル。

豉十四箇を研末して吹く。(一)(肘後)【傷寒暴痢】藥性論に『豉一升、薤白一握、水三升を用ゐ、薤を煮て熟したとき豉を納れ、更に煮て色が黒くなつたとき豉を去り、二回に分服する。』(三)血痢の止まぬもの』豉、大蒜等分を杵いて梧子大の丸にし、三十丸づつを鹽湯で服す。(王氏博濟)【血痢で刺すやうに覺えるもの】藥性論に『豉一升を水に漬けて淹し煎じ、兩沸して汁を絞つて頓服する。瘥えぬときは再び作つて用ゐる。』【赤、白重下】葛氏は、豆豉を熬つて少し焦し、一日三回、搗いて一合を服す。或は炒り焦して水に浸し、その汁を服しても效驗がある。○外臺では、豉心を炒つて末にし、一升を四回に分けて酒で服す。口に入れば止まる。【臟毒下血】烏犀散——淡豉十文、大蒜二箇を煨き、共に擣いて梧子大の丸にし、一日二回、二十丸づつを香茶の煎湯で服し、平安を得れば止める。永く根本を絶つ。忌むものなし。○盧州の彭大祥は『この藥は甚だ妙なるものだ。但し大蒜で丸にして蒸すが佳し。それを冷鹽水で服するのである。曾て朱元成が「私の姪、及び陸子楫提刑がいづれもこれを服し、數十年の疾が更に作らなくなつた」と話した』といつた。(宛原方)【小便血條】淡豆豉一撮の煎湯を空腹に飲む。或は酒を入れて服す。(簡氏得效方)【瘧疾寒

熱】豉を煮た湯を數升飲んで大いに吐すれば癒える。（肘後方）【小兒の寒熱】惡氣人に中るには、濕豉を研つて雞子大の丸にし、それで腮上、及び手、足の心を六七回摩し、また心、臍上をそろそろ摩で廻しながら咒文を唱ひ、それが了るとその豉丸を破つて見て、中にある細い毛を道路に棄てる。それで癒える。（食醫心鏡）【盜汗の止まぬもの】豉一升を微し炒つて香しくし、清酒三升到三日間漬けて汁を取り、冷、暖意に任せて服す。瘥えぬときは更に二三回合劑して服すれば止る。【齁喘痰癰】雨天の際には大抵發つて、坐することも臥すこともならず、飲食が進まぬは、肺竅に久積せる冷痰が陰氣の觸動に遇ふから發るのである。この藥一服を用ゐれば癒える。七八回まで服すれば惡痰數升を出し、藥性もまた随つて出て根絶する。江西の淡豆豉一兩を蒸して泥のやうに搗き、砒霜末一錢、枯白礬三錢を入れて綠豆大の丸にし、七丸づつを冷茶、冷水で服す。甚しきには九丸を服す。小兒は五丸を服す。そのまま枕を高くして仰臥する。熱い物等を食ふを忌む。（普救方）【風毒膝攣】骨節の痛むには、豉（二升）三五升を九蒸九暴し、酒一斗に一夜浸し、空心に適當量を溫飲する。（食醫心鏡）【手足不隨】豉三升、水九升を三升到煮て三回に分服する。又ある法で

（二升）大觀ニ三升心ニ作ル。

は、豉一升を微し熬つて囊に入れ、酒三升の中に三晝夜漬けて溫服し、常に微醉するが佳し。(肘後)【頭風疼痛】豉湯で頭を洗ひ、風を避けて瘥效を取る。(孫真人方)【突然の言語不能】豉の煮汁に美き酒を加へ入れて服す。(肘後)【喉痺の言語不能】豉汁を煮て一升を服し、厚く覆ふて汗を取り、桂末を舌下に著けて嚥む。(千金)【咽に瘰肉の生じたもの】鹽、豉を和し搗いて塗る。豫め刺破つて血を出してから用ゐるが神效がある。(聖濟總錄)【口舌に瘡を生じたもの】胸膈の疼痛するには、焦した豉の末を含めば一夜にして瘥える。(聖惠方)【舌上の出血】針の孔のやうなもののあるには、豉三升、水三升を煮沸し、一日三回、一升を服す。(葛氏方)【墮胎下血】煩悶するには、豉一升、水三升を煮て三沸し、鹿角末方寸匕を調へる。(子母明錄)【妊娠動胎】豉汁を服するが妙である。これは華佗の方である。(同上)【婦人難產】兒枕の破れたると敗血とがその胎兒を裹む場合である。勝金散を用ゐてその敗血を逐へば順になる。鹽豉一兩を舊い青布に裹んで赤く焼いて乳細し、麝香一錢を入れて末にし、秤錘を紅く焼いて酒に淬し、その酒一大盞で調へて服す。(郭稽中方)【小兒の胎毒】淡豉を煎じた濃汁三五口を與へれば、その毒が自ら下る。また能く脾氣を助け、乳や食物を

〔二五〕呪音衍、小兒嘔乳ナリ。

〔二六〕大觀ニ此處ニ得分穩ノ三字アリ。

消化する。(聖惠) 【小兒の(二五) 呪乳なんじ】鹹豉七箇を皮を去り、膩粉一錢と共に研つて黍米大の丸にし、三五丸づつを藿香湯で服す。(金幼心鑑) 【小兒の丹毒】瘡になつて水を出すには、豉を烟が盡きるまで炒つて末にし、油で調へて傳ける。(姚和衆方) 【小兒の頭瘡】黃泥で裹んで煨熟わいじやくし、取り出して研り、蓴菜油とんさいゆで調へて傳ける。(勝金) 【發背癰疽】已に潰れたものにも、未だ潰れぬものにも、香豉三升に少量の水を入れて搗いて泥にし、腫れた部分の大きさに随つて三分厚さの餅にし、瘡に孔のあるときはその孔を覆はぬやうにその豉餅を鋪しき、その上に艾わいを列べて灸する。但し溫かに感ずる程度とし、肉を破らぬやうにする。熱痛を感じるときは急に易へる。病患はそれで減じて快くなる(二六)。一日二回灸する。孔がある場合には、豫め汁を出すが妙である。(千金方) 【一切の惡瘡】豉を熟つて末にして傳ける。三四回に過ぎぬ。楊氏產乳に記載がある。【陰莖に瘡を生じたるもの】痛み、爛れたるには、豉一分、蚯蚓きういんしん濕泥二分を水で研り和して塗り、乾けば易へる。熱き食物、酒、蒜、芥菜を禁ず。(藥性論) 【蠅螻尿瘡くさうねうさう】鼓を杵きいて傳けるが良し。(千金) 【蟲に刺されたとき】豉心を嚼んで敷く。少頃して鼓中に毛のあるが見えれば瘡える。もし見えぬときは再び傳け、毛の

(七)大觀ニ三ナニ  
作ル。

見えるまで晝夜休まず試みる。(外臺) 【蹉跌の破傷】筋骨を傷めたるには、豉三升を水<sup>(一七)</sup>三升に漬けてその濃汁を飲む。心悶を止める。(千金) 【毆打傷の瘰癧<sup>おと</sup>聚<sup>り</sup>】腹中の悶満するには、豉一升、水三升を煮て三沸して分服する。瘥えぬときは再び試る。(千金) 【蜀椒の毒を解す】豉汁を飲む。(千金方) 【牛、馬の中毒】豉汁に人乳を和して頻りに服すれば效がある。(衛生易簡) 【小蝦蟇<sup>せうがま</sup>の毒】小蝦蟇は有毒のもので、それを食へば小便が秘澀し、臍下が悶痛し、死に至ることがある。生豉一合を新汲水半碗に投じて浸し、濃汁を頓に飲めば瘥える。(茹亭客語) 【酒中毒の病】豉、葱白各半升、水二升を一升到煮て頓服する。(千金方) 【服藥過劑】悶亂するには、豉汁を飲む。(千金) 【雜物の眯目<sup>めいもく</sup>】出ぬには、豉二十一箇を水に浸し、それで目を洗つて視れば出る。(總錄方) 【刺<sup>さ</sup>の肉中に在るもの】豉を嚼んで塗る。(千金方) 【小兒の淋病】方は蒸餅の發明の項に記載する。【腫の脚から起るもの】豉汁を飲み、滓を傅ける。(肘後方)

## 豆 黃 (食療)

和名 くらまめのかうち  
洋名 Bean moul.

### 〔校正〕

もとは大豆の條下に附してあつたが、本書にはこ



れを分離して記載した。

釋名

時珍曰く、釀造法は、黑豆一斗を蒸熟して蓆の上に鋪き、蒿でそれを覆ふてあんじやうはふ、醬法のやうにし、表面が黄になるを待ち取出して晒し乾し、末に搗いて収めて用ゐる。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】 説曰く、豬肉を忌む。

主治

【濕痺、膝

痛、五臟の不足、脾、胃の氣の結積。氣力を壯にし、肌膚を潤ほし、顔色を益し、骨髓を填て、虚損を補し、食を能くし、身體を肥健にする。鍊豬脂で和して丸にし、百丸づつを服す。神驗の祕方である。肥えた人は服してはならぬ。】（時珍） 記載は延年祕錄方にある。【生で嚼んで陰痒で汗の出るに塗る】（時珍）

附方

新二。

【脾弱で物を食はぬもの】これを餌つて食事に當てる。大豆黄二

升、大麻子三升を香しく熬つて末にし、一日四五回、任意に一合づつを飲で服す。

（千金方）【打撲の青腫】大豆黄を末にし、水で和して塗る。（外臺祕要）

豆 腐

（日用）

和名 とうふ  
洋名 Bean curd.



集解

時珍曰く、豆腐の法は漢の淮南王劉安から始まつた。凡そ黑豆、黄豆、及び白豆、泥豆、豌豆、綠豆の類はいづれも造れるもので、その製造法は、水に浸して礬き碎き、滓を濾し去つて煎じ上げ、それに鹽鹵汁、或は山礬葉、或は酸漿、醋澱を入れて釜で凝收させる。又、缸内に入れて石膏末で凝收させる方法もある。大抵鹹、苦、酸、辛の物を配合するといづれも收斂するものだ。その表面の凝結した部分を掲げ取つて晒し乾したものを豆腐皮と名ける。これは料理の中に入れて甚だ佳いものだ。

〔氣味〕「甘く鹹し、寒にして小毒あり」原曰く、性は平なり。頤曰く、寒

にして氣を動ずる。瑞曰く、腎氣、瘡疥、頭風を發するが、杏仁で解し得るものだ。

時珍曰く、按ずるに、延壽書に「ある者が好んで豆腐を食つて中毒し、醫治不能であつたが、豆腐製造業者の話に、萊菔が湯の中に入ると腐にならぬものだ」と聞いたので、萊菔湯で藥を服ませると癒えた」とある。概して暑期には人の汗が入つてゐる恐があるから尤も注意を要する。

主治

【中を寛にし、氣を益し、脾、胃を和し、脹滿を消し、大腸の濁氣を下

(一)木村(康)曰く、我が豆腐ノ組成ハ水分八八・七九%、含窒素物六・五五%、脂肪二・九五%、無窒素物一・〇五%、粗纖維〇・二%、灰分〇・六四%。支那ノ豆腐ハ製法出衆上ニ共ニ本邦ノモノト異ナル、ソノ組成ハ未ダ知ルニ至ラズ。

す【毒原】「熱を清し、血を散す」時珍

附方

第四

【休息久痢】白豆腐を醋で煎して食へば癒える。(魯濟方) 【赤眼腫痛】數種あるが、いづれも肝熱で血が凝るのである。風熱を消する藥を服し、夜間鹽で凝收した豆腐片を貼る。醋漿で造つたものは用ゐてはならぬ。(證治要訣) 【杖瘡の青腫】豆腐を切片して貼り、頻りに易へる。ある法では、燒酒で煮て貼る。色の紅くなるときは易へ、紅くならぬときはそのままにする。(拔萃方) 【燒酒の醉死】心頭の熱するもには、熱した豆腐を細に切片して全身に貼り、冷えれば換へる。甦つたときは止める。

陳廩米 (別錄下品)

和名 ふるこめ  
洋名 Old rice.

釋名

陳倉米 (古名)

老米 (俗名)

火米

時珍曰く、屋根あるを廩<sup>りん</sup>といひ、

屋根なきを倉<sup>くら</sup>といふ。いづれも官營の貯藏である。方なるを倉<sup>くら</sup>といひ、圓きを囤<sup>とん</sup>といふは、いづれも私人の貯藏である。老とあるもやはり陳<sup>ちん</sup>の意味だ。火米には三種あつて、火で蒸して加工するものと火で焼いて加工するものとあり、又、畚田<sup>しよてん</sup>の

火米といふもあるが、これは此にいふ火米と異ふ。

集解

弘景曰く、陳廩米、即ち粳米であつて、久しく倉中に貯藏して陳く赤くなつたもののことである。それは軍隊に廩けるものだといふので廩といつたのである。方中に多くこれを用ゐる。一般にはこれで醋を作るが、結果は新粳米に勝る。藏器曰く、廩米は、(一)吳地方では粟が良いといひ、漢地方では粳を善いといふ。やはり吳の紵、鄭の縞が、それぞれ(二)近きものを貴しとされ、遠きものが賤しとされるやうなものである。その功力に就いての正確な認識からいへば粟を取るべきものであらう。

(一) 吳ハ土部甘銅ノ註、漢ハ石部理石漢中ノ註參照。  
(二) 大觀ニハ反對ノ文字アリ左ノ如シ、蓋貴レ遠賤レ近之義焉コレ時珍ノ誤寫タルコト明ナリ。

(三) 大觀ニ粉ヲ頻ニ作ル。

宗奭曰く、諸家の註説には粳とも粟とも指定していないが、しかし二米いづれにするも、その陳いものは性がみな冷であつて、煎煮してもやはり膏膩がない。(三) 粉にして食へば自利を起すところは、經の説と事實とがやや矛盾する。

時珍曰く、廩米は、北方では多く粟を用ゐ、南方では多く粳、及び秬を用ゐる。いづれも水に浸して蒸し晒して作り、また火で焼いて加工するものもある。倉に入つて陳久なものは、いづれも氣が過ぎて色が變じてゐる。故に古人は『紅粟、紅腐、

陳陳相因る』といつた。

【氣味】

『鹹く酸し、溫にして毒なし』藏器曰く、糜米は、熱食すれば熱であ

る。冷食すれば冷である。これは火氣を假るためであつて、そのもの自體は溫、平なるものだ。馬肉と共に食へば痢疾を發する。時珍曰く、糜米は、年久しきものはその性が多くは涼である。ただ炒つて食へば溫なるだけだ。熱食すれば熱だといふやうなわけがあらうか。

【主治】

【氣を下し、煩渴を除き、胃を調へ、洩を止める】(別錄) 【五臟を補し、

腸、胃を澀す】(日華)

【脾を暖め、億氣を去る。湯にして食ふが宜し】(士良) 【飯に炊

いて食へば、痢を止め、中を補し、氣を益し、筋骨を堅くし、血脈を通じ、陽道を

起す。飯に酢を和して搗いて毒腫、惡瘡を封ずれば立ちに癒える。北方の地では、

飯を甕かづちう中に入れ、水で浸して酸くして食ふ。これは五臟、六腑の氣を暖める。米

を研つて服すれば卒心痛を去る】(孟詵) 【中を寛にし、食物を消化する。多食して饑

ゑ易い】(齊原) 【腸、胃を調へ、小便を利し、渴を止め、熱を除く】(時珍)

【發明】

時珍曰く、陳倉米は煮汁が渾にごらない。當初に於て氣味が俱に盡ききてゐ

(同)大觀ニ米ヲ取汁  
ノ二字ニ作ル。

るから、冲淡であつて胃を養ふによし。古人は多く煮汁で藥を煎じたが、やはりその腸、胃を調へ、小便を利し、濕熱を去る功力を取つたのだ。千金方に『洞注下利を治するに、この米を炒つて研末し、飲で服す』とあるは、やはりこの意味を取つたのだ。日華子がこれを『腸、胃を澀す』といひ、寇氏がこれを『冷にして利す』といつたのは、いづれも中正な意見でない。

附方

新五。

【霍亂大渴】くわくらんたいかつ

ために死亡することがある。黃倉米三升、水一斗の

煮汁を澄清して飲むがよし。ちようせい

【反胃膈氣】はんいかくき

食物の入らぬには、大倉散——倉

米、或は白米を日の西に傾いたとき水を微し拌せて濕ほし、患者自ら日氣がその米の中に在るやうに想念し、翌日晒して袋に盛つて風の吹く場所に掛け、その米一撮づつを水で煎じて汁共に飲む。即時に食物が入るものだ。○又ある法では、陳倉米で炊いた飯を焙じ研り、每五兩に沈香末半兩を入れて和勻し、二三錢づつを米飲で服す。ちんかうまい【諸般の積聚】太倉丸——脾、胃が饑飽時ならずして病を生じたものの、及び諸般の積聚、あらゆる物のために傷めたるを治す。陳倉米四兩、巴豆二十一粒を皮を去つて共に炒り、米を焦さぬやうにし、米が香しく豆が黒くなつたとき、

豆は擇り去つて用ゐず、白を去つた橘皮四兩を入れて末にし、糊で梧子大の丸にし、一日二回、五丸づつ薑湯で服す。(百一選方) 【暑期の吐瀉】陳倉米二升、麥芽四兩、黃連四兩を切り、共に蒸熟して焙じ、研末して水で梧子大の丸にし、百丸づつを白湯で服す。

飯 (拾遺)

和名 めし  
洋名 Boiled rice.

釋名

集解

時珍曰く、飯食は諸穀いづれでも作れるものだ。それぞれの米の性に随つてその本條に詳記してある。しかし藥に入れる諸飯として類從されぬものがあるから、それは區別して取扱ふべきものだと思ふ。それ等は概してみな粳、秈、粟の米を採用することになつてゐる。

新炊飯

主治

【床に遺尿するものには、熱飯一盞をその床の遺尿した箇所にあけて拌ぜ、病者本人に知らせぬやうに食はす。又、熱に乗じて腫毒に傳けるが良し】(時珍)



寒食飯

飧飯ふんはんである。

〔主治〕

〔瘰癧、及び難瘡を滅する。研末して傳ける〕〔藏

器〕灰に焼いて酒で服すれば、その米の飲を食つて積となり、黃瘦し、腹痛するを治するに甚だ效がある〕〔孫思邈〕

〔傷寒の食復には、この飯を焼いて研り、米飲で二三錢を服すれば效がある〕〔時珍〕

祀竈飯

〔主治〕

〔卒にはかに噎いづするには、一粒を取つて食へば下る。燒き研つて鼻

中の瘡に搽る〕〔時珍〕

盆の邊りに零れた飯

〔主治〕

〔鼻中に生じた瘡には、燒き研つて傳ける〕〔時珍〕

齒中に残つた飯

〔主治〕

〔蠅蚊かっの毒痛はこれを傳ければ止まる〕〔時珍〕

飧飯

飧の音は孫ッン即ち水飯である。

〔主治〕

〔熱して食へば、渴を解し、

煩を除く〕〔時珍〕

荷葉燒飯

〔主治〕

〔脾、胃を厚くし、三焦を通じ、生發の氣を資助する〕〔時珍〕

發明

李杲曰く、

易水の張潔古の枳朮丸きじゆつぐわんは、

荷葉で裹んで焼いた飯で丸にする。

蓋し荷なるものは色が青く中が空で、震の卦に象かたどるものだ。風木は人體に在つては足の少陽——膽であつて、手の少陽——三焦と共に萬物を生化するの根蒂こんたいであ

る。この物を用ゐて化の働をなさせるからは、胃氣が上升せぬわけに行かないのであつて、更に燒飯で藥を和し、白朮と協力して穀氣を滋養するのだから、胃が厚くなり、再び傷むことがなくなるのである。その利は廣くして大なるものだ。

時珍曰く、按ずるに、韓悉の醫通に『東南地方のものは、北方では飯を炊く饅類が無いことを識らぬと見え、燒といふを燒菜のやうに燒いて作るものと思ひ、それが訛つて荷葉に飯を包んで灰火に入れて燒煨してゐる』といつたが丹溪などでさへやはりは、つきりとは識らなかつたやうだ。しかし、ただ新荷葉を煮た湯に粳米を入れて飯に造れば氣味がやはり完全なのである。凡そ粳米の飯は、荷葉湯で炊いたものは中を寛にし、芥菜湯のものは痰を豁し、紫蘇湯のものは氣を行らし、肌を解し、薄荷湯のものは熱を去り、淡竹葉湯のものは暑を辟ける。いづれも類推すべきものである。

# 青精乾石 餛飩飯 (宋 圖經)

和名 そめいひ

洋名 Fried Rice, flavored with the leaves of of *Vaccinium bracteatum* Thunb.

(一) 牧野云フ、本草綱目啓蒙ニ之レチな  
んてんめしト訓ズル  
ハ非デアル、何トナ

レバ此書ノ集解ニア  
ル南燭ハなんてんデ  
ハナクテしやくなげ  
科ノしやしやんば  
(*Vaccinium bracte-*  
*atum*, Thunb.)デア  
ルカラデアル。

白井曰ク、牧野君ノ  
説ハ本草綱目三十六  
卷南燭ノ集解李時珍  
ノ説及植物名實圖考  
ニ據ラレタルモノニ  
シテ、時珍説ノ南燭  
ハ其子實紫色ニシテ  
甘酸可食種子アリト  
云ヘバしやしやんば  
トスルヲ適當トスレ  
ドモ、集解蘇頌ノ説  
ノ南燭ハ一名南天燭  
ト云フモノニテ、今  
日處方ニ栽植シテ紅  
實ヲ結ブ所ノ南天ナ  
リ。蘇頌及ビ綱目南  
燭ノ條ニ二物ヲ混説  
スル爲、庭木ノ南天  
ノ正シキ漢名南天燭  
ヲ移シテしやしやん

### 釋名

#### 烏飯

頌曰く、按ずるに、陶隱居の登真隱訣に太極真人青精乾石鯁飯法の記載がある。鯁の音は信(シン)である。鯁の意味は殭(カシ)であつて、酒、蜜、藥草などを漉(こ)せて曝(ばく)したものを謂ふのである。また迥とも書く。凡そ内外の諸書にいづれもこの字はない。ただこの飯の場合にこの字を用ゐるだけだ。陳藏器の本草には烏飯うはんと名けてある。

### 集解

頌曰く、登真隱訣記載の南燭草木の名狀に關する註は本部の本條下に掲げてある。その飯を作る法は、生白粳米一斛五斗をよく春つき浙しよげて一斛二斗を取り、南燭木の葉五斤——燥いたもの三斤でもよし——を莖皮しんを難へて煮取つた汁を極めて清冷にし、それに米を漉こぜ、米を釋じいで炊くのである。四月から八月末までは新生葉を用ゐるから色がいづれも深く出来る。九月から三月までは宿やう葉を用ゐるから色がいづれも浅く出来る。その斤兩は隨時に進退してよし。又、軟枝の莖皮を採つて石臼で擣き碎き、假令ば四五日中に作るには十斤ばかりを用ゐ、よく舂ついて一斛二斗を湯に浸し染めて一斛に煮詰て用ゐる。近來はただ水に一二夜漬けるだけで、必ずしも湯を用ゐずにそれを漉して炊く。初めは米が正紅色になるが、それ

はノ漢名トセントス  
ルノ人アルハ非ナ  
リ。今日所謂南天ノ  
南天燭ナル事ハ紹興  
校定證類本草ノ圖說  
ニヨリテ明瞭ナリ。  
(二)大觀ニ觀ニ作ル。  
(三)大觀ニ信テ追ニ  
作ル。

茅山ハ石部石脂  
ノ註ヲ見ヨ。

を蒸すと紺色になる。もし色が思ふやうでなかつたときは、また洵り去つて更に新しい汁に漬け、灑すにも漉るにもみなこの汁を用ゐ、ただ飯が正青色に炊き上がるを程度とし、それを高い場所に置いて曝乾する。三回蒸し三回曝すのであつて、蒸す毎にその葉の汁を漉せてびしやびしやにする。毎日二升服するがよく、獸物の肉は一切食つてはならぬ。胃を填て、髓を補し、三蟲を消滅する。上元寶經に「子、草木の王を服し、氣神と通ず。子、青燭の津を食し、命復た殞せず」とあるはこれをいつたのだ。現に茅山の道士はやはりこの飯を作り、或は遠方への贈物などにするが、それを更に一回蒸して食ふと甚だ香しくて甘味だ。

藏器曰く、烏飯の法は、南燭の莖、葉を搗き碎いて取つた清汁に粳米を浸し、九回浸し、九回蒸し、九回曝す。米粒が緊小にして璧玉のやうに黒くなるものである。袋入にして遠方へ贈るによし。

時珍曰く、この飯は仙家の服食の法だが、今では佛教寺院で多く四月八日にこれを作つて佛前に供へる。それを造る場合に、また柿葉、白楊葉などを數十枚いれてその染色を助け、或はまた生鐵を一塊入れることもある。それはただ色を好く仕上

げようといふ考だが、實はそれ等のものは服食家で忌むものだといふことを知らないのだ。

【氣味】

【甘し、平にして毒なし】

【主治】

【一日に一合を食へば饑ふない。

顔色を益し、筋骨を堅くし、行歩を能くする】〔藏器〕 【腸、胃を益し、髓を補し、三蟲を滅す。久しく服すれば、白を變じ、老を却ける】〔蘇頌〕 記載は太極真人法にある。

粥

（拾遺）

和名 かゆ  
洋名 Rice-gruel.

【釋名】

糜

時珍曰く、粥の字は米が釜中に在つて相屬する有様の形容だ。釋

名に『米を煮て粥となすは糜爛せしむるなり』とある。粥は糜よりも濁つて育育然たるものだ。厚きを饘せんといひ、薄きを飩ちといふ。

小麥粥

【主治】

【消渴煩熱を止める】〔時珍〕

寒食粥

杏仁を用ゐ、諸花を和して作る。

【主治】

【咳嗽がいそう。血氣を下し、中を

調へる】〔藏器〕

糯米 秫米

黍米粥

【氣味】

【甘し、溫にして毒なし】

【主治】

【氣を益し、



脾、胃虛寒の洩痢、吐逆、小兒の痘瘡の白色なるを治す〔時珍〕

粳米 籼米 粟米 梁米粥 一氣味 〔甘し、温、平にして毒なし〕 主治

〔小便を利し、煩渴を止め、腸、胃を養ふ〕〔時珍〕

發明 時珍曰く、按ずるに、羅天益の寶鑑に『粳、粟米粥は、氣薄く、味淡

く、陽中の陰である。それゆゑに淡滲し下行して能く小便を利するのだ』とあり、韓悉の醫通には『ある淋病患者で藥が嫌ひで服めぬものがあつたが、予は専ら粟米粥を啖はせて他の食味を一切絶たせた。ところが十日餘にし病が減じ、一个月餘にして痊えた。これは五穀治病の理である』とあり、又、張耒の粥記には『毎日起きて粥一大椀を食へば、腹が空に胃が虚なるところへ穀氣が作り、補の効果が些少なものでない。又、極めて柔かに膩かだから腸、胃のために宜し。これは飲食の最妙訣だ。齊和尚は山中の僧に説いて『毎朝明け方に食ふ一回の粥は甚だ利害に關係があつて、それを食はないと、終日臟腑の燥涸が甚しいやうに覺える。粥は能く胃氣を暢べ津液を生ずるものだ。大抵生を養ひ安樂を求めるといふことも、やはり深遠な六ヶ敷い道理があるのではない。寢食の間のことに過ぎないわけのものだ』といつ



た。故にこの文を作つて人に毎日粥を食はんことを勧める。大いに笑ふべきではない』とある。又、蘇軾の帖に「ある夜、甚しく饑<sup>う</sup>ゑたとき、吳子野が白粥を食へと勧め「能く陳を推し、新を致し、膈を利し、胃を益するものだ」といつたが、食つて見ると粥もうまかつたし、食つた後になる程言ふべからざる妙があつた』とある。これ等はいづれも粥にさやうな益があるといふことを著<sup>あらわ</sup>したものである。諸種の穀物で作る粥に就ては本條に詳記したが、古方には藥物を用ゐた粳、粟、梁<sup>わやうま</sup>米の粥で病を治すといふことが甚だ多い。此にその通常食へるところのものを略ぼ左に集録して參考に備へる。

赤小豆粥「小便を利し、水腫脚氣を消し、邪<sup>しりぞ</sup>癘を辟ける」

綠豆粥「熱毒を解し、煩渴を止める」

御米粥「反胃<sup>はんゐ</sup>を治し、大腸を利す」

薏苡仁粥「濕熱を除き、腸、胃を利す」

蓮子粉粥「脾、胃<sup>い</sup>を健にし、洩痢を止める」

英實粉粥「精氣を固くし、耳、目を明にする」

菱實粉粥【腸、胃を益し、内熱を解す】

栗子粥【腎氣を補し、腰脚を益す】

薯蕷粥【腎精を補し、腸、胃を固くする】

芋粥【腸、胃を寛くわんにし、人をして饑うゑざらしめる】

百合粉粥【肺を潤ほし、中を調へる】

蘿蔔粥【食物を消化し、膈を利す】

胡蘿蔔粥【中を寛くわんにし、氣を下す】

馬齒莧粥【痺を治し、腫を消す】

油菜粥【中を調へ、氣を下す】

蒼蓮菜粥【胃を健にし、脾を益す】

波稜菜粥【中を和し、燥うを潤うるほす】

薺菜粥【目を明にし、肝を利す】

芹菜粥【伏熱を去り、大、小腸を利す】

芥菜粥【痰くもつを豁くわつし、惡を辟ける】

葵菜粥【燥を潤ほし、腸を寛にする】

韭菜粥【中を温め、下を暖める】

葱豉粥【汗を發し、肌を解す】

茯苓粉粥【上を清し、下を實する】

松子仁粥【心、肺を潤ほし、大腸を調へる】

酸棗仁粥【煩熱を治し、膽氣を益す】

枸杞子粥【精血を補し、腎氣を益す】

薤白粥【老人の冷利を治す】

生薑粥【中を温め、惡を辟ける】

花椒粥【瘴を辟け、寒を禦く】

茴香粥【胃を和し、疝を治す】

胡椒粥 菜菔粥 辣米粥【いづれも心、腹の疼痛を治す】

麻子粥 胡麻粥 郁李仁粥【いづれも腸を潤ほし、痺を治す】

蘇子粥【氣を下し、膈を利す】

竹葉湯粥【渴を止め、心を清す】

豬腎粥 羊腎粥 鹿腎粥【いづれも腎虚の諸疾を補す】

羊肝粥 鷄肝粥【いづれも肝虚を補し、目を明にする】

羊汁粥 雞汁粥【いづれも勞損を治す】

鴨汁粥 鯉魚汁粥【いづれも水腫を消す】

牛乳粥【虚羸きりふを補す】

酥蜜粥【心肺を養ふ】

【鹿角膠を粥に入れて食へば元陽を助け、諸虚を治す】

【炒麪せうめんを粥に入れて食へば白痢を止める】

【燒鹽を粥に入れて食へば血痢を止める】

麪

尺沼の切セウウシシある。

(拾遺) 和名 こがし、はつたい

洋名 Yeast flour.

校正

もとは粟の條下に附してあつたが、本書はこの一條を分離掲載した。

(一)大觀ニ糗、一名  
饅昌少切トアリ。

(二)河東ハ山西各地  
方、北方トアキハ河  
北、遼東地方、東方  
トアルハ山東地方ナ  
指ス。

釋名

(一)糗 去九の切(キウ)である。時珍曰く、粃は炒つてその臭香を出すも

のだ。故に糗の字は臭に従ひ、粃の字は炒に従つて省略した文字である。劉熙の釋名に『糗は饅である。飯にして磨つて饅碎せしめたものだ』とある。

集解

恭曰く、粃は米、麥を蒸し、熬つてから磨つて作るものだ。

藏器曰く、(一)河東地方では麥で作リ、北方の地では粟で作リ、東方の地では粃米で作る。飯を炒り乾して磨つて作るものだ。粗いものを乾糗糧といふ。

米麥粃

氣味

【甘く苦し、微寒にして毒なし】藏器曰く、酸し、寒なり。

主治

【寒中、熱渴を除き、石氣を消す】(蘇頌) 【水に和して服すれば、煩熱を

解し、洩を止め、大腸を實する】(藏器) 【炒米湯は煩渴を止める】(時珍)

饅 (綱目)

和名 だんい

洋名 Dumpling.

釋名

案

時珍曰く、饅は黍糯に粃米粉を合せて蒸して作る。凝膏のやうな

状態のものだ。單に糯粉で作つたものをば案といひ、米粉に豆末、糖、蜜を合はせて蒸して作つたものをば餌といふ。釋名に『案は慈軟なり、餌は而なり、相粘而す

るなり』とあり、揚雄の方言には『餌は、これを饅と謂ひ、或はこれを案と謂ひ、或はこれを飴——音は令(レイ)——と謂ひ、或はこれを饅——音は滄(イフ)——といふ』とある。しかしそれ等の異稱に因つてそれぞれ微かの區別があることを知らねばならぬ。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】時珍曰く、粳米饅は消導し易いが、粳米は最も消化し難くして脾を損じ、或は積となる。小兒には特に禁ぜねばならぬ。

主治

【粳饅は、脾、胃を養ひ、腸を厚くし、氣を益し、中を和す。○粳饅は、氣を益し、中を暖め、小便を縮し、大便を堅くする效がある】(時珍)

發明

時珍曰く、晚粳米饅は、脾、胃の藥を丸にする場合に蒸餅の代用とする。それはその物の化け易きを取るのである。糯米粳は、丹藥を丸にする場合に糯米の代用とする。それはその物の相粘する點を取るのである。九日の登高米饅もやはり藥に入れ得るもので、聖惠方を按ずるに、山瘴瘴を治する饅肉丸は、九月九日に米饅角を取つて陰乾して半兩、寒食飯二百粒、或一百粒、獨蒜一箇、恒山一兩を水二盞に一夜浸し、五更に一盞に一盞に煎じて頓服し、下利するを度とすべしとある。



附方

新<sup>一</sup>。【老人の泄瀉】乾饅一兩を薑湯で泡<sup>つ</sup>け化<sup>さ</sup>して飯の代りにする。

(簡便方)

糴 (綱目)

和名 <sup>もちぎ</sup> May-tumpling  
洋名

釋名

角黍 時珍曰く、糴<sup>もちぎ</sup>の字は俗に粽<sup>そう</sup>と書く。古代に、菰、蘆の葉に黍米を裹<sup>し</sup>んで煮て、機<sup>しゅう</sup>欄<sup>らん</sup>の葉の心のやうな形の尖角に作つたので、糴<sup>もちぎ</sup>といひ、角黍<sup>かくし</sup>といつたのだ。近世では多く糯米を用ゐる。現に俗間では五月五日に節句の供物として互に贈答する。或は屈原を祭るためにこれを作つて江中に投じ、それを蛟龍<sup>かうりゅう</sup>の餌にしてやるのだなどといふ。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【五月五日に糴<sup>もちぎ</sup>尖を取つて截瘰癧

を和するが良し】(時珍)

寒具 (綱目)

和名 <sup>あげぐわし</sup> (新稱)  
洋名 <sup>Fried cake.</sup>

釋名

捻頭(錢乙)

環餅(要術)

饊

時珍曰く、寒具は冬から春に數月間取

ニ一 乾野云フ、本草綱目寒具ニ「ひぐわし類ノ總名ナリ」トアレドモ、今釋名並ニ集解ノ文ニヨツテ

之レヲあげぐわし即  
チ油菓子ト新稱シ  
タ。

つて置けるもので、寒食の日に火を焚かぬときそれを用ゐる。故に寒具と名けたのだ、捻頭ねんとうとはその頭が捻ねぢれてゐるから、環餅くわんぱいとは環釧くわんせんの形に象つてあるから、餠せんとは消散し易いからである。服虔の通俗文にはこれを餠かつといひ、張栻の廣雅にはこれを梳糲ふりうといひ、楚辭にはこれを糲糲せせといひ、雜字解詁にはこれを膏環といつてある。

### 集解

時珍曰く、錢乙の方中に捻頭散といふがあり、葛洪の肘後には捻頭湯といふがあるが、醫書には記載がない。按ずるに、鄭玄註周禮に『寒具は米食なり』とあり、賈思勰かしかの要術には『環餅、一名寒具。水に牛、羊の脂を搜入したもので和して作る。口に入れば直ちに碎ける』とあり、林洪の清供には『寒具は捻頭である。糯粉で麴を和し、麻油で煎じて作り、餠ちやうで食ふものだ。一个月餘取つて置ける。焚火を禁ずるとき用のよし』とある。これに據つて観ると、寒具とは即ち今の餠子せんしのことで、糯粉で麴を和し、少量の鹽を入れ、索なはや紐ひもで引かけて捻ねぢつて環釧の形に作り、油で煎じて食ふものである。劉禹錫の寒具の詩に『纖手搓成せんしかさす玉數尋、碧油煎出せんりゅうす嫩黃深ふかし。夜來春睡輕重無し、壓あつ褊へんす佳人臂に纏まとふの金』とある。

### 氣味

【甘く鹹し、溫にして毒なし】

### 主治

【大小便を利し、腸を潤し、

中を溫め、氣を益す】(時珍)

附方

新二。

【錢氏捻頭散】小兒の小便不通を治す。

延胡索、苦楝子等分を末

にし、毎服半錢、或は一錢を捻頭湯で調へて食前に服す。捻頭が無いときは、油を滴してその代りにする。(錢乙小兒方)【血痢の止まぬもの】地榆を晒して研末し、毎服二錢を羊血上に摻り、炙熱して食ひ、捻頭の煎湯で送下する。或は地榆の煮汁を飴のやうな状態に熬り、一服に三合を捻頭湯に化して服す。

蒸餅(綱目)

和名 ばん  
洋名 Bread.

釋名

時珍曰く、按ずるに、劉熙の釋名に『餅は并である。麪を漉せて合併せしめたもので、蒸餅、湯餅、胡餅、索餅、酥餅などの屬がある。いづれも形に随ふ命名だ』とある。

集解

時珍曰く、小麥麪で修治する食品は甚だ多いが、ただ蒸餅だけが最も由來が古い。これは單に麪のみを醱糟で發酵させて造るもので、藥を丸にするに必要のものであり、且つ疾を治する功能があるものだ。而るに本草に記載のないのは

やはり一の缺點であつた。これは臘月、及び寒食の日に皮が裂けるまで蒸して皮を去り、風の當るところに懸けて乾して置き、使用の際に臨んで水に浸して服らせ、插り爛して瀝し、それを脾胃、及び三焦の藥を和するに用ゐる。甚だ消化し易く、且つ麪が已にその性質に變化を來してゐるので濕熱を助けられないものだ。しかし果菜、油膩いうじの諸物を餌にして入れたものは藥用に堪へない。

**氣味**

【甘し、平にして毒なし】

**主治**

【食を消し、脾、胃を養ひ、中を

溫め、滯を化し、氣を益し、血を和し、汗を止め、三焦を利し、水道を通ずる】(時珍)**發明**時珍曰く、按ずるに、愛竹談藪に『宋の寧宗皇帝がまだ郡王であつた

とき、淋を病んで晝夜に凡そ三百回も小便に起ち、宮廷の醫官達は手の下しやうがなかつたが、ある者の推舉に因つて孫琳を召して治療を命ぜられた。そのとき琳は、蒸餅、大蒜、淡豆豉の三物を搗いて丸にし、溫水で三十丸を進め、今日三服されると病は三分を減じ、明日も同様で、三日で病は平癒される」といつたが、果してその通りであつた。報酬として千緡せんびんを賜つた。ある者がその療法に就いての説明を問ふと、琳は「小兒に淋のあらうわけはない。ただこれは水道が利せぬだけのもので

ある。三物はいづれも能く通利するものだ。故にかやうな結果を得ただけのこと  
で、私如きは醫術をかれこれ申上げる程の者ではない」といつた」とある。

【附方】

新六

【積年の下血】寒食蒸餅、烏龍尾各一兩、皂角七挺を皮を去つて

酥で炙き、末にして蜜で丸にし、二十丸づつを米飲で服す。（聖惠方）【赤、白下痢】

營衛の氣虚で風の邪が腸、胃の間に襲ひ入り、赤、白の便を痢し、臍腹が疼痛し、

裏急後重し、煩渴し脹滿し、飲食の進まぬを治す。乾蒸餅に蜜を拌ぜて炒つて二兩、

御米殻を蜜で炒つて四兩を末にし、煉蜜で芡子大の丸にし、一丸づつを水一盞で煎

じ化して熱服する。（傳信適用妙方）【崩中下血】幾年かの陳き蒸餅を焼いて性を存し、

二錢を米飲で服す。【盜汗、白汗】毎夜就寢時に、やや空腹にして蒸餅一箇を喫ふ。

數日に過ぎずして止む。（醫林集要）【一切の折傷】寒食蒸餅を末にし、二錢づつを酒で

服す。甚だ效驗がある。（肘後方）【湯火傷灼】饅頭餅を焼いて性を存して研末し、油

で調へて塗傳する。（肘後方）

(二)拾遺ハ唐本ノ誤。

女麴 (二)拾遺

和名 こむぎのかうち  
洋名 Fermentie mould on Wheat

校正

もとは小麥の條下に附録してあつたが、本書には一條を分離して掲載した。

釋名

麴子 音は桓(クワン)である。黃子 時珍曰く、これは婦人達が完き麥

を糶かこふて黃子にしたものだ。故にかかる諸名があるのだ。

集解

恭曰く、女麴ぢよきくは完き小麥の飯を和成して糶かこひ、黃衣が表面に現はれる

を待つて取つて晒したものだ。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【食を消し、氣を下し、洩痢せつりを止

め、胎を下し、冷血を破る】(蘇頌)

(二)黃蒸 (二)拾遺

和名 きかうぢ(新稱)  
洋名 Yellow cake (Fermentie mould on rice and wheat)

校正

もとは小麥の條下に附録してあつたが、本書には一條を分離して掲載した。

(一)牧野云フ、本草綱目啓蒙ニ「こむぎのかうち、ひきわりむぎのかうちナリ」トアレドモ、今集解ノ文ヲ按ジテ之レヲ



きかうちト新稱シ  
タ。  
三拾遺ハ唐本ノ誤。

釋名

黃衣(蘇恭) 麥黃 時珍曰く、これは米、麥の粉を和して罨ひ、薰蒸

して黃にならしめたものだ。故にかかる諸名がある。

集解

恭曰く、黃蒸は、小麥を磨つた粉に水を拌ぜ和し、餅にして麻葉で裹み、黃衣の生ずるを待つて取つて晒したものである。

藏器曰く、黃蒸は、麩子と相異のないものだ。北方の地では小麥で造り、南方の地では粳米で造る。六七月に作るもので、綠塵の生じたものが佳し。

時珍曰く、女麴は麥を飯に蒸して罨つて造るもの、黃蒸は米、麥を磨つた粉を罨つて造るものだからやや相異がある。

氣味

主治

【いづれも女麴に同じ】(蘇恭) 【溫補し、能く諸種の生物を消

化する】(藏器) 【中を溫め、氣を下し、食を消し、煩を除く】(日華) 【食黃、黃汗を治

す】(時珍)

附方

新一。

【癰黃疸疾】

或は黃汗が衣服に染り、涕唾までみな黃なるには、

好き黃蒸二升を毎夜水二升に浸し、微し暖めて銅器中に入れ、早朝汁半升を絞つて用ゐるが極めて效がある。(必效方)

(一) 麴 (宋嘉祐)

和名 かうち  
洋名 "Koji" (Clementine mould on boiled rice)

(一) 牧野云フ、我が  
かうちニ適當ナ洋語  
ヲ見付ケ得ナイノデ  
止ムヲ得ズ [Kōji] チ  
新洋名化シタ。

釋名

酒母

時珍曰く、麴は米、麥を包ふう鑿して造るものだ。故にその文字は

麥に従ひ、米に従ひ、包に従ふ省文の會意の文字である。酒は麴を用ゐねば出来な  
いものだから酒母といふ。書經に『若し酒ふれ醴れいを作らば、爾なんぢ惟ただれ麴、蘖けつ』とあるがそ  
れだ。劉熙の釋名には『麴は朽である。鬱して衣を生ぜしめ、敗朽せしめたものだ』  
とある。

集解

藏器曰く、麴は六月に作つたものが良し。藥に入れるには、陳久な

るものを香かうしく炒つて用ゐべきものである。

時珍曰く、麴には、麥、麴、米で造るものがあつて一樣でないが、いづれも酒、  
醋に必要なものだ。いづれもその消導の功能は甚だ遠からざるものである。

大、小麥麴を造る法は、大麥米、或は小麥を皮のままを用ゐ、井水で淘淨して晒  
し乾し、六月六日に磨り碎き、麥を淘つた水で和して塊にし、楮葉ちよくで包み括つ  
て風の當る場所に七十日間懸けて置けば使用し得るやうになる。

(二) 木村(康)曰ク、  
日本酒ノ麴ノ製法、  
通常ノ飯麴即チ粳米  
ヲ搗臼シテ、成ル可  
ク精白トナシタル後  
桶ニ盛リ水ヲ加ヘ、  
數回淘洗シテ其洗水  
ノ乳狀ヲ早セザルニ  
至リ一夜水漬シ、蒸  
籠ニ盛リテ蒸シ藥席  
上ニ攤ケ攪拌シ、其  
温度下降シテ約三〇  
度ニ至レバ、米一石  
ニ付キ種麴約三十五  
匁ノ割合ヲ以テ種麴

ヲ加へ、ヨク混和シタル後所謂麴室<sup>ニ</sup>貯フ、其際先ヅ藥屑上ニ於テ丘狀ニ積上テ温度ノ下降ヲ防グ爲メ數枚ノ席ヲ以テ覆ヒ、一〇數時間ヲ經ル時ハ米穀上ニ白色ノ斑點ヲ生ジ、麴ノ菌絲少シク發育スルヲ以テ堆積ヲ崩シ、手ヲ以テ揉ミ碎キ善ク攪拌シ、再ビ元ノ如ク堆積シ席ヲ以テ覆ヒ、一〇數時間ノ後揉ミ碎キ麴蓋ニ擴ゲ、棚上ニ數枚ヅツ積ミ重ホ席ヲ以テ覆ヒ、數時間ノ後手モテ碎塊攪拌シテ敷置シ、六、七時間ノ後更ニ碎塊攪拌シ、一〇數時間放置スレバ米穀全面ニ白色ノ菌絲發育シ甘味ヲ生ジ、麴成熱スルヲ以テ室外ニ出ダシ冷處

麴麴を造る法は、三伏の時、白麴五斤、綠豆五斤を麥汁<sup>わうじふ</sup>で煮爛し、麥末五兩、杏仁泥十兩を和して踏んで餅にし、楮葉で裹んで風の當る場所に懸け、黃の生ずるを待つて取收める。

白麴を造る法は、麴五斤、糯米粉一斗を用ゐ、水を拌せて微し潤<sup>うる</sup>まして篩<sup>ふる</sup>ひ、踏んで餅にし、楮葉で包んで五十日間風の當る場所に掛けて置けば出來上る。

又、米麴の法は、糯米粉一斗を麥の自然汁で和して圓丸にし、楮葉で包んで風の當る場所に四十九日間掛けて晒<sup>ひく</sup>して取收める。

この數種の麴はいづれも藥に入れ得るが、各地方にある諸藥草を入れたもの、毒藥を入れたものはいづれも有毒だ。故に酒を造るに用ゐるだけのもので、藥には入れられない。

### 小麥麴 氣味

【甘し、溫にして毒なし】震亨曰く、麴皮麴は涼であつて大

腸の經に入る。

### 主治

【穀を消し、痢を止める】(別錄) 【胃氣を平にし、食痔を消

し、小兒の食癰を治す】(蘇恭) 【中を調へ、氣を下し、胃を開き、臟腑の中風寒氣(大

觀)を療ずる】(藏器) 【霍亂<sup>くわくらん</sup>、心膈の氣、痰逆に主效があり、煩を除き、癥結<sup>ちやうけつ</sup>を破る】

ニ貯フ、抑麹麴（現今ハ毒業者之ヲ製造販賣ス）ナルモノ

ハ、**麹菌** *Aspergillus*

*Oryzae* ノ芳貽ト清酒酵母（日本酒）

*Saccharomyces Sake*

トヨリ成リ、製麴ハ

麹菌ノ發育ニヨリ澱粉ヲ糖ニ變化スル性

アル發酵素ヲ生ゼシメ且清酒酵母ヲ培養

スルニアリ、又製麴ノ際ニ堆積及ビ碎塊

ヲ反覆スルハ、米粒ノ塊結シテ麹菌ノ發

育ヲ害スルヲ豫防スルノミナラズ、亦過

度ノ熱ヲ低降セシメ、且少温度ノ均一

ヲ保持スルノ目的ニ外ナラズ。

尙山崎百治氏ハ、上海自然科學研究所彙

編第一卷第一號（一九二九）ニ玄那產「麴」ニ就テ詳細ナル

（孟詵）【虛を補し、冷氣を去り、腸、胃中塞で食物の下らぬを除き、人をして顔色あらしめる】（吳璠）【胎を落し、并に鬼胎を下す】（日華）【河腹（大魚の疾を止める）】（葉簡帝勸醫文）

## 大麥麴

### 氣味

前に同じ。

### 主治

【食を消し、中を和し、生胎を下し、血

を破る。五升を取つて水一斗で煮て三沸し、五回に分服すれば、その子は麋のやうになり、母を肥盛ならしめる】（時珍）

## 麴麴

### 氣味

前に同じ。

### 主治

【食積、酒積、糯米積を消す。研末

して酒で服すれば立ろに癒える。その他の功は小麥麴と同じ】（時珍） 記載は千金にある。

## 附方

舊五、新四。『米穀食積』炒麴末二錢、つづを白湯で調へて服す。一日三回、

## 三焦の滯氣

陳麴を炒り、萊菔子を炒り、等分を三錢、つづ水で煎じ、麝香少量を

入れて服す。（普濟）『小腹の堅大』盤のやうになり、胸滿し、食物の消化不能なるに


は、麴末方寸匕を湯で服す。一日三回（千金）『あらゆる水痢』六月六日の麴を黄に

炒り、馬蘭子（かりん）と等分を末にし、方寸匕を米飲で服す。馬蘭子がないときは牛骨灰を

研究ヲ發表セリ、ソノ研究材料ハ浙江、江蘇、湖南ノ三省ヨリ出ヅルモノヲ主トシ二〇五例ニ及ブ、ソノ形態、大サ、重量等ニヨリ支那産麴ヲ二大別ス、ソノハ「酒麴」「麴藥」「酒餅」セラルルモノニシテソノ二ハ「麴」(狭義)又ハ「大麴」ト呼バレ。黃酒用及ビ高粱酒用ノモノハ「麴子」、紹興酒用ノモノハ「麥麴」、「麴麥」、「米麴」、米酒用ノモノハ「大酒餅」等ト呼バレ。

支那産「麴」ノ成分ハ(一)主成分トシテ、米粉混和成分トシテ紅花子(Polygonum vulgare)ヲ含ムモノ最モ多ク、小麥ノ全粒及搗碎粒ノミヨリナルモノ是ニ次グ、是等ハソレゾレ化學的成分モ相類似スル所大ニシテ、各共通ノ用途アル可キヲ思ハシム、實ニ前者ハ酒醸製造用ニ後者ハ麴子又ハ麥麴トシテ、紹興酒醸造上ニ使用セラルルモノナリ。前記以外ノモノハ主混和兩成分共ニ著シク複雑多岐ニ互リ、化學的成分ノ如キヨク之ヲ證ス。(二)米粉ハ主成分若クハ混和成分トシテ大多數ノ酒藥ニ含有セラレ、大麴ト成分上主タル相違點ヲナスモノナリ。主成分トシテ米粉ニ次テ多數ノ酒藥ニ含有セララルルモノハ稻稈細末ニシテ、植物藥材ノ細末無機物ニシテ植物藥材ノ細末稻稈細末ノ順ニアリ、要スルニ酒藥用酒藥、麴子、麥麴、米麴、大餅等ヲ除キテハソノ成分ハ多種多様ニシテ複雑ニ極ム、ソノ中ニ合ニル發酵菌類ハ *Thiz pus* ノ含ヒラルモノ最モ多數ニシテ、*Penicillium*, *Monilia*, *Yeast*, *Aspergillus* ノ順ニ次グ、*Aschis*, *At. muscus*, *Penicillium*, *Syncephalus rum*, *Chamy-cornea* 等之ニ次グ、支那産麴ノ用途ク

代用する。(普濟方) 【赤、白痢下】水、穀の消化せぬには、麴を熬つて方寸匕、つづを粟米粥で服す。一日四五回。(肘後方) 【酒毒の便血】麴一塊を濕紙で包んで煨いて末にし、二錢づつを空心に米飲で服す。神效がある。【傷寒の食復】麴一餅を煮て汁を飲むが良し。(類要方) 【胎動不安】或は上に心を捨き、下血するには、生麴餅を研末し、水を和して絞つた汁三升を服す。(肘後) 【狐刺尿管】麴末に獨頭蒜を和して杵き、麥粒ほどを瘡孔中に納れる。蟲が出て癒える。(古今錄驗)





## 神 麴 (藥性論)

和名 くすりかうぢ  
洋名 Medicinal Yeast

## 釋名

## 集解

時珍曰く、昔一般に用ゐた麴は多くは酒を造る麴そのものであつたが、後の醫家は神麴じんきくといふを造つて専ら藥用に供した。功力は更に勝れてゐる。蓋し諸神聚會の日にこれを造るといふ意味で神なる名稱を冠したのだ。賈思勰けしきの齊民要術に神麴を造る方法が記されてあるが、繁瑣はんさなもので使用に便でない。近世の製造法の方が更に簡便だ。葉氏の水雲錄に『五月五日、或は六月六日、或は三伏の日に、白麴百斤、青蒿せいこうの自然汁三升、赤小豆末、杏仁泥各三升、蒼耳の自然汁、野蓼やれうの自然汁各三升を用ゐて、それぞれを白虎、青龍、朱雀、玄武、勾陳こうちん、騰蛇たうたの六神に配し、その汁でその麴、豆、杏仁を和して餅にし、麻葉、或は楮葉で包裹あんして醬黃を造る法のやうにし、黃衣の生ずるを待つて晒して取收める。

## 氣味

【甘く辛し、溫にして毒なし】

元素曰く、陽中の陽であつて、足の陽

明の經に入る。凡そこれを用ゐるには、火で黃炒すれば土氣を助ける。陳久なるものが良し。

## 主治

【水穀の宿食、癥結しやうけつ、積滯しやくたいを化し、脾を健にし、胃を暖にする】



〔藥性〕「胃の氣を養ひ、赤、白痢を治す」〔元素〕「食を消し、氣を下し、痰逆、霍亂、泄痢、脹滿の諸疾を除く。その功は麴と同じ。閃挫、腰痛には、煨いて酒に淬して溫服すれば效がある。婦人産後に乳を回さんとするには、炒つて研り、一日二回、二錢づつを酒で服す。直ちに止んで甚だ效驗がある」〔時珍〕

### 發明

時珍曰く、按ずるに、倪維德の啓微集に『神麴は目病を治す。生で用ゐれば能くその生氣を發し、熟して用ゐれば能くその暴氣を斂める』とある。

### 附方

舊一、新六。

【胃虚で食物の消化せぬもの】神麴半斤、麥芽五升、杏仁一升を各、炒つて末にし、煉蜜で彈子大の丸にし、一丸づつを毎食後に嚼み化かす。

〔醫濟方〕「脾を壯にし、食を進める」痞滿、暑泄を療ずる。麴朮丸——神麴を炒り、

蒼朮を泔制して炒り、等分を末にして麴で梧子大の丸にし、五十丸づつを米飲で服す。

冷える者には乾薑、或は吳茱萸を加へる（時珍百一選方）「胃を健にし、食思をつ

ける」養食丸——脾、胃俱に虚して水穀の消化不能となり、胸膈が痞悶し、腹脇が

膨脹して幾年月に互り、食減じ、臥すことを嗜み、口に味なきものを治す。神麴六

兩、麥蘗を炒つて三兩、乾薑を炮いて四兩、烏梅肉を焙じて四兩を末にし、蜜で梧

子大の丸にし、一日三回、五十丸づつを米飲で服す。（和劑局方）【虛寒反胃】方は上に同じ。【暴泄の止まぬもの】神麴を炒つて二兩、茱萸を湯に泡けて炒つて半兩を末にし、醋糊で梧子大の丸にし、五十丸づつを米飲で服す。（百一選方）【産後の運絶】神麴を炒つて末にし、水で方寸匕を服す。（千金方）【食積の心痛】陳神麴一塊を紅く焼いて酒に淬し、二大椀を服す。（摘玄方）

### 紅 麴

（丹溪補遺）

和名 あしかうじ  
洋名 Red Koji. (Morus purpureus, Wort)

#### 集 解

時珍曰く、紅麴は本草には記載がない。その方法は近世に起つたもので、奇異なる術である。その方法は、白粳米一石五斗を水で淘つて一夜浸し、飯にして十五个處に分け、麴母三斤を入れてよく揉み勻ぜ、それを一個處に聚めて帛で密覆し、熱して帛を去り、攤し開いて温むを覺えたとき急に堆く盛上げてまた密覆し、翌日中にまた三个處に盛上げ、一時過ぎてから五个處に分けて盛り上げ、再び一時して一個處に盛り聚め、また一時過ぎに十五个處に盛分け、やや温んだときまた一個處に盛聚める。かく數回繰返して、第三日目に大桶に新汲水を盛り、麴を

竹籬ちくきに盛り、五六分に分けてその桶の水に蘸ひたし濕ぬほし、完全に濕ぬはしてからまた一  
个處に盛上げて前の方法のやうに一回繰返し、第四日目にもまた前日のやうに水に  
蘸ひたす。若し麴なまこが半沈なみちみ半浮くときは再び前の方法を一回繰返し、また蘸ひたして見て盡  
く浮くときは出来上つたのだ。それを取り出して日光で乾して貯藏する。その米が心  
に透つたものを生黄といふ。酒、及び酢、醃ひげの中に入れると鮮紅で美しく見える。  
まだ心に透らぬものは甚だ佳くない。藥に入れるには陳久なるものを良しとする。  
氣味「甘し、溫にして毒なし」瑞すい曰く、これで釀した酒は、辛く、熱であ  
つて小毒があり、腸風、痔瘻、脚氣、哮喘かすぜい、痰嗽たんそうの諸疾を發する。

### 主治

「食物を消化し、血を活かし、脾を健にし、胃を燥し、赤、白痢を治  
し、水、穀を下す」(震亨)「釀した酒は血を破り、藥勞を行らし、山嵐瘴氣さんらんしょうきを殺し、  
打撲傷損を治す」(吳瑞)「婦人の血氣痛、及び産後の惡血の盡きぬものを治す。酒に  
搗すつて飲むが良し」(時珍)

### 發明

時珍曰く、人間の食つた水、穀は、胃に入つて中焦の濕熱を受けて薰蒸  
し、游溢する精氣が日に日に化して紅となり、臟腑、經絡けいらくに散布する。それが營血

だ。これは造化自然の微妙なる働である。紅麴を造るには、白米飯に濕熱を受けて鬱蒸し、變じて紅となすのであつて、その色は眞色をなし久しく經つてもやはり渝らない。これは人間が造化の巧を窺つたものだ。故に經に、麴に脾、胃、營血を治する功があるといつたのであつて、同氣相求むるの理を得たものだ。

# 附方

新四。

【濕熱泄痢】丹溪の青六丸——六一散に炒つた紅麴五錢を加へ

て末にし、蒸餅で和して梧子大の丸にし、一日三回、五七十丸づつを白湯で服す。

（丹溪心法）【小兒の吐逆】頻頻として乳、食物が進まず、手、足の心の熱するには、

紅麴の年久しきもの三錢半、白朮を麩で炒つて一錢半、甘草を炙いて一錢を末にし、

半錢づつを棗子米の煎湯で服す（經書）【小兒の頭瘡】濕の傷みが原因で水が入つて

毒となり、濃汁の止まぬには、紅麴を嚼んで罨ふが甚だ有效だ（百一還方）【心腹の

痛むもの】赤麴、香附、乳香等分を末にして酒で服す（摘玄方）

## 麴

米（別錄中品）

和名 もやし

洋名 Rice-malt

# 釋名

弘景曰く、これは米で作る麴のことで、別の米の種類にある名稱では

ない。恭こう曰く、蘖けとは孽けといふやうなものだ。その生じたことが正しき理に因らぬものの意味をいひ表あらはしたものであつて、いづれも生ずる可能性のあるもので生ずるのである、その蘖中の米を取つて藥に入れる。按ずるに、『稻蘖を用う』とある。稻とは即ち稈くわうのある穀物の總名だ。陶氏たうしが米で蘖を作ると考へたのは正しくない。米では更に生ずべきわけがあるまい。

### 集解

宗奭そうせき曰く、蘖米は粟蘖である。

時珍ししん曰く、別錄には蘖米といつただけで粟で作るとはいつてない。蘇恭そこうの、凡ての穀物はいづれも生ずる可能性があるといつたのが正しい。粟、黍、穀、麥、豆の諸蘖があるが、いづれも水に浸して脹ふくらませ、芽の生えるを候まちつて曝乾し、鬚を去つてその中の米を取り、炒り研つて粥にして用ゐるのであつて、使用上の功力はいづれも主として消導にある。此に併集して左に掲げる。日華子が蘖米を醋黃子を作るものとしたのも誤である。

### 粟蘖

一名

粟芽

氣味

【苦し、溫にして毒なし】

宗奭そうせき曰く、今の穀神散

中に用ゐてある。性は麥蘖みやくけよりも溫である。

主治

【寒中。氣を下し、熱を除

く〔別錄〕一頰を除き、宿食を消し、胃を開く〔日華〕「末にして脂で和して頰に傅ければ、皮膚を悦澤ならしめる」〔陶弘景〕

稻蘖 一名 穀芽 氣味「甘し、溫にして毒なし」主治「脾を快くし、

胃を開き、氣を下し、中を和し、食を消し、積を化す」〔時珍〕

〔附方〕 新一「脾を辟き、食を進める」穀神丸 穀蘖四兩を末にし、薑汁、

鹽少量を入れ、和して餅にして焙じ乾し、炙甘草、砂仁、白朮を麸で炒り、各一兩を末にして白湯に點て服す。或は丸にして服す。〔普察方〕

穢麥蘖 一名 麥芽 氣味「鹹し、溫にして毒なし」主治「食を消し、

中を和す」〔別錄〕「冷氣を破り、心腹脹滿を去る」〔藥性〕「胃を開き、霍亂を止め、頰

悶を除き、痰飲を消し、癥結を破る 能く分焼を催し、胎を落す」〔日華〕「脾、胃の

虚を補し、腸を寛にし、氣を下す 腹鳴のものに用ゐる」〔元菴〕「一切の米麴、諸果

の食積を消化する」〔時珍〕

〔發明〕 好古曰く、麥芽、神麴の二藥は胃氣の虚した患者が服するに適する。

それが戊巳に代るに依つて水、穀を腐熟するのである。豆蔻、縮砂、烏梅、木瓜、



芍藥、五味子が使となる。

時珍曰く、麥蘖、穀芽、粟蘖は、いづれも能く米粥、諸果の食積を消導する。それは飴あめを製するにこれを用ゐるに觀ても類推し得ることだ。但し積ある者に對しては消化の功能があるが、積なきものが久しく服しては元氣を消するものだから注意を要する。久しく服するには、白朮などの諸藥と兼用するやうにすれば害がない。

### 〔附方〕

舊三、新五「脇を快くし、食を進める」麥蘖四兩、神麴しんきく二兩、白朮、橘

皮各一兩を末にし、蒸餅で梧子大の丸にし、三五十九づつを人參湯で服すれば效がある。「穀勞で臥すことを嗜むもの」飽食して直ちに臥すと穀勞病となり、四肢が煩重して嘿嘿もくもくとして臥したが、食事が畢おひるとそれが甚しくなる。大麥蘖一升、椒一兩をいづれも炒り、乾薑三兩と搗いて末にし、一日三回、方寸匕づつを白湯で服す（時後）。「腹中の虛冷」食へば消化せず、羸瘦るんそうし、弱乏するは、ためにあらゆる疾を生ずる原因となる。大麥蘖五升、小麥粥半斤、豉五合、杏仁二升、いづつも黃熱して香しくし、搗かき篩ふるつて糊で彈子大の丸にし、一丸づつを白湯で服す（時後方）。

「産後の腹脹一通轉せず、氣急し、坐臥不安なるには、麥蘖一合を末にし、酒で和

して服す。良久して通轉して神驗がある。これは供奉輔太初が崔郎中に傳へた方である。（李絳兵部手集方）『産後の青腫』乃ち血水積である。（けつすゐとせき）乾漆、大麥蘖等分を末にし、新瓦中に漆を一層鋪いて蘖一層を鋪き、重重に満てて鹽泥で固濟し、赤く煨いて研末し、二錢を熱酒で調へて服す。産後の諸疾にいづれも宜し。（婦人經驗方）『産後の祕塞』五七日通ぜぬは妄に藥丸を服してはならぬ。大麥芽を黃に炒つて末にし、三錢づつを沸湯で調へて服し、粥を與へて間服せしめるがよし。（婦人良方）『妊娠去胎』外臺では、妊娠して胎を去らんとするを治す。麥蘖一升、蜜一升を服すれば下る。○小品では、大麥芽一升、水三升を二升到煮取り、三回に分服する。神效がある。『産後の回乳』産婦が子を亡くして乳を飲ませるものがなく、ために乳房内の乳が消せず、發熱し惡寒する（なかん）には、大麥蘖二兩を炒つて末にし、五錢づつを白湯で服するが甚だ良し。（丹溪要方）

# 飴 餠 （別錄上品）

和名 あめ  
洋名 Wheat- and rice-gluten

## 釋名

飴 音は徐盈の切（ショウ）である。時珍曰く、按ずるに、劉熙の釋名に

(一) 寧結ハ固マリオ  
チツイテキル状態。  
(二) 牽白ハ引キ伸ベ  
テ白ク連ナル状態。

『餠もちの清すめるものを餠いといふ。状態の怡い然ぜんたるものだ。稠こきものを餠もちといふ。強硬にして錫やうの如ごときものだ。餠もちの如ごとくにして濁れるものを餠もちといふ。方言ではこれを餠餠——音は長皇(チャウクワウ)——といふ。楚辭に「秬こ粳けい蜜餌みつに用餠餠」とあるがそれだ』とある。嘉謨かみ曰く、色が紫で琥珀こはくに類するところから、方中にこれを膠餠かういといふ。乾かん枯こせるものをば餠いといふ。

### 集解

弘景こうけい曰く、方家で用ゐる餠いは膠餠かういといふもので、濃い蜜のやうな濕餠である。その(一)寧結したものと、及び(二)牽白なものは餠もちである。薬用には入れない。韓保昇かんぽうせい曰く、餠いとは軟餠のことだ。北方の地ではこれを餠いといふ。糯米、粳米、秬粟米こしふくまい、蜀黍米しよくふ、大麻子たいまし、枳椇子しきぎし、黄精、白朮びやくじくいづれも熬あつて造れるものだが、糯米で作つたものだけを薬に入れ、粟米ものものがこれに次ぐ。その他のものはただ食へるだけだ。

時珍しちん曰く、餠い、餠もちは、諸種の米に麥蘖まいび、或は穀芽こくがを入れて共に熬煎あせんして造るものだ。古代には寒食に多く餠いを食つた。故に醫方でもやはりこれを使用するものの中に入れたのである。

(三) 木料(康)口ク、  
 (水飴)製法、糯米ニ  
 升四合ヲ洗ヒ、約二  
 晝夜間浸シテ之ヲ蒸  
 シ、攝氏一〇度ノ温  
 度ニ冷却スルマデ待  
 テ、之ヲ醸造室ニ運  
 ビ麥酒製造ニ用ウル  
 麥芽粉一合六勺ヲ混  
 シ、攝氏六十一度ヲ  
 保テル温水九合ヲ加  
 ヘテ充分ニ攪拌シ、  
 桶ノ周圍ニ蘆ヲ巻キ  
 テ蓋ヲナシ、九合ノ  
 麥芽粉ヲ三度ニ加ヘ  
 混合セシムベシ、然  
 ル時ハ約六時間ヲ搾  
 リトリ、後煮沸シテ  
 粘稠ナラシムレバ飴  
 トナル。

### 〔氣味〕

「甘し、大温にして毒なし」 太陰の經に入る。宗昉曰く、多食すれば脾氣を動ずる。震亨曰く、飴饌は土に屬して火に依つて成る。大いに濕中の熱を發するものだ。寇氏がこれを「脾風を動ずる」といつたのは、末を言つて本を遺れたものだ。時珍曰く、凡そ中滿、吐逆、秘結、牙齦、赤日、疳病の者は切に忌むべきものである。痰を生じ、火を動ずることが最も甚しい。甘は土に屬する、腎病には甘を多食してはならない。甘は腎を傷るもので、骨痛して齒が落ちるはみなその類である。

### 〔主治〕

「虚乏を補し、渴を止め、血を去る」(別錄)「虚冷を補し、氣力を益し、腸鳴、咽痛を止め、唾血を治し、痰を消し、肺を潤ほし、嗽を止める」(思邈)「脾、胃を健にし、中を補す。吐血、打損瘀血を治するには、熬り焦して酒で服す。能く惡血を下す。又、傷寒の大毒嗽には、蔓菁、薤の汁の中に入れ、煮て一沸して頓服するが良し」(孟詵)「脾弱で食思なき者は、少しづつ用ゐれば能く胃氣を和す。またこれで藥を和して用ゐる」(寇宗奭)「附子、草烏頭の毒を解す」(時珍)

### 〔發明〕

弘景曰く、古方の建中湯に多くこれを用ゐる。饴と酒とはいづれも米

麤を用ゐて造るものだが、餠は上品に編入され酒は中品に編入されてある。これは餠は和潤だから優れたものとし、酒は醜亂するものだから劣るとしたのである。成無已曰く、脾は緩ならんことを欲する。急に甘を食つて以てこれを緩にする。膠飴の甘は以て中を緩にするものだ。

好古曰く、飴は脾の經の氣分の藥であつて、甘は能く脾の不足を補するものだ。時珍曰く、集異記に「刑曹進は河朔の健將であつた。流矢が目に中つたとき、矢をば抜いたが鏃が中に留つてゐて、鉗で抜かうとしても動かず、痛圍して死を俟つばかりになつてゐると、ふと夢に胡僧が現はれて「米汁を注ぐがよい、必ず癒える」といつた。しかしその方法が判らぬので、さまざまな人人に詢ねたがやはり判らない。ところがある日一人の托鉢僧が來た。それが夢の胡僧によく似てゐたので、またその方法を詢ねて見ると、僧は「それはただ寒食餠を點ければよいのだ」といつた。そこで教へられた方法に従つて用ゐると、「清涼を覺えて頗る酸楚痛が滅じ、夜に入つて瘡が痒くなり、力を込め鉗を當てると直に鏃が出た。かくて十日ばかりで癒えたのであつた」とある。



## 〔附 方〕

舊二、新九。

【老人の煩渴】寒食大麥二升、水七升を五升に煎じ、赤飴二

合を入れ、渴するときに飲む。（奉親書）

【蛟龍癥病】世間では一般に正月、二月に

芹菜きんさいを食ふが、その際誤つて蛟龍の精を食ふと蛟龍病といふ病になる。その病は、發すると痢のやうで、顔色が青黃になるものだ。寒食飴かんしきとう五合、つを一日に三回服すれば蛟龍を吐出する。その物に兩頭のあるがその驗だ。（しるし）虬くわいを吐くに用ゐてはならぬ。（金匱要略）【魚臍疔瘡】寒食飴を塗るが良し。乾けるものは灰に焼いて用ゐる。【千金方】【癰疽毒瘡】臘月の飴飴を書夜塗る。數日で癒える。（千金方）【誤つて稻芒を呑んだとき】白飴を頻に食ふ。（簡便方）【魚骨哽咽】出し得ぬには、飴飴を雞子黃大の丸にして呑む。下らぬときは再び呑む。（肘後）【誤つて錢、釵を呑んだとき】及び竹木を呑んだときは、飴飴一斤を取つて漸漸に食へ盡せば出る。（外臺）【箭鏃の出ぬもの】發明の項を見よ。【服藥過劑】悶亂するには、飴飴を食ふ。（千金）【草烏頭の毒】及び天雄、附子の毒には、いづれも飴飴を食へば解す。（總錄）【手、足の腐瘡】臘月の飴を炒つて薄はる。（千金方）【火燒で瘡となつたもの】白飴を灰に焼いて粉まぶせば燥いて瘡え易い。（小品方）



# 醬

(別錄下品)

和名 しやうゆ  
洋名 Sauce 又 Soy.

## 釋名

時珍曰く、按ずるに、劉熙の釋名に『醬は將であつて、能く食物の毒を制すること將が暴惡を平げるが如きものだ』とある。

## 二 集解

時珍曰く、麴醬に大麥、小麥、甜醬、麴醬などの種類があり、豆醬に大豆、小豆、豌豆、及び豆油などの種類がある。その醸造法は、

豆油——大豆三升を水で煮糜し、麴二十四斤を拌せて罨ふて黄にし、十斤毎に鹽八斤、井水四十斤を入れて攪きまぜ、晒して油にして貯藏する。

大豆醬——豆を炒り磨つて粉にし、一斗に麴三斗を入れて和勻し、切片して罨ふて黄にしたものを晒し、十斤毎に鹽五斤を入れ、井水に淹けて晒し、出來上つたものを貯藏する。

小豆醬——豆を磨り淨めて麴を和し、罨ふて黄にし、翌年再び磨り、十斤毎に鹽五斤を入れ、臘水に淹けて晒し、出來上つたものを貯藏する。

豌豆醬——豆を水に浸して軟に蒸し、晒し乾して皮を去り、一斗毎に小麥一斗を

(一)木村(庚)曰く、參考ニ本邦ノ醬油ニツイテ述ブレバ、醬油ハソノ原料等ノ異ナルニ從ヒ左ノ如ク區別スルヲ得。

(二)普通醬油 豆類(大豆等)、小麥(或ハ裸麥)及食鹽水ヲ以テ醸造シ、時トシテ來其他ノ穀類ヲ添加シ、又醸成後少量ノ味淋カラメル、或ハ甘草羹ヲ混和セルモノナリ。

(三)溜醬油 原料トシテ單ニ豆類及ビ食鹽水ヲ用キ醸造シタルモノヲ生引溜ト稱

シ、生引湯分離後ノ  
輪ニ砂糖若クハ蜂蜜  
及ビ食鹽水ヲ混和セ  
シモノヲにいら醬油  
トイフ。

(三) 複製醬油 普通  
醬油製法原料ノ他ニ  
海藻及魚介類ノ煎汁  
又ハ米穀、酒糟等ヲ  
混和シ釀成セシメタ  
ルモノニシテ、昆布  
醬油、牡蠣醬油、酒  
糟醬油、糯米醬油等  
之ニ屬ス。

(四) 固形醬油 普通  
醬油或ハ溜醬油ヲ蒸  
發乾燥シテ塊状ニ便  
ナラシメタルモノニ  
シテ、固間濃粉ノ如  
キ物質ヲ混和シ製ス  
ルコトアリ、醬油エ  
キス、便利醬油、濃  
厚醬油、粉末醬油等  
是ニ屬ス。

麩に磨つて入れ、和して切り、蒸してからかこひ、黄にして晒し乾し、十斤毎に  
鹽五斤、水二十斤を入れて晒し、出来上つたものを貯藏する。

麸醬——小麦麸を蒸熟してきふて黄にし、晒し乾して磨碎し、十斤毎に鹽三斤、  
熱湯二十斤を入れて晒し、出来上つたものを貯藏する。

甜麩醬——小麦麩を和劑し、切片して蒸熟し、かこひて黄になつたものを晒してかこ  
ひ、十斤毎に鹽三斤、熱水二十斤を入れて晒し、出来上つたものを貯藏する。

小麦麩醬——生麩を水で和し、布で包んで踏んで餅にし、かこひて黄にして晒し、  
十斤毎に鹽五斤、水二十斤を入れて晒し、出来上つたものを貯藏する。

大麥醬——黑豆一斗を炒熟して水に半日浸し、その水で煮爛し、大麥麩二十斤を  
拌ぜ合せながら麩を篩ふるひ下し入れ、豆を煮た汁で和劑して切片し、蒸熟しかこ  
て黄にして晒し搗き、一斗毎に鹽二斤、井水八斤を入れて晒せば出来上る。黒  
く甜あまくして汁が清むものだ。

又、麻滓ましつ醬といふがある。麻枯餅を搗いて蒸し、麩を和勻してかこひて黄にし、  
普通の方法と同じく鹽、水を用ゐて晒せば出来上る。色、味の甘美なものだ。

(一) 木村(康)曰ク、  
(成分) 醬油ノ正當成分中既ニ知ラレタルモノハ、水分、蛋白質、アミノ酸類、有機鹽、葡萄糖、糊精、乳糖、酒酸、グリセリン、食鹽、硫酸鹽、石灰、マгнеシア、カリ等ニシテ、其他尙不明ノ物質ヲ含有ス。

### 氣味

【鹹し、冷、利にして毒なし】時珍曰く、麴醬は鹹し。豆醬、甜醬、豆油、大麥醬、麸醬はいづれも鹹く甘し。〇洗曰く、多食すれば小兒の無辜を發し、痰を生じ、氣を動ずる。妊婦が雀肉と食合すれば生れる兒の顔が黒くなる。頑曰く、麥醬を鯉魚に和して食へば口瘡を生ずる。

### 主治

【熱を除き、煩滿を止め、あらゆる藥、及び熱湯の火毒を殺す】(別錄)

【一切の魚肉、菜蔬、蕈の毒を殺し、并に蛇蟲、蜂蠆等の毒を治す】(日華) 醬汁を下部に灌入すれば大便不通を治す。耳中に灌げば飛蛾、蟲蟻の耳に入りたるを治す。狂犬の咬傷、及び湯火傷灼のまだ瘡とならぬものに塗れば效がある。又、砒の中毒には、水で調へて服すれば解す(袖珍方)

### 發明

弘景曰く、醬は多くは豆を用ゐて作るもので、純然たる麥のみのものは少だ。藥に入れるには豆醬を用うべきもので、陳久なるものほど好し。又、魚醬、肉醬といふがあるが、それはみな醃と呼ぶものだ。藥用には入れない。

洗曰く、小麥醬は藥力を殺すが豆醬には及ばない。又、麋、鹿、兔、雉、及び鱧魚の醬もあるが、いづれも久しく食つてはならぬ。

宗奭曰く、聖人は『醬を得ざれば食はず』といった。その意味は、五味が和し、五臟が悦んで受け入れるやうにするといふのであつて、これはやはり安寧、平和を得る方法の一端だ。

時珍曰く、『醬を得ざれば食はず』といふは、やはり飲食、百藥の毒を殺すことを同時に目的としたものだ

附方

舊六

【手指の掣痛】醬の清んだものに蜜を和し、溫熱にして浸す。瘰

えれば止める。(千金)

【瘰癧風駿】

醬清で石硫黃の細末を和して日毎に搗る。(外臺秘要)

【妊娠下血】豆醬二升から汁を去つて豆を取り、炒り研つて酒で方寸匕を服す。一

日三回。(古今錄驗)

【妊娠尿血】豆醬一大盞を熬り乾し、生地黃二兩と末にし、一錢づ

つを米飲で服す。(普濟方)

【浸淫瘡癰】

醬臠に人尿を和して塗る。(千金翼)

【輕粉の毒を氣す】輕粉を服して口が破れたるには、三年の陳醬を水に溶かして頻りに漱ぐ。

(類湖集簡方)

榆仁醬 (食療)

和名 にれのみのしやう  
洋名 Elm-fruit Soy.

校正

もとは醬の條に附録されたが、本書には分離して記載した。

集解

時珍曰く、釀造法は、榆仁（みだん）を取つて水に一伏時浸して洗袋に盛り、揉みつて涎を去り、蓼汁（れうじゅう）を拌ぜて晒す。かく七回繰返してから、發酵した麴麴と共に一般釀造法の通りにして鹽を入れて晒す。一升到對して麴四升、鹽一升、水五升の割合である。崔寔の月令に醬醢——音は牟偷（ホウトウ）——と謂つてあるがこのものだ。

氣味

【辛美である。溫にして毒なし】

主治

【大、小便、心腹の惡氣を

利し、諸蟲を殺す。多食は宜しくない】（孟詵）

燕荑醬（食療）

和名 ぶいのみしやう  
洋名 Soy prepared from the fruits of *Ulmus macrocarpa*, Hance.

校正

もとは醬の條に附録されたが、本書には分離して記載した。

集解

時珍曰く、釀造法は榆仁醬と同じ。

氣味

【辛美にして微臭がある。溫にして毒なし】 多食すれば髪が落ちる。

主治

【三蟲を殺す。功力は榆仁醬よりも強し】〔孟詵〕

發明

張從正曰く、北方の地では、一般に多く乳酪にゅうく、酥そ、脯ほなどの甘美な物を食ふので、いづれも蟲が生ずる萌もやしがあるのだが、しかし蟲の生ぜぬのは、蓋し食物中に胡荽こずい、蕪荑ぶい、鹵汁ろじふなど九蟲を殺す物が多くあるからだ。

醋

（別錄下品）

和名す  
洋名 Vinegar.

釋名

酢

音は醋そである。

醃

音は今けいである。

苦酒

弘景曰く、醋、

酒は入れぬものがないといふほどに利用される。久しく經たものほど良し。またこれを醃えんともいひ、苦味があるところから俗に苦酒と呼び、丹家ではまた他の物を加へて華池左味といふ。時珍曰く、劉熙の釋名には「醋は措そである。能く食毒を措置する」とある。古方には多く酢の字を用ゐてある。

〔二〕集解

恭曰く、醋には米醋、麥醋、麴醋もくそ、糠醋、餒醋たうそ、桃醋などの

數種がある。葡萄、大棗、蓼あうい等諸種の雜果醋は會意のもので、やはり極めて酸烈だ。しかし米醋の二三年を経たものだけを藥に入れるので、その他のものはただ食

〔二〕木村（康）曰く、  
醋ハ古キ酒又ハ酒精  
チ原料トシ、醋酸菌  
Bacterium acetiニ  
ヨリ酒精ノ酸化シテ



醋酸トナリタルナ  
リ。西洋ニテハ葡萄  
酒、麥酒、果汁等ヲ  
原料トス、又木醋ヨ  
リモ製ス、近時ハ醋  
酸ヲ稀薄波トナシ、  
又ハ無機酸ニテ偽造  
スルコトアリ。  
(二) 江河トハ黃河ト  
揚子江ノ中間地帯ヲ  
指スカ。

ふだけに止まり、薬には入れられない。

説曰く、北方では一般に多く糟醋を作り、江河地方では一般に多く米醋を作る。小麥醋は糟醋に及ばない。それは他の物と妨げ忌む関係が多いためだ。大麥醋は良し。

藏器曰く、蘇氏は、葡萄、大棗などの諸果も醋に作れるといつたが、彼は荆楚の出身で、その地方は儉約で極端に始末のよい處だから、果物が腐敗するとそれで醋を醸造するのである。糟の醋でさへ薬に入れる位だから、果物のものは申すに及ばずだ。

時珍曰く、米醋——三伏の時期に、倉米一斗を淘淨して飯に蒸し、攤し冷し、倉米を黄にし、晒し鍍つて水で淋淨し、別に倉米二斗を飯に蒸してそれと和勻し、甕に入れ水に淹けて密封し、二十一日間暖かな場所に置けば出來上る。

糯米醋——秋社の日に糯米一斗を淘つて蒸し、六月六日に造つた小麥大麴をそれと和勻し、水二斗と甕に入れて封じ、二十一日間醸せば出來上る。

粟米醋——陳粟一斗を淘つて七日間浸し、再び蒸して淘熟し、甕に入れて密封し、

朝夕攪き廻す。七日で出来上る。

小麥醋——小麥を水に三日間浸して蒸熟し、畜ふて黄にし、甕に入れて水に四十  
九日間淹けて置けば出来上る。

大麥醋——大麥米一斗を水に浸して飯に蒸し、畜ふて黄にし、晒し乾して水で淋  
過し、再び麥飯二斗をそれに和勻し、水を入れて封閉し、二十一日間置けば出  
来上る。

餒醋——餒一斤、水三斗を煎じ化して白麴末二兩を入れ、瓶に封じて晒して置け  
ば出来上る。

その他、糟、糠等の醋はいづれも藥には入れない。盡くは記述しきれない。

### 米醋 (三) 氣味

【酸く苦し、溫にして毒なし】 説曰く、大麥醋は微寒である。

(三) 木村(康)曰ク、  
(成分) 參考マデニ日  
本醋ノ組成チカカク  
レバ水分九三・一六  
%、醋酸三・八四%、  
葡萄糖〇・九九%、糊  
精〇・三一%、灰分  
〇・二%ナリ。

その他の醋はいづれも同じ。弘景曰く、多食すれば肌、臟を損ずる。藏器曰く、多  
食すれば筋骨を損じ、また胃をも損ずる。男子に益せず、顔色を損ずる。醋は諸藥  
を發するものだから共に食つてはならぬ。時珍曰く、酸は木に屬する。脾病の者は  
酸を多く食つてはならぬ。酸は脾を傷め、肉が膈んで唇が掲れる。○茯苓、丹參を

服するものは醋を食つてはならぬ。鏡源に曰く、米醋で煮れば四黄、丹砂、膽礬、常山の諸藥を制す。

### 主治

【癰腫を消し、水氣を散じ、邪毒を殺す】（別錄）【諸藥を理し、毒を消す】（烏鵲）【産後の血運を治し、癥塊堅積を除き、食を消し、惡毒を殺し、結氣、心中の酸水、痰飲を破る】（藏器）【氣を下し、煩を除き、婦人の心痛、血氣、并に産後、及び傷損、金瘡出血、昏運を治し、一切の魚肉、菜の毒を殺す】（日華）【醋に青木香を磨つたものは卒心痛、血氣痛を止める。黄蘗を浸して含めば口瘡を治す。大黃末を調へて腫毒に塗る。生大黃を煎じて服すれば瘰癧を治するに甚だ良し】（孟詵）【瘀血を散じ、黄疸、黄汗を治す】好古曰く、張仲景の黄汗を治するものに黄芪芍藥桂枝苦酒湯があり、黄疸を治するものに麻黄醇酒湯があつて、苦酒、清酒を用ゐてある。方は金匱要略に記載されてある。

### 發明

宗奭曰く、米醋は諸醋に比して最も醜い。藥に多くこれを用ゐるは殺氣が完全だからだ。故に糟醋に勝る。産婦の室内は常に炭火を置いて醋氣を沃ぐが佳し、酸は血を益するものだ。これで雄黄を磨つて蜂螫の毒に塗るは、やはりその

(四) 大觀ニ強チ盛ニ  
作ル。

(五) 大觀ニ意ヲ説ニ  
作ル。

收して散ぜざる作用を利用するのだ。現に一般に酸を食へば齒が軟になるといふが、それは水は木を生じ、水氣が弱ければ木氣が(四)強いからさうなるのだ。靴皮を造るに醋を用ゐて紋斂もんせんすることになつてゐるから見ても、その性の收斂しうれんすることが判る。酸、收なりといつた(五)意と矛盾むじゆんしない。

時珍曰く、按ずるに、孫光憲の北夢瑣言に『下婢が兒を抱いて炭火の上に落して焼灼せうしやくしたとき、醋泥を傳けるとやがて癒えて痕がなくなつた。又、ある少年は眼中に常に一枚の鏡があるやうに見えるのであつたが、趙卿が「明朝魚鱗ぎょりんを馳走したい」とその少年を招ぎ、少年が約束の時刻に訪ねて往くと、そのまま一向に何の様子もなく待たせて置いた。少年は甚しく空腹を感じ始め、ふと卓上に一箇の瓶の中に芥醋さいが入れてあるのを見て、やがて少しづつそれを吸すすつた。すると胸中が大そうさつぱりして、眼花が見えなくなつて了つた。そのとき趙卿が「君は魚鱗を多く食ひ過ぎたのだ。魚は芥、醋を畏れるものだから、計略で今その疾を癒して進ぜたのだ」といつた』とある。この二例は別錄に「癰腫ようしゆを治し、邪毒を殺す」ある事實を驗證するものともいへる。概して醋の諸瘡腫、積塊、心腹疼痛、痰水、血病を治し、魚

肉、菜、及び諸蟲の毒氣を殺すは、その酸收の作用を利用する以外ではないのであつて、また瘡を散じ、毒を解する功力がある。李廷飛は「醋は能く飲を少くし、寒を辟けること酒に勝るものだ」といひ、王猷は幼より醋を食はなかつたが、年八十を踰えてなほ能く神を傳へたといふ。

#### 附方

舊二十、新十三。

【身體の卒腫】醋で蚯蚓尿を和して傳ける。(千金) 【白虎

風毒】三年の醃醋五升を煎じて五沸し、葱白三升を切つて煎じて一沸し、漉し出して布に染め、熱に乗じて裹む。痛が止まつたならば已める。(外臺秘要) 【霍亂吐利】

鹽、醋を煎じて服するが甚だ良し。(如宜方) 【霍亂煩脹】なほ吐下せぬには、好き苦

酒三升を飲む。(千金方) 【足上の轉筋】故綿を醋中に浸し、飢で蒸し熱して裹み、冷

えれば易へる。瘡えるまで手を停めず試みる。(外臺) 【汗が出て滴らぬもの】腰脚が

瘦せ、并に耳の聾するには、米醋に荊三稜を夏は四日、冬は六日浸して末にし、二錢

を醋湯で調へて服すれば瘡える。(經驗後方) 【腋下の狐臭】三年の醃醋で石灰を和し

て傳ける。(外臺) 【癰瘍風病】酢で硫黃末を和して傳ける。(外臺秘要) 【癰疽の潰れぬ

もの】苦酒で雀尿を和し、小豆大ほどを瘡癰に傳ける。上が穿つものだ。(肘後方) 【舌

(方大觀ニ三ニ作ル。



〔七〕大觀ニ脱トニ皮  
字アリ。

〔八〕大觀ニ醋トニ一  
升ノ二字アリ。

〔九〕布ハ布ノ誤。

〔一〇〕大觀ニ胡字ナシ。

腫の消かぬもの」酢で釜底墨を和して舌の上下に厚く傅け、（毛脱ちるときは更に傅ける）須臾に消くものだ。（千金方）【木舌の腫強】醋で時時に含漱する。（普濟方）【牙齒の疼痛】大醋ハで枸杞ハ白皮一升を煮て半升を取り、含嗽すれば瘥える。（肘後方）【鼻中の出血】酢で胡粉を裏半箇ほど和して服す。○又、ある法では、醋で土を和して陰囊に塗り、乾けば易へる。（千金方）【耳を塞いで聲を治す】醇酢（じゆんそ）を用ゐて微火で附子を炙き、尖に削つて塞ぐ。（千金方）【面皴雀卵（めんそうづくろふらん）】苦酒に布を漬けて常に拭ふ。（肘後方）【砒石の中毒】醴醋を飲んで吐けば瘥える。水を飲んでではならぬ。（廣記）【硫を服して發した癰】酢で敗（こ）を和し、膏に研つて傅け、燥けば易へる。（千金方）【雞子の中毒】醋少量を飲めば消する。（廣記）【全身に虱（しつ）の出たとき】方は石部鹽石にある。【毒蜂の整傷（どくへいのせいやう）】清醋一二盃を急に飲んで毒氣の散らぬやうにし、然る後に藥を用ゐる。（濟急方）【蠍（か）の刺螫】醋に附子を磨つて汁を傅ける。（醫學心鏡）【蜈蚣の咬毒（ごころ）】醋に生鐵を磨つて傅ける。（後中方）【蜘蛛の咬毒】上記の方に同じ。【蠅螬尿瘡（えうさう）】醋で（二〇）胡粉を和して傅ける。（千金方）【諸蟲の耳に入つたとき】凡そ百節、蜘蛛、蟻が耳に入つたときは、苦酒を注入して起つて歩めば出る。（錢相公簡中方）【湯火傷灼】直ち



に酸醋で淋洗し、并に醋泥を塗るが甚だ妙である。癰痕もなくなる。【狼烟の口に入つたとき】醋少量を飲む。(秘方) 【足上の凍瘡】醋で足を洗つて藕かきを研つて傅ける。【胎兒が死亡して下らぬもの】月の足らぬには、大豆を醋で煮て三升を服すれば立ろに分解する。なほ下らぬときは再服する。(子母秘錄) 【胞衣不下】腹が満すれば死亡する。水に醋少量を入れて顔面に噴くが神效がある。(聖惠方) 【鬼撃卒死】醋少量を鼻中に吹入る。(千金) 【乳癰の堅硬なるもの】罐に醋を作り、石を燒熱して投ずること二回、それを温めて癰を潰け、冷えたときは更に石を燒いて投じて潰ける。三回に過ぎずして癒える。(千金) 【疔腫の初期】腫を麴で圍み、針で瘡上を亂刺し、銅器で醋を煎じ沸わらして麴の圍の中に傾け入れ、一盞ほどを容れて置き、冷えれば易へる。三回にして根が出る。

## 酒

(別錄中品)

和名 さけ  
洋名 Sake. (Rice-beer)

### 校正

拾遺の糟笱酒、社酒をこの一條に併記した。

### 釋名

時珍曰く、按ずるに、許氏の説文に「酒さけは就なりである。人の善惡を就なり

所以である』とある。一説に、酒の字の篆文は、酒が甬中にある状態の形容だといふ。飲膳標題には『酒は、清めるものを釀といひ、濁れるものを盎といひ、厚きを醇といひ、薄きを醕といひ、二重に釀したものを酎といひ、一夜作りのものを醴といひ、美なるを醕といひ、まだ搾らぬものを醕といひ、紅なるを醖といひ、緑なるを醕といひ、白きを醖といふ』とある。

**集解**

恭曰く、酒には、黍、秫、粳、糯、粟、麴、蜜、葡萄等の種類がある。凡そ酒醴を作るには麴を用ゐることになつてゐるが、葡萄、蜜等の酒だけは麴を用ゐない。諸種の酒それぞれ醇、醕の差異がある。米の酒だけを藥用に入れる。

藏器曰く、凡そ好酒の熟せんとするときは、みな能く風潮を候て轉ずる。これは陰陽に合するものだ。

詵曰く、酒に紫酒、薑酒、桑椹酒、葱豉酒、葡萄酒、蜜酒があり、また地黄、牛膝、虎骨、牛蒡、大豆、枸杞、通草、仙靈脾、狗肉等、いづれも和して酒に醸し得る。いづれもそれぞれに方がある。

宗奭曰く、戰國策に『帝女儀狄が酒を造つて禹に進めた』とあり。説文には『少

康が酒を造る。即ち杜康なり』とあるが、しかし、本草には已に酒の名の記載があり、素間にも酒、漿といつてあるところを見ると、酒は黃帝の時から始つたので、儀狄ぎてきから始つたものではない。古方に用ゐてある酒には、醇酒、春酒、白酒、清酒、美酒、糟下酒、粳酒、秬黍酒、葡萄酒、地黄酒、蜜酒、有灰酒、新熟無灰酒、社壇しつだん餘酢酒よさくしゆがあり、今一般に用ゐるものには、糯米、煮酒、小豆麴酒、香藥麴酒、鹿頭酒、羔兒等かうじの酒がある。江浙、湖南、湖北にはまた糯米にさまざまな藥を入れて作つた麴で作る餅子酒がある。官で取扱ふものの中にはまた四夷の酒もあるが、中國でそれを標準的なものとして採用するわけには行かない。今醫家で用ゐるには、それ等に就いて十分に斟酌しんさくを要する。但し酒を飲むといふことはただその味を取るので、藥に入れて如何なるものであるかをば顧みないのであるが、しかし、久しくこれをを用ゐるときは大抵病を作すのである。蓋しこの物は損と益とを兼行するものだから、十分慎まねばならぬものだ。漢の時に丞相に賜つた上尊酒といふは、糯米を上とし、稷を中とし、粟を下としたが、現に佐、使として藥に入れるには専ら糯米を用ゐ、清水と白麴麴とで醸造するを正しいものとする。古代には諸藥を入れて麴を

造るといふことはなかつたので、随つて功力が和厚で他の酒のいづれにも勝つたのである。今一般にはまた麴けつで醸造するが、あれはただ醴といふもので酒ではない。書經に『若し酒、醴を作らば、爾なんち惟これ麴ことあるのだから、酒といふときは麴を用ゐたもの、醴といふときは麴を用ゐたものであつて、氣味に甚しい懸隔がある。治療上にも差異のなかるべき道理はあるまい。

穎ひん曰く、薬に入れて用ゐるには東陽酒が最も佳し。その酒は古から有名なもので、事林廣記にその醸造法の記載があるが、麴にはやはり薬を用ゐたものだ。今はその方法が絶えて無くなつて、ただ麴、麴を用ゐ、麴れうじ汁を拌まぜて造るのだが、それはその物の辛辣しんらつなる力を假かるためであつて、蓼れうはまた解毒の作用もある。その酒は清香が遠くまで達し、色はまた金のやうな黄色で、酔ふほど飲んでも頭痛せず、口が乾かず、瀉わを作さない。その酒の醸造に用ゐてゐる水を秤はかつて見るに、他の土地の水に比して重量があり、隣接した土地で使用する水でもみなさうは行かぬところを見ると、これは全然水の美なるに因するものらしい。處州の金盆露は、水に薑汁を和して造つた麴と浮飯とで醸造し、味も醇美で結構なものだが、色、香の點で東陽に

(一) 麻姑泉ハ江西省南城縣ノ西南ニアル麻姑山ニ發源ス。

(二) 金華ハ隋ノ縣名、今ノ縣城ノ北ニアル金華山ニヨリテソノ地ヲ呼ビタルモノナリ。

(三) 襄陵ハ漢ノ縣名、今ハ山西省河東道ニ屬ス。

(四) 秦蜀、秦ハ陝西、蜀ハ四川地方チイフ。

(五) 食療正要ニ藥ヲ作ニ作ル。

(六) 木村(康)曰ク、雲南ノ酒ニ日本酒ニ似テ清酒ニ本邦ニ於テ清酒醸造ノ起源ハ明瞭セラズト

劣る。これはその水が及ばないからだ。江西の麻姑酒は醸造用水の(一)泉から名を得たものだが、麴には群(二)の藥が入つてゐる。金陵の瓶酒は麴、米に非難すべきところはないが水に醴があり、且つ灰を用ゐてあつて、味に甚だ甘味が多く、能く痰を聚める。山東の秋露は色が白く、味は純にして烈しい。蘇州の小瓶酒は麴に葱、及び紅豆、川烏の類が入れてあつて、飲めば頭痛し、口が渴く。淮南の綠豆酒は麴に綠豆があつて能く毒を解するが、しかしこれも灰があるので美味でない。

時珍曰く、東陽酒、即ち(三)金華酒である。古の蘭陵の地で、李太白の詩に所謂「蘭の美酒、鬱金香」とはこの酒のことだ。平常の飲料として、藥用としていづれも良し。山西の(四)襄陵酒、薊州の薏苡酒はいづれも清烈だが、ただ麴中にやはり藥物がある。黃酒には灰がある。(五)秦、蜀にある甕(六)酒といふは、稻、麥、黍、稷、(七)藥麴を用ゐ、小罌に封じて醸造するもので、筒で吸つて飲むものだ。これは穀氣が雜つてゐるので酒が清美でない。いづれも藥用には入れられぬ。

### 米酒

#### 氣味

【苦く甘く辛し、大熱にして毒あり】 説曰く、久しく飲めば神を傷り、壽を損じ、筋骨を軟にし、氣痢を動ずる。醉臥して風に當れば癰風となり、



雖モ、ソノ釀造法ハ支那ヨリ出テ、朝鮮人初メテ之ヲ傳ヘタルモノナリト云フ。明治三十七年一二月法律第三號ヲ以テ改正セラレタル酒造税法中ニ定ムル清酒ノ定義ハ次ノ如シ、即チコノ税法ニ於テ清酒ト稱スルハ米、米麴及水ヲ原料トシテ醱酵セシメ、又ハ酒酵母ヲ加ヘテ醱酵セシメ、之ヲ濾過シタルモノヲ謂フ、尙左ニ掲グルモノハ清酒ト看做ス。

一、前項原料ノ他麥粟、玉蜀黍稗、清酒粕又ハ燒酎ヲ原料トシ醱酵セシメ、又ハ酒酵母ヲ加ヘテ醱酵セシメ之ヲ濾過シタルモノ。

二、清酒又ハ清酒ト看做シタルモノヲ粕

酔ふて冷水を浴すれば痛痺となり、丹砂を服する人が飲めば頭痛し、吐し、熱する。士良曰く、凡そ丹砂、北庭、石亭脂、鍾乳の諸石、生薑を服するには、長く酒を用ゐて服してはならぬ。能く石藥の氣を引いて四肢に入れ、滯血が化して癰疽となる。

藏器曰く、凡そ酒は諸種の甜き物を忌む。酒漿は人を照映して見て影のないものは飲んでではならぬ。祭りに用ゐた酒で自ら耗つたものは飲んでではならぬ。酒と乳とを合せ飲めば人をして氣結せしめる。牛肉と共に食へば人をして蟲を生ぜしめる。酒を飲んで後に黍稷の上に臥し、猪肉を食へば大風を患ふ。

時珍曰く、酒後に芥、及び辣き物を食へば人の筋骨を緩にする。酒後に茶を飲めば腎臓を傷めて腰脚が重墜し、膀胱が冷痛し、兼て痰飲、水腫、消渴、癰痛の疾を患ふ。一切の毒藥を酒で用ゐた場所には治し難い。又、酒は鹹を得て解するは水が火を制するのであつて、酒の性は上り、鹹は潤下するものだ。又、枳椇、葛花、赤豆花、綠豆粉を畏れるは寒が熱に勝つのである。

### 主治

【藥勢を行らし、百邪、惡毒の氣を殺す】(別錄) 【血脈を通じ、腸、胃を



瀝シタルモノ。

三、清酒又ハ前二號ニ依リ清酒ト看做シタルモノニ、其容量百分ノ一以內ノ燒酎又ハ酒精ヲ混和シタルモノ。

清酒ニ對シテハ未ダソノ鑑定標準ヲ定ムルノ域ニ達セズ、次ニ各稅務監督局ニ於テ行ヘル四百三十餘種ノ分析成績ヲ掲ゲテ參考ニ資ス。比重ハ〇・九一六五—一・〇六〇八、アルコホル一〇・七—二〇・六容%、エキス一・八〇—九・〇六%、總酸〇・一四—一・七九%、ケリセリン〇・一〇—二・五七%、鐵物質〇・〇一—〇・四一%、燐酸〇・〇〇二—〇・〇七%、糖分〇・〇一—二・四〇%、糊精〇・〇一—二・一

厚くし、皮膚を潤ほし、濕氣を散し、憂を消し、怒を發し、言を宣べ、意を暢<sup>わ</sup>べる」

〔藏器〕「脾氣を養ひ、肝を扶<sup>たす</sup>け、風を除き、氣を下す」〔孟詵〕「馬肉、桐油の毒、丹

石發動の諸病を解す。熱飲するが甚だ良し」〔時珍〕

糟底酒 三年目の臘月に糟下から取る。〔胃を開き、食を下し、水臓を暖め、腸、

胃を溫め、宿食を消し、風寒を禦ぎ、一切の蔬菜の毒を殺す〕〔日華〕「嘔<sup>おう</sup>噦<sup>えつ</sup>を止める。

風痿、腰膝の疼痛を摩する」〔孫思邈〕

老酒 臘月に釀造したものは數十年經つても腐敗せぬ。〔血を和し、氣を養ひ、

胃を暖め、寒を辟<sup>しりぞ</sup>け、痰を發し、火を動ずる〕〔時珍〕

春酒 清明に釀造したものはやはり久しく持てる。〔常に服すれば人體を肥白な

らしめる〕〔孟詵〕「蠅<sup>く</sup>蠅<sup>さう</sup>尿<sup>れう</sup>瘡<sup>そう</sup>には、これを飲んで酔ふ。須臾にして米のやうな蟲が出

る」〔李絳兵部手集〕

社壇餘酢酒〔拾遺〕「小兒の語遲を治す。口中に納れるが佳し。又、これを屋根の

四隅に噴<sup>ふ</sup>けば蚊子を辟ける」〔藏器〕「これを飲めば聾を治す」時珍曰く、按ずるに、海

錄碎事に『俗間の傳説に、社酒は聾を治すといふ。故に李濤の詩に「社翁今日心情

二〇。  
(七) 北庭ハ礪砂ノ別  
名。  
(八) 大觀ニ石上ニ舉  
字アリ

沒<sup>な</sup>し。爲に寄す聲を治する酒一瓶の句がある』とある。

糟筍節中酒

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

【飲めば噎氣、嘔逆

に主效がある。或は小兒乳、及び牛乳を加へて共に服す。又、癰瘍風を摩する】(藏器)

東陽酒

氣味

【甘く辛し、毒なし】

主治

【用ゐて諸藥を制するに良し】

發明

弘景曰く、大寒には海が凝<sup>こほ</sup>るが酒は氷らない。その性の熱なること特

に群<sup>おほ</sup>くものに冠絶することが明だ。藥家では多くこれを用ゐて藥の勢力を行<sup>おこ</sup>す

が、一般人が多く飲めば體弊し、神昏する。これはその物に毒のあるためである。

博物志に『王肅、張衡、馬均の三人が早朝に霧を冒して旅行したとき、一人は酒を  
飲み、一人は十分に食事を攝<sup>と</sup>り、一人は空腹で出發したが、空腹のものは死亡し、  
十分に食つたものは病に罹り、酒を飲むものは健全だつた』とある。これは酒の  
勢が惡を辟けること他の食物に勝ることの例證だ。

好古曰く、酒は、能く諸經に引いて止まぬこと附<sup>ぶ</sup>子と同様だ。味の辛は能く散じ、

苦は能く下し、甘は能く中に居て緩にする。これを他の藥を導引するに利用すれば、  
全身の表に通行し、極高の部分にまで到達させることを得るものだ。味の淡なるも

(九) 天葵ハ女血、男  
精ノ稱。

のは小便を利用して速に下るものである。古代にはただ麥で造つた麴で黍を醸したもののだが、それすら辛、熱にして毒ありとされたのである。當今の醒すものは烏頭、巴豆、砒霜、薑、桂、石灰、竈灰の類の大毒、大熱の藥を加へてその氣味を増すものだ。いかで冲和を傷り、精神を損じ、營衛を涸し、天葵を竭して人間の壽命を天せぬわけに行かうぞ。

震亨曰く、本草には、ただ『酒は熱にして毒あり』といつただけで、中を濕し、熱を發することを説いてないが、相火を近くものなることが、酔ふて後に振寒し、戰慄することを以ても首肯される。又、性は喜んで升り、氣が必ずそれに隨ふもので、痰が上に鬱し、潮が下に澀し、恣に寒、涼のものを飲めば、その熱が内鬱して肺氣が大いに傷め、その初期で病の浅いうちは、或は嘔吐し、或は自汗し、或は瘡疥を生じ、或は鼻鼾となり、或は泄利し、或は心、脾が痛む。かかる症狀の内は散じても去るのであるが、久しく經過すれば病が深くなつて、或は消渴となり、或は内疳となり、或は肺痿となり、或は鼓脹し、或は失明し、或は哮喘し、或は勞瘵となり、或は癰癤となり、或は痔漏となり、病名の付け難い病となる。かうなつては具眼の

名醫ならでは容易に處し得ないものである。そもそも醇酒は性の大熱なものだ。飲む者には飲んで旨いといふだけでそれ等の事に全然迂濶であるが、正しい考からすれば冷で飲むがよい。それには三種の益があつて、肺を過ぎ胃に入つて然る後に肺を微温にし、中を温むるの意味から氣を補すことになり、次には寒中の温の作用から胃を養ふことになる。冷酒は行ることが遅くして傳化が漸漸に行はれるものだ。一般に恣に飲むべきものではないのだが、世間の状態はさうでない。ただ喉と舌とに快く感ずればよいといふだけに心得てゐる。

穎曰く、一般に朝の酒を戒めることは心得てゐて、夜飲むことの更に甚しいに氣がつかないが、十分に酔ひ、十分に食つてから睡つて枕に就けば、熱擁して心を傷ひ、目を傷ふ。夜の收斂する氣を酒で發するから、その清明を亂し、その脾、胃を勞し、濕を停め、瘡を生じ、火を動じ、慾を助け、ために病を惹き起すものが多いのである。朱子のいつた『酔を以て節を爲す』位がよいところなのだ。

機曰く、按ずるに、扁鵲は『過飲すれば腸を腐し、胃を爛し、髓を潰し、筋を蒸し、神を傷り、壽を損ずる』といつた。昔、ある客が周顗を訪ねたとき、美酒二石

二〇 脇穿ハ心臟麻痺  
ヲ云フナルベシ。

を出して、頸が一石二斗を飲み、客が八斗を飲んだ。翌朝頸は一向苦まなかつたが、客は已に二〇 脇穿して死んでゐたといふ。これは扁鵲の戒を犯したものであらうと思ふ。

時珍曰く、酒は天の美祿であつて、麴、麴の酒少量を飲めば血を和し、氣を行らし、神を壯にし、寒を禦ぎ、愁を消し、興を遣るが、痛飲すれば神を傷り、血を耗し、胃を損じ、精を亡ひ、痰を生じ、火を動ずるものだ。邵堯夫の詩に『美酒を飲んで微酔せしめて後』とある。これは飲酒の妙を得たもので、所謂酔中の趣、壺中の天である。若し夫れ、沈湎して度なく、酔て以て常となすものは、輕きは痰を起し、操行を敗り、甚しきは邦を喪ひ、家を亡ぼして生命を隕するに至る。その害言語の及ぶところでない。それゆゑに大禹は儀狄を疎んじ、周公は酒誥を著して世の範戒としたのである。

【附方】

舊十一、新六。

【驚怖卒死】温酒を灌げば醒める。【鬼撃の諸病】突然襲

はれて刀で刺されたやうになり、胸脇、腹内が切痛して抑へることも按でることもならず、或は吐血し、鼻血し、下血するものは、一名鬼排と名ける。醇酒を兩鼻中



(二)大觀ニ杵ニ作ル。

に吹くが良し。(肘後) 【馬氣の瘡に入つたもの】或は馬汗、馬毛が瘡に入つたものは、いづれも腫痛、煩熱を起す。腹に入れば死亡する。多く醇酒を飲んで酔ふ。癒えること妙である。(肘後方) 【虎に傷けられた瘡】ただ酒を飲んで常に大酔する。毛を吐出すものだ。(梅師) 【蛇咬の瘡】煖酒で一日三回瘡上を淋洗する。(廣利方) 【蜘蛛瘡毒】上記の方に同じ。【毒蜂の螫傷】方は上に同じ。【咽が傷んで聲の破れるもの】酒一合、酥一匕、乾薑末二匕を和して一日二回服す。(十便良方) 【三十年の耳聾】酒三升に牡荊子一升を七日間漬けて滓を去り、性に任せて飲む。(千金方) 【天行餘毒】手、足が腫れて斷れんとするほど痛むには、深さ三尺の坑を掘つて焼き熱し、その中に酒を灌ぎ入れ、屐を着けその坑中に入つて坐り、衣類を被せて氣の泄れぬやうにする。(類要方) 【下部の痔瘻】地に小坑を掘つて赤く焼き、酒を沃いで吳茱萸を投じ、その上に坐る。三回に過ぎずして良し。(外臺) 【産後の血悶】清酒一升到生地黃汁を和して煎じて服す。(梅師) 【身體、面部の疣目】酸酒酢を盗んで洗ひ「疣疣不知羞酸酒酢洗倆頭急急如律令」と七遍咒文を唱へれば自ら癒える。(外臺) 【禁酒法】酒七升、硃砂半兩を瓶に浸して堅く封じ、それを猪の檻に入れて猪の搖動するに任せ、七日



の後に取り出して頓に飲む。○又、ある法では、正月一日に酒五升を確の中へ淋ぎ、杵き下して取つて飲む（千金方）【男子の脚冷】不隨で歩行不能なるには、淳酒三斗、水三斗を甕中に入れて灰火で溫め、膝まで脚を漬ける。常に灰火を置いて冷えぬやうにし、三日で止める（千金方）【海水の傷裂】凡そ海水や鹹い物にかぶれ、または風に吹かれて裂け、忍び難く痛むには、蜜半斤、水、酒三十斤を用ゐ、防風、當歸、羌活、荊芥各二兩を末にして湯に煎じて浴する。一夕で癒える（使琉球錄）

【附諸酒方】

時珍曰く、本草、及び諸書に、いづれも治病用に釀す酒の方がある。此にその簡要なものを輯めて參考に備へる。藥品の多いものは盡くを掲げるわけに行かない。

愈瘧酒

諸種の瘧疾を治す。頻頻これを溫飲する。四月八日に水一石と麴一斤を用ひ、麴を末にして水中に酸じ、酢くなるを待つて煎じて一石から七斗を煎し取り、冷えるを待つて麴四斤を入れ、一夜置いて上に白沫が生じたとき、種一石を炊いて冷して酸ずる。三日にして酒が出来上る（賈思勰齊民要術）

屠蘇酒

陳延之の小品方に『これは華佗の方であつて、元旦に飲めば、疫癘、一

切の不正の氣を辟ける。釀造法は、赤朮、桂心七錢五分、防風一兩、菝葜はつたつ五錢、蜀椒、桔梗、大黃五錢七分、烏頭二錢五分、赤小豆十四粒を用ゐ、三角に縫つた囊に盛つて除夜に井底に懸け、元日に取出して酒中に入れ、煎じて數沸し、一家舉つて東に向ひ、年少者から年長者の順に飲み、藥滓はまた井戸に投入する。毎歲この水を飲めば一代の間無病である』とある。○時珍曰く、蘇とは魃鬼ききの名で、この藥が鬼爽を屠割するといふところからかく名けたのだ。或はこれは屠蘇庵といふ草庵の名だともいふ。

遂巡酒 虚を補し、氣を益し、一切の風痺、濕氣を去り、久しく服すれば壽を益し、老に耐へ、顔色を好くする。釀造法は、三月三日に取つた桃花三兩三錢、五月五日に取つた馬蘭花はりんがわ五兩五錢、六月六日に取つて脂麻花六兩六錢、九月九日に取つた黃甘菊花九兩九錢を陰乾し、十二月八日に臘水三斗を取り、春分の日を待つて好き桃仁四十九箇を皮尖を去り、白麪十斤と前の花と共に和して麪にし、紙に包んで四十九日間置き、こし糯米飯一升、白水一瓶、麪一丸、麪一塊を用ゐ、封じて良久しばらくすれば出來上る。もし淡いときは再び一丸を加へる。

こし糯米飯一升ハ順  
治本ニ據ル。

**五加皮酒** 一切の風濕、痿痺を去り、筋骨を壯にし、精髓を填<sup>み</sup>てる。五加皮を洗つて骨を刮り去り、汁に煎じて麴、米を和し、釀して出來上つたものを飲む。或は切り碎いて袋に盛り、酒に浸して煮て飲む。或は當歸、牛膝、地榆の諸藥を加へる。

**白楊皮酒** 風毒脚氣、腹中痰癖の石の如くなるを治す。白楊皮を切片し、酒に浸して藥力を發生させて飲む。

**女貞皮酒** 風虛を治し、腰膝を補す。女貞皮を切片し、酒に浸して煮て飲む。

**仙靈脾酒** 偏風不遂を治し、筋を強くし、骨を堅くする。仙靈脾一斤を袋に盛り、無灰酒二斗に浸して三日間密封して飲む。(聖惠方)

**薏苡仁酒** 風濕を去り、筋骨を強くし、脾、胃を健にする。絶好の薏苡仁粉と麴米とを共に酒に釀し、或は袋に盛つて酒で煮て飲む。

**天門冬酒** 五臟を潤ほし、血脈を和し、久しく服すれば五勞、七傷、癰瘤、惡疾を除く。常に酒氣を繼續せしめる。大酔に至つてはならぬ。十日にして風疹の毒氣を出し、三十日にして癰え、五十日にして風の吹くを知らなくなるものだ。冬期に天門冬を心を去つて煮た汁と麴米とを共に釀して造る。熟した初めには微し酸いが、

久しく經つと味が佳くなる。(千金方)

**百靈藤酒**

諸風を治す。百靈藤十斤、水一石を三斗に煎じ取つた汁に糯米三斗、

神麴<sup>しんきく</sup>九斤を入れ、普通の方法のやうに醸して造り、三五日經つて更に糯飯を炊いて

投ずれば熟する。それを澄清<sup>ちやうせい</sup>して日毎に飲む。汗を出して效がある。(聖惠方)

**白石英酒**

風濕周痺、肢節濕痛、及び腎虛の耳聾を治す。白石英、磁石<sup>や</sup>を煨<sup>や</sup>いて

醋に淬<sup>ひた</sup>すこと七回、各五兩を絹袋に盛つて酒中に浸し、五六日して溫飲する。酒が

少くなつたときは更に添加する。(聖濟總錄)

**地黃酒**

虛弱を補し、筋骨を壯にし、血脈を通じ、腹痛を治し、白髪を變ずる。

生の肥えた地黃の汁を絞<sup>ひ</sup>り、麴米と共に器中に密封すること五七日にして啓<sup>ひら</sup>く。中

にある綠汁が眞の精英である。先づそれを飲むがよし。そこで汁を濾して貯藏する。

牛膝汁を加へれば効果が更に速だ。また群<sup>おほ</sup>くの藥を加へることもある。

**牛膝酒**

筋骨を壯にし、痿痺を治し、虛損を補し、久瘧を除く。牛膝の煎汁に麴

米を和して酒に醸す。或は切り碎いて袋に盛り、酒に浸して煮て飲む。

**當歸酒**

血脈を和し、筋骨を堅くし、諸痛を止め、經水<sup>けいすい</sup>を調へる。當歸の煎汁で

或は釀し、或は浸す。いづれも前記の法のやうにする。

### 菖蒲酒

三十六風、十二痺を治し、血脈を通じ、骨痿<sup>こつみ</sup>を治し、久しく服すれば耳、目が聰明になる。石菖蒲の煎汁で或は釀し、或は浸す。いづれも前記の法のやうにする。

### 枸杞酒

虚弱を補し、精氣を益し、冷風を去り、陽道を壯にし、目涙を止め、腰脚を健にする。甘州の枸杞子<sup>こくし</sup>を煮爛して搗き、その汁で麴米を和して酒に釀し、或は子と生地黃とを袋に盛つて酒に浸し、煮て飲む。

### 人參酒

中を補し、氣を益し、諸虚を通治する。人參末と麴米とで酒に釀し、或は袋に盛つて酒に浸して煮て飲む。

### 薯蕷酒

諸風眩運を治し、精髓を益し、脾、胃を壯にする。薯蕷<sup>しよゐ</sup>粉と麴米とで酒に釀し、或は山茱萸、五味子、人參の諸藥と共に酒に浸して煮て飲む。

### 茯苓酒

頭風虚眩を治し、腰脚を暖め、五勞、七傷に主效がある。茯苓<sup>ふくろう</sup>粉と麴米とで酒に釀して飲む。

### 菊花酒

頭風を治し、耳、目を明にし、痿痺を去り、あらゆる病を消す。甘菊花

の煎汁と麴米とで酒に醸す。或は地黄ぎわう、當歸、枸杞の諸藥を加へるも佳し。

**黃精酒** 筋骨を壯にし、精髓を益し、白髮を變じ、あらゆる病を治す。黃精、蒼朮各四斤、枸杞根、柏葉各五斤、天門冬三斤の煮汁一石と麴十斤、糯米一石と普通のやうに酒に醸して飲む。

**桑椹酒** 五臟を補し、耳、目を明にし、水腫で下さねば満し、下せば虚し、腹に入れば十中に一人も活きぬものを治す。桑椹さうじんの搗汁を煎じて麴米と共に普通の方法で酒に醸して飲む。

**朮酒** 一切の風濕、筋骨の諸病を治し、顔色の衰さを駐とどめ、寒暑に耐へる。朮三十斤を皮を去つて搗き、東流水三石に三十日間漬けて取つた汁を一夜露さらし、麴米をそれに浸して醸して飲む。

**蜜酒** 孫眞人曰く、風疹、風癰ふうぜんを治す。沙蜜一斤、糯飯一升、麪麴五兩、熟水五升を共に瓶に入れ、七日間封すれば酒に成る。尋ついでで蜜を入れて酒に代へるも良し。

**蓼酒** 久しく服すれば耳、目を聰明にし、脾、胃を壯健にする。蓼の煎汁で麴米



を和して酒に醸して飲む。

**薑酒** 洗〇曰く、偏風、中惡、とふづ疰忤、心腹冷痛を治す。薑を酒に浸し、一椀を煖服すれば止まる。○ある法では、薑汁で麴を和し、普通の方法のやうにして酒に造つて服するも佳し。

**葱豉酒** 洗〇曰く、煩熱を解し、虚勞を補し、傷寒の頭痛、寒熱、及び冷痢、腸痛を治し、肌を解し、汗を發す。いづれも葱根そうこん、豆豉づしを酒に浸して煮て飲む。

**茴香酒** 突然の腎氣痛で偏墜し、牽引するもの、及び心腹痛を治す。茴香うゐきやうを酒に浸して煮て飲む。舶來の茴香が就中妙である。

**縮砂酒** 食物を消化し、中を和し、氣を下し、心腹痛を止める。砂仁を炒つて研り、袋に盛つて酒に浸して煮て飲む。

**莎根酒** 心中の客熱、膀胱、腸下の氣鬱で常に憂鬱なるを治す。莎根とやこん一斤を切り、香しく熬つて袋に盛り、酒に浸して晝夜服す。酒氣を繼續さすべきものだ。

**茵陳酒** 風疾の筋骨攣急を治す。茵陳蒿いんちんかうを黄に炙いて一斤、稗米一石、麴三斤を普通のやうに酒に醸して飲む。

**青蒿酒** 虛勞、久瘧を治す。青蒿せいこうの搗汁を煎じ、普通のやうに酒に醸して飲む。

**百部酒** 一切の久近咳嗽を治す。百部根を切つて炒り、袋に盛つて酒に浸し、頻頻と飲む。

**海藻酒** 癭風さうふうを治す。海藻一斤を洗淨し、酒に浸して晝夜に少しづつ飲む。

**黃藥酒** 諸癭氣を治す。萬州の黃藥を切斤して袋に盛り、酒に浸して煮て飲む。

**仙茹酒** 精氣虛寒、陽痿、膝弱、腰痛、痺緩、諸虛から起る病を治す。仙茹せんじゆを九蒸九晒して酒に浸して飲む。

**通草酒** 五臟の氣を續け、十二經脈を通じ、三焦を利す。通草子の煎汁と麴米とで酒に醸して飲む。

**南藤酒** 風虛を治し、冷氣を逐ひ、痺痛を除き、腰脚を強くする。石南藤の煎汁と麴米とで醸して飲む。

**松液酒** 一切の風痺、脚氣を治す。大なる松樹の下に坑を掘つて甕かきを置き、その津液しんえきを承けて取り、一斤で糯米五斗を醸して酒を取つて飲む。

**松節酒** 冷風虛弱、筋骨攣痛、脚氣緩痺を治す。松節の煮汁と麴米とで酒に醸し

て飲む。松葉の煎汁でもよし。

**柏葉酒** 風痺の歷節痛を治す。東に向つた側柏葉そくはくたふの煮汁と麴米とで酒に醸して飲む。

**椒柏酒** 元旦にこれを飲めば、一切の疫癘、不正の氣を辟しりぞける。除夜に椒二十一粒、東に向つた側柏葉七枚を酒一瓶に浸して飲む。

**竹葉酒** 諸風熱病を治し、心を清し、意を暢わべる。淡竹葉の煎汁で普通のやうに酒に醸して飲む。

**槐枝酒** 大麻痺瘳を治す。槐枝くわいじの煮汁で普通のやうに酒に醸して飲む。

**枳茹酒** 中風で身が直し、口僻ひがみ、眼急するを治す。枳殼きこくを刮けつて茹じゆにし、酒に浸して飲む。

**牛旁酒** 諸風毒を治し、腰脚を利す。牛旁根を切片し、酒に浸して飲む。

**巨勝酒** 風虛痺弱、腰膝の疼痛を治す。巨勝子二升を香しく炒り、葱苡仁二升、生地黃とらうがわう半斤と袋に盛つて酒に浸して飲む。

**麻仁酒** 骨髓の風毒で動けぬものを治す。大麻子中の仁を取つて香しく炒り、袋

に盛つて酒に浸して飲む。

桃皮酒 水腫を治し、小便を利す。桃皮の煎汁と稗米とを酒に醸して飲む。

紅麴酒 腹中、及び産後の瘀血おけちを治す。紅麴を酒に浸して煮て飲む。

神麴酒 閃肭せんたう、腰痛を治す。神麴を赤く焼いて酒に淬すなして飲む。

柘根酒 耳聾を治す。柘根じやくこんの條に詳記してある。

磁石酒 腎虛耳聾を治す。磁石、木通、菖蒲等分を袋に盛り、酒に浸して日毎に

飲む。

蠶沙酒 風緩、頑痺、諸節不隨、腹内の宿痛を治す。原蠶沙を黄に炒つて袋に盛

り、酒に浸して飲む。

花蛇酒 諸風の頑痺、癱緩なんくわん、攣急、疼痛、惡瘡、疥癩かいらくを治す。白花蛇肉一條を袋

に盛り、麴と共に缸底こうていに置き、糯飯でその上を蓋ひ、二十一日置いて酒を取つて飲

む。又、群くの藥と酒で煮る方もあつて、方は甚だ多い。

烏蛇酒 主治諸症、釀造法は上に同じ。

蝮蛇酒 諸風痛痺を治し、蟲を殺し、瘴を辟け、癩風、疥癬、惡瘡を治す。蝮蛇せんじや

肉一斤、羌活一兩を袋に盛り、麴と共に紅底に置いて糯飯で蓋ひ、醸して酒に成つたとき飲む。また酒に浸してもよし。詳細は本條に掲げてある。○穎曰く、廣西の蛇酒は、罐上に蛇を數寸置いてあつて、その麴には山中の草藥を取つて入れる。故に毒のないわけに行かぬ。

**蝮蛇酒** 惡瘡、諸癰、惡風、頑痺、癩疾を治す。活きた蝮蛇一條を取り、醇酒一斗と共に封じて馬尿の中に埋め、一个年後に取出す。蛇は已に消けて了ふものだ。毎に數盃を服すれば、身體が習習として癒えるものだ。

**紫酒** 卒風で口が偏して言語不能のもの、及び角弓反張し、煩亂して死せんとするもの、及び鼓脹して消かぬものを治す。雞屎白一升を炒り焦し、酒中に投じて紫色になるを待ち、滓を去つて頻りに飲む。

**豆淋酒** 血を破り、風を去り、男子の中風口喎、陰毒腹痛、及び小便尿血、婦人産後の一切の中風諸病を治す。黑豆を炒り焦し、酒で淋して溫飲する。

**霹靂酒** 疝氣偏墜、婦人の崩中下血、胎產不下を治す。鐵器を赤く焼いて酒に浸して飲む。

龜肉酒 十年の咳嗽<sup>がせう</sup>を治す。釀造法は龜の條に詳記してある。

虎骨酒 臂、脛の疼痛、歷節風、腎虛、膀胱の寒痛を治す。虎脛骨一頭分を黄に

炙いて槌き碎き、麴米と共に通常のやうに酒に醸して飲む。また酒に浸すもよし。

虎の條に詳記してある。

麋骨酒 陰虛、腎弱を治し、久しく服すれば人體を肥白ならしめる。麋骨<sup>びこつ</sup>の煮汁

と麴米とで普通のやうに酒に醸して飲む。

鹿頭酒 虛勞、不足、消渴、夜間鬼物を夢みるを治し、精氣を補益する。鹿頭を

煮爛して泥に搗き、汁共に麴米に和して酒に醸して飲む。少し葱、椒を入れる。

鹿茸酒 陽虛痿弱、小便頻數、勞損、諸虛を治す。鹿茸<sup>ろくじやう</sup>、山藥を酒に浸して服す。

詳細は鹿茸の條下に記載した。

戊戌酒 誂<sup>う</sup>曰く、大いに元陽を補す。穎<sup>う</sup>曰く、その性は大熱である。陰虛で冷な

き病人は飲むべきものでない。黄狗肉一頭分を煮麋<sup>しんぴ</sup>し、汁共に麴米に和して酒に醸

して飲む。

羊羔酒 大いに元氣を補し、脾、胃、腎を健にし、腰腎を益す。宣和化成殿の眞方で



ある。米一石を通常のやうに漿に浸し、嫩く肥えた羊肉七斤、麴十四兩、杏仁一斤と共に煮爛し、汁共に拌ぜて末にし、木香一兩を入れて共に醸す。水を犯してはならぬ。十日にして熟し、極めて甘く滑かなものだ。○ある法では、羊肉五斤を蒸し爛らして酒に一夜浸し、消梨七箇を入れて共に搗いて汁を取り、麴米を和して酒に醸して飲む。

**膾肭臍酒** 陽氣を助け、精髓を益し、癥結冷氣を破り、大いに人體を補益する。

膾肭臍をっごせいを酒に浸して搗り爛らし、麴米と共に普通のやうに酒に醸して飲む。

## 燒酒（綱目）

和名 ぜうちう  
洋名 Spirits (Alcohol)

**釋名** 火酒（綱目） 阿刺吉酒（飲膳正要）

**集解** 時珍曰く、燒酒は古法ではなくて、元の時に始めて起つたものだ。そ

の法は、濃酒を糟に和して甑そうに入れ、蒸して氣を上升させ、器にその滴る露うを承けて取るのであつて、凡そ酸壞した酒はいづれもかくして蒸焼し得るものだ。近代はただ糯米、或は粳米、或は黍、或は稗、或は大麥を蒸熟して麴を和し、甕をうちう中に入れ

て七日間醸し、それを甑で蒸して取る。それは清<sup>す</sup>んで水のやうなもので、味は極めて濃烈だ。蓋し酒露である。

○<sup>せんら</sup> 穎曰く、暹羅酒は、燒酒を更に二回燒して高貴な香料を入れ、その壘は一箇に對して十數斤の檀香<sup>だんかう</sup>を燒いて烟で薰じ、漆のやうにしてからその酒を入れ、蠟で封じて二三年間土中に埋めて燒氣を絶ち去り、それを取り出して用ゐるのである。曾てある者が携へて來て輸入したが、三四盃飲めば酔ふ。價格は普通のものの數倍であつた。積病のあるものは一二盃飲めば癒え、且つ蠱<sup>こ</sup>を殺すもので、予は親しく二人のその例を見たが、長さ二寸ばかりの活きた蟲を下した。それは魚蠱といふものだといふことであつた。

### (二) 氣 味

【辛く甘し、大熱にして大毒あり】時珍曰く、飲み過せば胃を敗り、膽を傷<sup>さ</sup>ひ、心を喪し、壽を損じ、甚しきは腸を黒くし、胃を腐して死亡する。蓋、蒜と共に食へば痔を生ずる。○鹽冷水、綠豆粉がその毒を解す。

### 主 治

【冷積寒氣を消し、濕痰を燥し、鬱結を開き、水泄を止め、霍亂、瘧疾、噎膈<sup>いっかく</sup>、心腹冷痛、陰毒で死せんとするを治し、蟲を殺し、瘡<sup>しりぞ</sup>を辟け、小便を利

(一) 木村(康)曰く、米、麥、玉蜀黍、甘藷、馬鈴薯ナドヲ醱酵セシメテ製ス、又腐敗酒、酒粕ナドヲ蒸溜シテ製ス、故ニ酒精ノ含量ナリ。泡盛ハ琉球ニスル一種ノ燒酒ナリ。

(成分)參考マデニア  
クレバ、

品	種	比重	酒精 <sup>%</sup>	エス キ分 <sup>%</sup>	酸 <sup>%</sup>	糖分 <sup>%</sup>	灰分 <sup>%</sup>
焼酎	(伊丹産)	0.9552	39.50	0.495	0.026	0.417	0.005
"	( " )	0.9161	59.00	0.082	0.045	1	0.001
泡	盛	0.9513	40.60	0.042	0.040	1	0.011
泡	盛	0.9367	49.60	0.042	0.025		0.025

し、大便を堅くする。赤目腫痛に效がある【時珍】

# 發明

時珍曰く、焼酒は純陽の毒物であつて、表面に細花のあるものが真なるものだ。火と性を同うし、火を得れば燃えること焰消と同様なものだ。北方の地では四季を通じてこれを飲むが、南方の地ではただ暑期に飲むだけである。味は辛く甘く、升揚し、發散し、その氣は燥熱であつて、濕に勝ち、寒を祛る。故に能く怫鬱を開いて沈積を消し、膈噎を通じて痰飲を散じ、泄瘡を治して冷痛を止めるのである。辛は先づ肺に入るもので、水に和して飲めば抑へて下行せしめ、水道を通調して小便を長くし白からしめる。熱は能く金を燥し、血を耗するもので、大腸がその刑を受けるから大便が燥結し、薑、蒜と共に飲めば痔を生ずるものである。かの暑期に飲めば汗が出て膈が快く、身體が涼し、赤目を洗へば涙が出て腫が消する事實は、乃ち從治の方である。程度を越えて飲み過せば頃刻にして死亡する。近頃商店で取扱ふものは、またそれに砒石、草烏、辣灰、香藥などを加へてその力を助け導くやうにしてあるが、それは盜に假すに方を以てするといふものだ。攝生を重ずるものは深く注意を要する。按ずるに、劉克用の病機賦に「ある者が赤目を病ん

だとき、燒酒に鹽を入れて飲むと病が止まり、腫が消いた』とある。蓋し酒はその性が走る。それを導くに鹽を以てすれば、經路に通行し、鬱結を開いて邪熱を散ぜしめるのであつて、これはやはり反治の劫劑である。

## 附方

新七。

【冷氣心痛】燒酒に飛鹽を入れて飲めば止まる。【陰毒腹痛】燒酒を溫めて飲む。汗が出て止まる。【嘔逆の止まぬもの】眞火酒一盃、新汲水一盃を和して服するが甚だ妙である。(顏淵) 【寒濕泄瀉】小便の清めるには、頭燒酒を飲めば止まる。【耳中に核あるもの】棗核ほどの大いさのものがあつて、痛んで動けぬものには、火酒を滴入して半時ほど仰いでゐて箝出する。(李樸奇方) 【風蟲牙痛】燒酒に花椒を浸して頻りに漱ぐ。【寒痰咳嗽】燒酒四兩に猪脂、蜜、香油、茶末各四兩を共に浸し、一處に煮て置いて毎日それを挑げ取つて食ひ、茶で飲下して效を取る。

## 葡萄酒 (綱目)

和名 ぶだうしゆ  
洋名 Wine.

## 集解

説曰く、葡萄酒は酒に醸せる。その藤の汁も佳し。

(一) 高昌ハ漢ノ車師前部高昌壁ノ地、即チ今ノ新疆省哈密、吐魯番地方ナリ。石部南石類光明鹽ノ註參照。  
 (二) 八風ハ八方ノ風、淮南子、説文、呂氏春秋等ニ各ソノ名ヲ擧ゲタリ。  
 (三) 冀寧路ハ元ニ置ク、今ノ山西省陽曲縣等ノ地ナリ。  
 (四) 太行山ハ石部南石類石疏黃ノ註ヲ見ヨ。  
 (五) 哈喇火ハ元ニ置キタル州名、今ノ新疆省吐魯番城東ニ在リ。今ノ哈喇和卓ノ地ナリ。

時珍曰く、葡萄酒には二様あつて、醸して造つたものは味が佳く、燒酒のやうな方法で造つたものは大毒がある。醸造するには、葡萄の汁を取り、通常糯米飯を醸す方法のやうに麴と共に醸するのであるが、汁の無い場合には乾葡萄末を用ゐてもよし。魏の文帝の所謂『葡萄で醸した酒は麴米のものよりも甘く、酔ふても醒め易い』といふそのものだ。燒して取るには、葡萄數十斤を取つて大麴と共に酢に醸し、それを取つて甑に入れて蒸し、その滴る露を器に承けて取るのだが、それは紅色にして美しいものだ。古代には西域で造つてゐたものだが、唐の時に高昌を破つた際に始めてその法を得たのであつた。按ずるに、梁の四公記に『高昌から蒲桃乾凍酒を獻じた。燕公は「蒲桃は、皮の薄いものは味が美しく、皮の厚いものは味が苦い。八風で谷が凍つて出來る酒で、一年中腐敗しない」といつた』とある。葉子寄の草木子には『元朝には冀寧路等の地方で蒲桃酒を造つた。八月になつて太行山でその酒の眞偽を試験するのだが、眞のものは水に下すと流れ、偽のものは水に遇ふと氷凍する。久しく貯藏したものには中に一箇の塊が出來てゐて、極寒の際、その他のものがみな氷つてもこの物だけが氷らない。これは酒の精液であつて、



（六）平陽ハ鱗部龍類  
石龍子ノ註ヲ見ヨ。  
太原ハ石部鹽甘石ノ  
註ヲ見ヨ。  
（七）木村（康）曰ク、  
參考マデニ葡萄酒成  
分ノ數例ヲ掲グ。

品 種	比重	アルコール 重量	エキス	遊離酸 （基石酸トシテ）	糖分	グリセ リン	礦物質
佛國產赤酒	0.9982	7.80	2.56	0.57	0.30	0.73	0.245
同 白 酒	0.9963	8.30	3.03	0.66	—	0.97	0.250
モーゼルザール	0.9964	7.99	2.24	0.79	0.03	0.72	0.178
ラインガウ	1.0005	8.00	2.60	0.81	—	0.85	0.023

人がこれを飲めば腋に透つて死亡する。その酒の二三年経つた古いものにはやはり大毒がある』とある。飲膳正要には『酒に數等あつて、（七）哈喇火に産するものは最も烈しく、西番のものはこれに次ぎ、（六）平陽、太原のものはまたそれに次ぐ』とある。或は、葡萄を久しく貯へて置くとやはり自然に酒が出来て、芳香と甘味の酷烈である。それが眞の葡萄酒だともいふ。

### 釀酒

（七）氣味

【甘く辛し、熱にして微毒あり】

時珍曰く、熱疾、齒疾、瘡

疹あるものは飲んでならぬ。

### 主治

【腰腎を暖め、顔色の衰へるを駐め、寒に耐へる】（時珍）

### 燒酒

（七）氣味

【辛く甘し、大熱にして大毒あり】 時珍曰く、大熱、大毒なる

ことは燒酒よりも甚しい。北方の人は習慣性で害毒と感じなくなつてゐるが、南方の人は決して輕輕しくこれを生で飲んでではない。

### 主治

【氣を益し、中を調へ、饑に耐へ、志を強くする】（正要）【痰を消し、癰

を破る】（注願）



# 糟 (綱目)

和名 いののかす  
洋名 Sake Misch.

## 釋名 粕 (綱目)

### 集解

時珍曰く、糯、稷、黍、麥いづれも蒸して酒、醋を醸し、熬煎して餚、飴を造れば化して糟粕となる。酒糟は臘月、及び清明、重陽に造つたものを用うべきものであつて、漚乾して少量の鹽を入れて貯藏する。物をその中に貯藏すれば腐敗しない。物を揉めば能く軟にする。搾つて乾しては味がなくなるものだ。醋糟は三伏に造つたものを用ゐるが良し。

### 酒糟

#### 氣味

【甘く辛し、毒なし】

#### 主治

【中を溫め、食物を消化し、冷

氣を除き、腥を殺し、草葉の毒を去り、皮膚を潤ほし、臟腑を調へる】蘇恭【撲損

瘀血を醫する。水に浸して凍瘡を洗ふ。搗いて蛇咬、蜂叮の毒に傳ける】(日華)

### 發明

時珍曰く、酒糟には麴、蘖の性があつて、能く血を活し、經を行らし、

痛を止めるものだから傷損を治するに功がある。按ずるに、許叔微の本事方に『跪折して筋骨を傷め、痛み忍び難きを治す。生地黃一斤、瓜、薑を貯藏した糟一斤、

生薑四兩を用ゐ、全部を炒り熱して布に裹み、傷處を罨あんして冷えれば易へる。曾てある者が傷折したとき、生龜を一箇捕へてそれを殺して用ゐようとした。ところがその夜の夢に龜が右の方を傳へたので、それを用ゐて見ると癒えたのであつた』とある。又、類編には、ただ瓜、薑を貯藏した糟一物に赤小豆末を和わ勻まんして斷傷した處を罨し、杉片、或は白桐片で夾はさむ。三日に過ぎずして痊いえるものだといふ記載がある。

## 【附方】

新四。

【手、足の皴裂くんれつ】紅糟、臘猪脂、薑汁、鹽等分を研り爛らし、炒

り熱して擦る。裂けた内部が甚だ痛み、少頃して合する。數回擦れば安らかになる。

(袖珍方) 【鶴膝風病】酒醅しゅはい糟四兩、肥皂一個を子を去り、芒消一兩、五味子一兩、砂

糖一兩、薑汁半甌はんおうを研り勻ぜ、日毎に塗る。燒酒を加入するが尤も妙である。【暴

に發した紅腫】痛み忍び難きには、臘糟で罨する。(談禁翁試驗方) 【杖瘡の青腫】濕綿

紙を傷處に鋪しき、燒して残つた酒糟を搗き爛してその紙上に厚く鋪く。良久して痛

處に蟻が行くやうに感じ、熱氣が上升して散ずる。(簡便方)

## 大麥醋糟

## 氣味

【酸し、微寒にして毒なし】

## 主治

【氣滯、風壅ふうようで手背、

脚膝の痛むには、炒り熱して布に裏んで熨す。二三回換へれば癒えるものだ。(孟詵)

### 乾錫糟

#### 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

#### 主治

【反胃吐食。脾、胃を暖

め、飲食を消化し、氣を益し、中を緩にする】(時珍)

#### 發明

時珍曰く、飴は麴で造るもので、暖にして消導する。故にその糟は能

く滯を化し、中を緩にし、脾を養ひ、吐を止めるのである。按ずるに、繼洪の澹寮方に「甘露湯は反胃で吐食して止まぬを治す。これを服すれば胸膈を利し、脾、胃を養ひ、飲食を進めるものだ。乾錫糟六兩、生薑四兩の二味を共に搗き、餅にして

或は焙じ、或は晒し、炙甘草末二兩、鹽少量を入れて湯に點て服す。常熟のある富豪

が反胃を病んでゐたが、京口の甘露寺へ往つて施餓鬼を營んだとき、岸下に舟を停

めて一泊すると、夢にある僧が一杯の湯を持つて來て飲ませてくれた。それを飲ん

だ後で胸が直ちに快くなつたと見て、翌早朝寺へ往つて見ると、湯を酌んで出す僧

がやはり昨夜の夢に見たその僧であつた。この寺では平常この湯を來客に進める慣

例だつたから甘露湯と名を易へて呼ぶやうになつた。予が臨江に住んでゐたとき、

これで一人の小役人を治療してやつたが、間もなく癒えた。必ず忽せにしてはなら

ぬ』とある。

〔附方〕

新<sup>二</sup>。【脾、胃の虚弱】平胃散等分を末にして一斤に、乾糖糟を炒つて二斤半、生薑一斤半、紅棗三百箇を煮て取つた肉を焙じ乾して入れ、通じて末にし、逐日湯に點て服す。(摘玄)

米 粃 (食物)

和名 <sup>わか</sup>  
洋名 Rice-bran.

釋名

米皮糠 時珍曰く、粃とはやはり糝<sup>ひはく</sup>薄の意味である。

集解

穎曰く、米粃、即ち精米上の細糠である。昔、陳平は糠<sup>かう</sup>糞<sup>けつ</sup>を食つて肥えたといふ。

(一) 穀トハ米糠中ノ  
破レザルモノヲイ  
フ。  
(二) 谷ハ穀ニ通ズ。

時珍曰く、糠は諸粟の<sup>三</sup>谷の殻である。その殻にして米の肌にも最も近い部分の細

かなものを米粃といふ。味は極めて甜<sup>あま</sup>い。凶作の歳には、一般に多く豆腐<sup>とうふ</sup>、或は草木の花實の食へるものと和劑して蒸煮し、それで饑餓を救ふ。

氣味

【甘し、平にして毒なし】 主 治 【腸を通じ、胃を開き、氣を下し、

積塊を磨す。糲<sup>きう</sup>にして食へば饑えず、克<sup>よく</sup>く膚、體を滑にする。口、腹を填<sup>み</sup>て養ふに

十分だ】(汪頤)

### 春杵頭細糠 (別錄中品)

和名 きねごさのこめか  
洋名 Rice-bran, attached to the end of pestle.

校正 禹錫曰く、草部から此に移し入れた。

#### 集解

時珍曰く、凡て穀にはいづれも糠があるが、此には粳稻、粟種の糠を用うべきものとしてある。北方では多く杵を用ゐ、南方では多く碓うすを用ゐるが、薬に用ゐてはいづれも同様だ。丹家では『糠火は、物を鍊るに用ゐて普通の燃料に倍する力がある』といふ。

#### 氣味

【辛く甘し、熱なり】震亨曰く、穀殼は金に屬し、糠の性は熱である。

#### 主治

【卒噎そついつには、刮り取つて含む】(別錄) ○また湯に煎じて呷すふもよし。

【焼き研つて水で方寸匕を服すれば、婦人をして分娩を容易ならしめる】(時珍) 記載は子母秘録にある。

#### 發明

弘景曰く、噎を治するにこれを用ゐるは、やはり春そう、搗たうの意味を取つたものだ。天下の事理は多くはかやうに相影響する。

〔附 方〕

舊一、新一。【膈氣噎塞】飲食の下らぬには、確<sup>たし</sup>脊<sup>しやう</sup>上<sup>じやう</sup>の細糠を蜜で彈子大の丸にし、<sup>(一)</sup>時時に<sup>ニ</sup>含んで津液を嚥む。<sup>(聖惠)</sup>【咽喉の妨礙】物があるやうで吞吐しても利せぬには、杵頭糠、人參各一錢、石蓮肉を炒つて一錢を水で煎じ、一日三回服す。<sup>(聖濟總錄)</sup>

(一) 大觀ニハ非ニ作ル。  
(二) 大觀ニハ含下ニ  
二九ノ二字アリ。



本草綱目菜部

第二十六卷



## 本草綱目菜部目錄第二十六卷

(一) 克ハ充ニ通ズ、  
周禮ニ地官人ヲ充ス  
トアリ、註ニ充ハ猶  
肥ノ如シトアリ。  
(二) 三農ハ山農、澤  
農、平地農ヲ云フ。  
(三) 九穀ハ黍、稷、  
秬、稻、麻、大小豆、  
大小麥ヲ云フ。  
(四) 五宮ハ五臟ヲ指  
ス。

(五) 五氣ハ香、臭、  
腥、醎、臙サリ。

李時珍曰く、凡そ草木にして茹ひ得るものをば菜といふ。韭、薤、葵、葱、藿は五菜と稱するもので、素問に『五穀は養を爲し、五菜は「克を爲す」とある。穀氣を輔佐して壅滯を疏通する作用をなすものだといふのである。古は「三農」九穀を生じ、場圃に草木を栽ゑて以て饑饉に備へたといふから、菜は固より五種のみと限られたものではない。我が明朝の初、周憲王は草木にして一般人の食料に供し得るもの四百餘種を圖載して救荒本草を著述されたが、まことに有意義な事業であつた。そもそも陰の生ずる根本は五味に在り、(四)五宮を傷めるものも五味に在るのであつて、五味を最も正確に調和すれば、臟、腑はそれに因つて疏通し、氣、血はそれに因つて周流し、骨は正しく、筋は柔に、腠理はそれで密になり、それに因つて生命を長久ならしめ得るのである。それゆゑに内則には據るべき基準を示し、食醫には用うべき方を載せてあるのであつて、菜なるものの人間の生命を補する効果は決して輕視すべきものではないのであるが、ただ(五)五氣の良、毒それぞれ不同があり、

五味の入る所に偏勝へんしやうのあることには、一般人が日に用ゐてゐながらその智識がない。そこで草にして茹ひ得るもの凡て一百五種を取り集めて菜部とし、葷辛類くんしんるゐ、柔滑類くわくさうるゐ、蕰菜類くゐさいるゐ、水菜類すいさいるゐ、芝栴類しじらんるゐの五類に分類して記載した。舊本の菜部は三品共六十五種であるが、本書では五種をば併入し、十三種をば草部に移し入れ、六種をば果部に入れ、草部から移し入れたものは併せて二十三種に及び、穀部から一種を移し入れ、果部から一種を移し入れ、外類、有名未用から三種を移し入れた。

神農本草經十三種 梁の陶弘景註。

唐本草七種 唐の蘇恭。

本草拾遺十三種 唐の陳藏器。

食性本草一種 南唐の陳士良。

日華本草二種 宋人大明。

嘉祐本草十種 宋の掌禹錫。

證類本草一種 宋の唐慎微。

食物本草二種 明の汪頤。

名醫別錄十七種 梁の陶弘景註。

千金食治二種 唐の孫思邈。

食療本草三種 唐の孟詵、張鼎。

蜀本草二種 蜀の韓保昇。

開寶本草六種 宋の馬志。

圖經本草四種 宋の蘇頌。

日用本草三種 元の吳瑞。

食鑑本草一種 明の寧原。

救荒本草一種 明の周王。

本草綱目十七種 明の李時珍。

附註

魏李富之藥錄

吳普本草

宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

蕭炳四聲

唐李珣海藥

楊損之刪繁

宋寇宗奭衍義

令張元素珍珠囊

元李杲法象

王好古湯液

元朱震亨補遺

明汪機會編

明陳嘉謨蒙筌

菜の1 葷辛類三十二種

韭 別錄

山韭 千金 孝文韭を附す。

葱 本經

茗葱 千金

胡葱 開寶

薤 本經 即ち薤子。薤薺を附す。

蒜 別錄

山蒜 拾遺

葫 別錄 即ち大蒜。

五辛菜 拾遺

藁薹 唐本 即ち油菜。

菘 別錄 即ち白菜。

芥 別錄

白芥 開寶

蕪菁 別錄 即ち蔓菁。

萊菔 唐本 即ち蘿蔔。

生薑 別錄

乾薑 本經 天竺乾薑を附す。

同蒿 嘉祐

邪蒿 嘉祐

胡荽 嘉祐

胡蘿蔔 綱目

苦蕒 本經 即ち芥菜。

葶 唐本 即ち旱芹。

紫葶 圖經

馬薺 唐本

藿香 唐本 卽ち茴香。蒔蘿 開寶 蜀胡爛、數低、池得勒、馬思答吉を附す。

羅勒 嘉祐 卽ち茴香。白花菜 食物 薺菜 綱目 草豉 拾遺

右附方 舊一百五十、新二百九十二。



# 菜の一 葎辛類三十二種

## (一) 韭 (別錄中品)

和名にら  
學名 *Allium odoratum*, L.  
科名 ゆり科(百合科)

(一) 牧野云フ、にらハ今一般ニ栽培シテキルガ又諸州ニ野生スル處ガアル、にらハ二字カラ成ツテキルノデ此レニ又ふたもじ(ニタ文字)ノ名ガアル。

(二) 大觀ニ韭下ニ藥字アリ。

### 釋名

草鍾乳(拾遺)

起陽草(侯氏藥譜)

頌曰く、按ずるに、許慎の説文に、

韭の字を葉が地上に出た形を形象してあつて『一種にして久生する。故に韭といふ』とある。一歳に三四回その根を割き取つても傷まない。冬になつて瘞やぶひ培つちかへば春に先つて復た生える。如何にも久生そのものだ。



〔韭〕

藏器曰く、俗に(一)韭といふがこのものだ。草鍾乳さうしゅうにうとはこの物の溫補する點を表した名稱だ。

時珍曰く、韭は莖を韭白と名け、根を韭

黄と名け、花を韭菁きうせいと名ける。禮記に韭を豐本といつてあるは、美なる點が根にあるといふ意味で、薤かいの美は白にあり、韭の美は黄に在る。黄とはまた地上に出ない部分のことだ。

## 集解

時珍曰く、韭は叢生して本が豊ゆたかに、葉が長くして青翠なもので、根を分けてもよく、子で種こふてもよし。その性は内に生ずるもので外には長じ得ないものだ。葉の高さ三寸になつたときに剪る。剪るには日中を忌む。一歳に五回以上は剪れない。子を收穫するにはただ一回剪るがよい。八月に花を開いて叢になつたとき取收め、醃つけて貯へて料理に使ひ、長生韭と呼ぶ。それは剪つても復た生えて久しい間無くならぬといふ意味だ。九月に子を取收める。その子は黒色で扁へんいものだ。風に當てあて陰乾すべきもので、沍おふう鬱してはならない。北方の地では、冬になつて根を土窖中に移し、馬糞で培つて暖にする。すると高さ一尺ばかりに長くなり、風や日光に當らぬからその葉が黄色で嫩やわらかになる。これを韭黄と呼ぶ。いづれも貴族、富豪の珍味とするものだ。韭なる菜は生でもよく、熟してもよく、菹すにしてもよく、久しく経てもよく、菜類中での最も益あるものだ。羅願の爾雅翼には『物久

(三) 沍鬱ハ風ノ通ラ  
ヌ處デシメルコト。

(四) 大觀ニ利字則ニ作ル、即政道得レバ則トヨムベシ。

(五) 木村康(日)ク、食用植物誌ニヨレバ、内地及臺灣產ノシ。にらノ組成左ノ如シ。

產地	水分	蛋白質	脂肪	含水素 炭粉 7.00	糖分	纖維	灰分
内地產	87.70	2.70	0.20	7.00	0.40	1.10	0.90
臺灣產	92.926	1.781	0.462	3.844	—	—	0.787

しければ必ず變ずる。故に老韭は莧せんとなるのだ』とある。

頤曰く、鄭玄は『政道、利を得れば陰物變じて陽となる。それは葱が變じて韭となるが驗だ』といった。葱は冷だが韭は溫なるものだ。

### (五) 氣味

【辛く微し酸し、溫、瀉しやくにして毒なし】時珍曰く、生では辛くして瀉り、熟すれば甘く酸し。大明曰く、熱である。宗奭曰く、春食つては香しく、夏食つては臭い。多く食へば能く神を昏くし、目を暗くする。酒の後は就中忌む。詵曰く、熱病後十日以内に食へば發困する。五月に多く食へば氣力を耗乏する。冬期に多く食へば宿飲を動じて水を吐く。蜜、及び牛肉と食合せてはならぬ。

### 主治

【心に歸し、五臟を安じ、胃中の熱を除く。病人に利あり、久しく食ふがよし】(別錄) 時珍曰く、按ずるに、千金方には、久しく食つてはならぬ。病人を利せぬものだとしてある。【葉で鯽魚鮓とくしやうきんていを煮て食へば卒下痢を斷つ。根は髮を生ずる膏に入れて用ゐる】(弘景) 【根、葉を煮て食へば、中を溫め、氣を下し、虛を補し、陽を益し、臟腑を調和して食をよくし、血膿を洩して腹中の冷痛するを止める。生の搗汁たうじふを服すれば、胸痺、骨痛で觸れるさへならぬものに主效があり、又、藥毒

〔多〕數字、大觀ニ欲ニ作ル。

〔七〕大觀ニ惡水ノ二字、胸中ニ作ル。

を解し、狂犬の咬毒の〔多〕數、發するものを療ず。また諸蛇虺、蠃蝱、惡蟲の毒にも塗る〔藏器〕「煮て食へば、肺氣を充て、心腹の痼冷、痰癖を除く。搗汁を服すれば、肥白なる人の中風失音を治す〔日華〕」「煮て食へば、腎に歸して陽を壯にし、洩精を止め、腰膝を暖める〔葯原〕」「燂熟し、鹽、醋で空心に十頓喫へば胸膈噎氣を治す。搗汁を服すれば、胸痺で錐で刺すやうに痛むを治して胸中の惡血を吐出し、甚だ效驗がある。又、初生小兒に灌いで〔七〕惡水、惡血を吐去すれば永く諸病がなくなる」〔誑〕「吐血、唾血、衄血、尿血、婦人の經脈逆行、打撲傷損、及び膈噎病に主效がある。搗汁を澄清して童尿を和して飲めば、能く胃脘の瘀血を消散して甚だ效がある」〔震亨〕「生の汁を飲めば、上氣喘息で絶せんとするに主效があり、肉肺の毒を解す。煮汁を飲めば、消渴、盜汗を止める。産婦の血運を熏じ、腸痔脱肛を洗ふ〔時珍〕」

### 發明

弘景曰く、この菜は殊だ辛く臭いもので、煮て食つてもその便がやはり熏灼して出る。葱、薤のやうに熟すれば氣が無くなるものでない。その點からして最も養生には忌むところのものだ。

頌曰く、菜類中でこの物が最も温なるもので、人體を益する。常にこれを食べふが

よい。昔は一般に正月の節に五辛を食つて瘴氣を辟けたものだ。五辛とは韭、薤、葱、蒜、薑である。

宗奭曰く、韭黃はまだ糞芥中から上に現れないものであつて、最も人體に益せない。これを食へば滯氣する。蓋し抑鬱してまだ伸びない氣が含まれてゐるからだ。孔子は『時ならざれば食はず』といつたが、正にこの類をいつたものだ。花を食つてもやはり風を動ずる。

思邈曰く、韭は味が酸い、肝臓の病にこれを食ふがよし。大いに心臓を益する。時珍曰く、韭は、葉は熱、根は温であつて、功用は同じものだ。生では辛くして血を散じ、熟すれば甘くして中を補し、足の厥陰の經に入るもので、肝の菜である。

素問には『心病には韭葉を食ふべし』といひ、食鑑本草には『腎に歸す』とあつて、記載の文に相異はあるが、しかし道理からいへば一貫してゐる。蓋し心は肝に對して子の關係にあり、腎は肝に對して母の關係にあるので、母からしてよく子を實せしめる「虚すればその母を補す」の道理である。道家で五葦の一としてゐるのは、この物は能く人の神を昏ましめて虚陽を動ずるといふ考からである。ある中年の一貧

者が噎膈を病み、食物が入れば直ちに吐いて胸中が刺痛するのであつたが、或る者が、韭汁に鹽梅鹵汁少量を入れて少しづつ呷はせ、入るだけ漸次に加へて呷はせると、忽ち稠い涎を數升吐いて癒えた。これはやはり仲景が胸痺を治するに薤白を用ゐたと同じで、いづれもその辛、溫にして能く胃脘の痰飲、惡血を去る意味を應用したものだ。

震亨曰く、心痛には、熱物を食つたため、及び怒鬱のためで死に陥り、血が胃口に留つて痛を作すものがある。これには韭汁、桔梗を藥中加入して氣血を開提するが宜し。腎氣上攻のために心痛を起すものがある。これには韭汁で五苓散を和して丸にし、空心に茴香湯で服するが宜し。蓋し韭は性が急に能く胃口の血滯を散ずるからだ。又、反胃には、韭汁二盃に薑汁、牛乳各一盃を入れて少しづつ溫服するが宜し。蓋し汁韭は血を消し、薑汁は氣を下し、痰を消し、胃を和し、牛乳は能く熱を解し、燥を潤し、虚を補するものだからである。一患者は、臘月に刮剝酒を三盃飲んでから食事を攝つてゐたが、必ず屈曲して膈に下り、硬滿して微痛し、右脈が甚だ濇し、關脈が沈するのであつた。これは汚血が胃脘の口に在るのであつ



(ハ)大觀ニ微上ニ痛  
字アリ。

て、氣が鬱するために、痰となつて食道を隘塞あいそくするのである。そこで韭汁半瓊はんせんを冷で少しづつ呷はせると、半斤まで服して癒えた。

附方

舊十一、新二十一。【胸痺急痛】 誅曰く、胸痺で錐で刺すやうに痛み俛仰ふぎやう

し得ず、白汗を出し、或は背上に(ハ)徹するは、治療せねば死に至ることがある。生韭、或は根五斤を取つて洗ひ、その搗汁を服するがよし。(食療本草) 【陰陽易病】 男子が陰腫し、小腹絞痛し、頭重く、眼華を見るには、猥鼠尿湯かそしたうでこれを煮たものが宜し。猥鼠尿十四箇、韭根一大把、水二瓊を七分に煮て滓を去り、再び煎じて二沸して溫服し、汗を取れば癒える。なほ發汗せぬときは再服する。(南陽活人書) 【傷寒の勞復】 方は上に同じ。【突然の中惡】 韭の搗汁を鼻中に灌げば甦よみがへる。(食醫心鏡) 【寢てそのまゝ寤めぬもの】 火で照してはならぬ。ただ拇指の甲の際を痛く嚙み、その顔に唾すれば復活する。その時、韭の搗汁を鼻中に吹き入れる。冬期には韭根を用ゐる。(肘後方) 【風忤ふうこ邪惡】 韭根一把、烏梅十四箇、吳茱萸を炒つて半升、水一斗を煮て、病人の櫛をその中に入れて煮て三沸する。櫛が浮くときは生きるが沈むときは死ぬ。それを三升までに煮て三回に分服する。(金匱要略) 【喘息ぜんそくで絶せんとするもの】 韭汁一升を

〔九〕大觀ニ肘後方ノ  
三字アリ。

飲めば效がある。〔夜中に盗汗するもの〕韭根四十九本、水二升を一升到煮て頓服する。〔千金方〕【消渴引飲】韭苗を日に三五兩を用ゐ、或は炒り、或は羹にし、鹽を入れてはならぬ。醬を入れるは差閫なし。それを十斤まで喫つて住める。極めて效がある。清明節後には喫つてはならぬ。ある者はこの病で極度に引飲したが、この方を得て癒えた。〔秦憲副方〕【喉腫で食事困難なるもの】韭一把を搗いて熬つて傅け、冷えれば易へる。〔千金方〕【水穀痢疾】韭葉で羹、粥を作り、燂炒して任意に食ふが良し。〔食醫心鏡〕【脱肛の收らぬもの】生韭一斤を切り、酥を拌せて炒熟し、綿で二包に裹んで更互に熨す。入るを度とする。〔聖惠〕【痔瘡の痛み】盆に沸湯を盛つて器で蓋ひ、その蓋に一箇の孔を穿ち、洗淨した韭菜一把をその湯中に泡け、熱に乗じてその孔に痔を當てて先づ熏じ、後に洗ふ。數回試みれば自然に痛みがなくなる。〔袖珍方〕【小兒の胎毒】初生の時に韭汁少量を灌ぐ。惡水、惡血を吐出して永く諸疾がなくなる。〔四聲本草〕【小兒の腹脹】韭根の搗汁に猪心。肋と和して煎じ、一合づつを一日隔てて一回服して癒效を取る。〔秘錄〕【小兒の患黃】韭根の搗汁を日毎に鼻中に滴し、黃水を取つて效を取る。〔同上〕【痘瘡の發せぬもの】韭根の煎湯を服す。〔海上方〕【產

〔一〇〕肋、大觀ニ脂ニ  
作ル。

(二) 數字、大觀ニ三  
ニ作ル。

後の嘔水」産後に憤怒、哀傷のために肝を傷め、青緑の水を嘔くには、韭葉一斤から取つた汁に薑汁少量を入れ、和して飲めば癒える。(摘玄方) 【産後の血運】韭葉を切つて瓶中に置き、熱醋を沃いでその氣を鼻中に入れば正氣になる。(丹溪心法) 【赤、白帶下】韭根の搗汁に童尿を和して一夜露し、空心に溫服して效を取る。(海上仙方) 【鼻衄の止まぬもの】韭根、葱根を共に搗き、棗大にして鼻中に塞ぎ入れ、頻りに易へる。兩三回で止まる。(千金方) 【五種の瘡癰】韭根を炒つて性を存し、末に搗いて猪脂と和して塗る。(二) 數回で癒える。(經驗方) 【金瘡出血】韭汁で風化石灰を和して日光で乾し、毎にそれを末にして傳ければ效がある。(續湖集簡方) 【刺傷の中水】腫痛するには、韭を煮て熱して榻する。(千金) 【漆瘡の痒さもの】韭葉を杵いて傅ける。(斗門方) 【狂犬の咬傷】七日に一回發するもので、三七日間發せねば毒が脱したのである。急に風のない場所で冷水で洗淨し、直ちに韭汁一盃を服し、七日隔てて又一盃服し、四十九日間に都合七盃服す。百日間は酸、鹹の物を食ふことを忌み、一年間は魚、腥き物を食ふことを忌み、終身狗肉を食ふことを忌めば安全に健康を保てるが、犯せば十中の九は死亡する。徐本齋は『この法は肘後方の記載から出た

ものだ。ある時狂犬が一日に三人を咬んだことがあるが、その内のただ一人この方を用ゐて生命を取り止めた。その効果を親しく實見した』といつてある。(簡便)【あらゆる蟲の耳に入りたるとき】韭汁を灌げば出る。(千金方)【聾耳の汁の出るもの】

韭汁を一日三回滴す。(聖惠方)【牙齒の蟲蠹】韭菜を根共に洗つて搗き、人家の地板

上の泥と共に和し、痛む處の腮さいじやうに傳けて紙で蓋ふて押へ、一時して取下す。泥上に細蟲が著いて出て根を除くものだ。○又ある方では、韭根十箇、川椒せんせう二十粒、香

油少量を水桶上の泥と共に搗き、病牙の頰上に傳ける。良久して蟲が出て數回で癒える。【肉肺の毒を解す】凡そ肉は、密器に入れて蓋ふたまま一夜過したものを

鬱肉といひ、屋漏で沾ひの著いたものを漏肺といひ、いづれも毒がある。韭の搗汁を飲む。(張文仲備急方)【食物中毒】生韭汁數升を服するが良し。(千金)

韭子

修治

(二二)大明曰く、薬に入れるには、揀り淨めて蒸熟し、暴乾して黒皮を簸ふるひ去り、黄に炒つて用ゐる。

氣味

【辛く甘し、溫にして毒なし】時珍曰く、陽である。石鍾乳、乳香を伏す。

(二二)大明、當ニ頌ニ作ルベシ。

主治

【夢中の洩精、溺（ねう）血（けつ）】（別錄）【腰膝を暖め、鬼交を治するに甚だ效がある】

ある】（日華）【肝、及び命門を補し、小便頻數、遺尿、婦人の白淫、白帶（びやくたい）を治す】（時珍）

發明

頤曰く、韭子は、龍骨、桑螵蛸（さうへうどう）と配合すれば漏精に主效があり、中を

補す。葛洪、孫思邈の諸方に多く用ゐてある。

弘景曰く、韭子は棘刺諸丸（きょくし）に入れ、漏精に主效がある。

時珍曰く、棘刺丸の方は外臺祕要に記載がある。諸勞洩、小便數を治するもので、

多種の藥を用ゐてあるが、此には載録せぬ。按ずるに、梅師方には『遺精を治する

に、韭子五合、白龍骨一兩を用ゐ、末にして空心に酒で方寸匕を服す』とあり、千金

方には『夢遺、小便數を治するに、韭子二兩、桑螵蛸一兩を用ゐ、微（すこ）し炒つて研末し、

毎早朝酒で二錢を服す』とあり、三因方には、下元の虛冷、小便禁ぜず、或は白濁と

なるを治するに家韭子丸といふがある。蓋し韭なるものは肝の菜であつて、足の厥陰

の經に入る。腎は閉藏（そく）を主り、肝は疏洩（そせつ）を主るものであつて、素問に『足の厥陰

の病は、遺尿し、思想（きんまり）して窮なく、房に入つて甚だしく發し、筋痿となり、及び

白淫となり、男子は尿に隨つて下り、婦人は綿綿として下る』とある。韭子が遺精、



漏洩、小便頻數、婦人の帶下<sup>たじ</sup>を治するは、能く厥陰に入つて下焦、肝、及び命門の不足を補するのである。命門は精を藏するの府だから同じく治するわけである。

## 附方

舊三、新四。

【夢遺溺白】藏器曰く、毎日空心に韭子を生で<sup>二</sup>一二十粒

吞み、鹽湯で飲み下す。○聖恵では、虚勞、傷腎で夢中に洩精<sup>せつせい</sup>するを治するに、韭

子二兩を微し炒つて末にし、食前に二錢匕を温酒で服す。【虚勞溺精】新韭子二升

——十月霜後に採る——を好酒八合に一夜漬け、好く晴れた日に童子に南に向つて

一萬杵搗かせ、早朝に温酒で方寸匕を服し、日中に再服する。<sup>（外臺聖要）</sup>【夢洩、遺尿】

韭子一升、稻米二斗、水一斗七升で粥を煮て汁六升を取り、三回に分服する。<sup>（千金方）</sup>

【玉莖強中】玉莖が強硬して痿せず、精流れて住まず、時時に針で刺すやうに覺え、

捏<sup>ね</sup>すれば痛む病を強中と名ける。これは腎滯漏の疾である。韭子、破故紙<sup>はこし</sup>各一兩を

末にし、一日三回、三錢づつを水一盞で煎じて服すれば住む。<sup>（經驗方）</sup>【腰脚の無力】

韭子一升を揀り淨め、二回炊蒸して久しく暴乾し、黑皮を鑿<sup>く</sup>ひ去り、黄に炒つて粉

に擣き、安息香二大兩を水で煮て一二百沸し、慢火で炒つて赤色にし、和し擣いて

梧子大の丸にし——乾くときは少量の蜜を入れる——毎日空腹に酒で<sup>二</sup>三十丸を

（二四）大觀 二 一二 二三  
二作ル。

（二五）大觀 二 二 二 作  
ル。



服し、飯三五匙食つて壓する。大いに佳し（崔元亮海上方）【婦人の帶下】并に男子の腎の虛冷、夢遺。韭子七升を醋で煮て千沸し、焙じて研末し、煉蜜で梧子大の丸にし、三十丸づつを空心に溫酒で服す。（千金方）【蟲牙を烟熏する】瓦片を紅く煨いた上へ韭子數粒を置き、それに清油を數點して烟の起つを待ち、筒でその烟を痛む處へ吸ひ込み、良久して溫水で嗽吐（そうつ）すれば、小蟲が出て奏效する。なほ出盡きぬときは再び熏する。（救急易方）

## 山 韭（千金）

和名 無し  
學名 *Allium sp.*  
科名 ゆり科（百合科）

### 釋名

**菹** 音は育（イク）である。**鐵** 音は鐵（セン）である。いづれも詳でない。

### 集解

頌曰く、菹（さんきう）は山韭である。山中に往往あるものだが、一般人は多く識らない。形も性もやはり家に作る韭と相類するものだが、ただ根が白く、葉が燈心の苗のやうなものである。韓詩に『六月鬱、及び奠（い）を食ふ』といふはこれを指したのだ。

（一）牧野云フ、本草綱目葇蒙ニ本品ヲ山地ニ野生スルニラ（のまにら）トスルハ常ラヌ、此レハ一種特立ノ品ヲ我日本ニハ産セヌモノデア  
ル、ソレ故之レヲ我邦ノやまらつきようトスルモ誤リデア  
ル、又同書ニ水韭ナ  
みづにら即チせきしやうもトスルモ非  
アル。

(二) 雲臺、未詳。  
(三) 戎ハ戌ノ誤。

時珍曰く、按ずるに、爾雅に『藿、山韭なり』とあり、許慎の説文に『藿は山韭なり』とあり。金幼孜の北征錄に『北邊のニ雲臺<sup>(三)</sup>戎地には野韭、沙葱<sup>しゃそう</sup>が多く、地方民はみなそれを探つて食ふ』とあるはこの物だ。蘇氏に詩に鬱とあるをこの物としてゐるが、正否いづれとも斷言されない。又、呂忱の字林には『藿——音は嚴<sup>(ゲ)</sup>ンである——は水韭であつて、水涯に野生し、葉は韭のやうで細長い。食へるものだ』とある。これで觀ると野生にもまた山、水の二種あるのだが、氣味は甚しい相異のないものらしい。

氣味 【鹹し、寒、瀋<sup>しよく</sup>にして毒なし】 主治 【腎に宜く、大、小便數に主

效があり、煩熱を去り、毛髮を治す】(千金)

發明 時珍曰く、藿は腎の菜であつて、腎病にはこれを食ふが宜し。諸家の

本草には記載がないが、孫思邈の千金方に收めてある。他の諸書にはこの字を訛<sup>あやまつ</sup>つて多くは藿<sup>くわく</sup>の字に書いてあるが、藿とは豆葉のことだ。陳直の奉親養老書にある藿菜羹はこの物で、その方は老人の脾、胃の氣弱で飲食の思はしからぬを治す。藿菜四兩、鯽魚肉五兩<sup>しよくぎこく</sup>を煮た羹に五味、并に少量の麪を下し、三五日毎に一回作つて食

(四) 牧野云フ、孝文  
韭ハ山韭ト同品ダト  
謂ハレデキル。

ふ。極めて補益がある。

### 附 録

(四) 孝文韭(拾遺) 藏器曰く、辛し、温にして毒なし。腹内冷、脹滿、洩

痢、腸澼に主效があり、中を温め、虚を補し、人をして能く歩行せしめる。寒北の  
山谷に生じ、形状は韭のやうだ。住民は多くこれを食べ、これは後魏の孝文帝が種  
ゑたものだといつてゐる。又、諸葛韭といふがあつて、孔明が種ゑたものだといふ。  
この韭は更に長いもので、彼の地では食つてゐる。

時珍曰く、これもやはり山韭だ。ただ人に因んで命けただけである。

### (一) 葱

(別録中品)

和名 れぎ  
學名 *Allium fistulosum*, L.  
科名 (一) 科(百合科)

### 釋 名

𦉰(綱目) 菜伯(同) 和事草(同) 鹿胎 時珍曰く、葱の文字は忽に

(一) 牧野云フ、本品  
ハ亞細亞大陸ノ原産  
デアルガ我邦ヘハ舊  
カ支那カラ傳ヘタモ  
ノト思フ、今ハ一般  
ニ栽培セラレ日常必  
要ノ蔬トナツテキ  
ル、古名ハキデアル  
カウ又ハヒともじ(一  
ト文字)ノ名ガアル。  
集解中ニアル冬葱ハ  
わけぎ、灌葱ハかり  
ぎ、胡葱ハ詳カデナ

従ふ。外が直く中が空で忽通の象があるからだ。𦉰とは草で中に孔があるからその  
文字を孔に従つて書いたので、𦉰脈はこれに象つたのだ。葱は、初生を葱針といひ、  
葉を葱青といひ、衣を葱袍といひ、莖を葱白といひ、葉の中の涕を葱茸といふ。諸

イ(本條ガアル)、蒼葱ハギヤウじヤにんにく(本條ガアル)デアル、樓葱ハヤウじヤ一名カールワザレギデ、我邦ノ農家之レヲ作リナル處ガアル、是レハレギノ一變種デ、學名チ *Allium fistulosum*, L. var. *viparum*, Makino. ト稱スル。

(C) 山南ハ唐ノ道ノ一、草部臨草類漏盧ノ註ヲ見ヨ。江左ハ草部山草類狗脊ノ註ヲ見ヨ。

(三) 荆楚ハ石部石炭ノ楚ノ註參照。

物にみな宜きものだから菜伯、和事といつたのである。

### 集解

恭曰く、葱には數種あつて、山葱をば蒼葱さうそうといふ。療病の功は胡葱に似たものだ。一般人の食ふ葱には二種あつて、一種は凍葱こそうそうといひ、冬を経て枯死せず、莖を分けて栽培するもので子がない。一種は漢葱といひ、冬には葉が枯れる。食料、薬用としては凍葱が最も善く、氣味も佳し。

俣井曰く、葱には凡そ四種ある。冬葱、即ち凍葱であつて、夏衰へて冬盛になり、莖、葉俱に軟美なもので、(三) 山南、江左にある。漢葱は莖が實して硬く、味が薄く、冬は葉が枯れる。胡葱は莖、葉が粗く硬く、根は金燈のやうだ。蒼葱は山谷に生ずるもので、薬用には入れない。

頤曰く、薬には山葱、胡葱を用ゐ、食品には冬葱、漢葱を用ゐる。又、樓葱といふ一種があつて、やはり冬葱の類のものだ。江南地方ではこれを龍角葱と呼び、(三) 荆楚地方で多くこれを種くふる。その皮は赤く、莖毎に上に双方に分れた角のやうな岐が出るからさう呼ばれるのだ。

瑞曰く、龍角、即ち龍爪葱りゆうさうそうである。又、羊角葱と名ける。莖上に生える根を下に

(註) 木村(康)曰ク、  
植物食物誌ニヨレバ  
内地及臺灣産ノ葱ノ  
組成左ノ如シ。

産地	水分	蛋白質	脂肪	炭水 化合物	纖維	灰分
内地産	91.50	1.50	0.20	4.80	2.00	0.50
同	92.63	1.47	0.07	4.33	1.03	0.44
臺灣産	92.926	1.774	0.199	4.172	—	0.703

れぎ類一種ノ香氣ハ  
ソノ含有スル精油ニ  
歸スベク、ソノ主成  
分ハ揮發油及ビ「フ  
イテン」ナリ。  
(應用) れぎハ四時食

移して植ゑる。

時珍曰く、冬葱、即ち慈葱であつて、或は太官葱と名ける。それは莖が柔く細く



〔樓 葱〕

〔葱〕

の子は味辛く、色黒く、皺文さうもんがあり、三瓣状をなしてゐる。取收めて陰乾する。沍か鬱うしてはならぬ。これは子を種ゑるもよく、分けて栽培するもよし。

### 葱藍白 氣味

「辛し、平なり。葉は温なり。根鬚、汁、いづれも毒なし」

弘景曰く、葱には寒と熱とあつて、白は冷、青は熱である。傷寒に用ゐる湯藥中には青を用ゐてはならぬ。宗奭曰く、葱は發散を主とする。多食すれば神を昏する。

用ニ供セラルル蔬菜  
中ノ重要ナルモノニ  
シテ、我が國ニ於テ  
關西地方ニテハ青菜  
ヲ實用スレドモ、關  
東ニテハ白色部ヲ喜  
ブ。蒟蒻ハヨク神經  
ヲ刺激シ、消化液ノ  
分泌ヲ促シ、消化器  
内ノ寄生蟲ノ發生ヲ  
豫防シ、又偉麗實ニ  
效アリ。

洗曰く、葱は冬期の食物としてよし、過多に食つてはならない。鬚髮を損じ、虚氣を發して上冲し、五臟を閉絶する。それは骨節を開き、汗を出す結果である。思邈曰く、正月に生葱を食へば顔面に遊風を起す。生葱と蜜と食合せれば下利を作す。焼いた葱と蜜と食合せれば瘧氣して死亡する。張仲景曰く、生葱と棗とを食合せれば病となる。犬、雉の肉と食合せれば血を病む。時珍曰く、地黄、常山を服する者は葱を食ふことを忌む。

### 主治

【湯にすれば傷寒寒熱、中風、面目の浮腫を治し、能く汗を出す】〔本經〕

【傷寒の骨肉碎痛、喉痺不通。胎を安じ、目に歸し、目睛を益し、肝中の邪氣を除き、中を安じ、五臟を利し、あらゆる藥毒を殺す。根は傷寒頭痛を治す】〔別錄〕【天行時疾の頭痛、熱狂、霍亂轉筋、及び奔豚氣、脚氣、心腹痛、目眩に主效があり、心の迷悶を止める】〔大明〕【關節を通じ、衄血を止め、大、小便を利す】〔孟詵〕【陽明の下痢、下血を治す】〔李杲〕【表に達し、裏を和し、血を止める】〔寧原〕【風濕の身痛、麻痺、蟲積の心痛を除き、大人の腸脱、陰毒腹痛、小兒の盤腸肉釣、婦人の妊娠溺血を止め、乳汁を通じ、乳癰を散じ、耳鳴を利す。狂犬の咬傷に塗り、蚯蚓の毒を制



す【時珍】「一切の魚肉の毒を殺す」【土良】

發明

元素曰く、葱薹白は味辛くして甘し、平である。氣は厚く、味は薄く、升であり陽であつて、手の太陰、足の陽明の經に入り、専ら發散を主として上下の陽氣を通ずるものだ。故に活人書では、傷寒の破れるやうな頭痛を治するに連翹葱白湯を主とし、張仲景は少陰の病の清穀を下利し、裏寒し、外熱し、厥逆し、脈の微なるを治するに白通湯を主とし、その中に葱白を用ゐ、顔色赤きもの場合には四逆湯に葱白を加へ、腹中の痛むには葱白を去つた。成無己はこれを解釋して『腎は燥を惡む、急に辛を食つて以て潤ほす。葱白の辛、溫は以て陽氣を通ずるものだ』といつてある。

時珍曰く、葱は佛教徒が五葷の一に數へるものだ。生では辛くして散じ、熟すれば甘く溫である。外實し、中空であつて肺の葉である。肺の病にはこれを食ふが宜しい。肺は氣を主とし、外には皮毛に應じ、その合は陽明である。故にその治するところの症は多く太陰、陽明に屬し、いづれもこの物の發散し氣を通ずる功力を取るものであつて、氣を通ずるから能く毒を解し、また血病を理するのだ。氣は血の帥

であつて、氣が通ずれば血が活きる。金瘡、磕損、折傷の出血し疼痛して止まぬものに、王璆の百一方では葱白、砂糖を用ゐ、等分を研つて封すれば痛が去つて立ろに止み、更に癰痕がなくなる。葱葉もやはり用ゐられる。又、葱管で鹽を玉莖内に吹入れると、小便不通、及び轉脬の危急なるものを治するに極めて捷に奏效する。余は嘗て用ゐて數人の治療に效驗を擧げた。

### 附方

舊十二、新三十一。

【感冒風寒】初期に葱白一握、淡豆豉半合を湯に泡けて服し、汗を取る。（類湖集簡方）【傷寒頭痛】破れるやうに烈きには、鬚の附いたままの葱白半斤、生薑二兩を水で煮て溫服する。（活人書）【時疾頭痛】發熱するには、根の附いた葱白二十本を米に和して粥に煮、醋少量を入れて熱して食ひ、汗を取れば解す。（濟生秘覽）【數種の傷寒】初期の二三日でまだ判然せぬには、上記の法を用ゐて汗を取る。【傷寒の勞復】房事が原因で腹痛し、卵腫するには、葱白を搗き爛らし、苦酒一盞を入れて和して服す。（千金方）【風溼身痛】生葱を搗り爛し、香油數點を入れて水で煎じ、川芎藭、鬱金の末一錢を調へて服し、吐かす。（丹溪心法）【妊娠傷寒】赤斑があり、變じて黒斑となり、尿血するには、葱白一把、水三升を煮て汁を熱服

(五)大觀ニ病ヲ腰ニ作ル。

(六)大觀ニ痔ニ作ル。

(七)嚏ハ嘔ニ同シ、魚ノ水ヲ吸フ如キ貌ナイフ。

し、その葱全部を食つて汗を取る。(傷寒類要)『妊娠六ヶ月の孕動』危篤に陥つて救ひ難きには、葱白一大握、水三升を一升に煎じ、滓を去つて頓服する。(楊氏産乳)『胎動下血』(孕)病痛が心を捨くには、葱白を煮た濃汁を飲む。なほ胎兒の死なぬものは安かになり、已に死んだものは出る。なほ奏效せぬときは再服する。ある方では、川芎を加へる。ある方では銀器で米と共に粥に煮、また羹にして食ふ。(深師方)『中惡の卒死』或は豫め病があり、或は平常と變りなくして就寢中そのまま卒死するは、いづれも中惡である。急に葱心黃を取つて鼻孔中に刺し入れ、男は左、女は右に七八寸入れる。鼻、目から血が出て甦る。○又ある法では、葱を耳中に五寸刺し入れる。それで鼻中から血が出て活きる。血の出ないものは活さない。これは扁鵲の祕方だと言ひ傳へてある。(崔氏纂要)『小兒の卒死』故なくして卒死せるには、葱白を取つて下部、及び兩鼻孔中に納れる。氣が通じ、或は嚏して復活する。(陳氏經驗方)『小兒の盤腸』内釣して腹痛するには、葱湯で病兒の腹を洗ひ、同時に葱を炒り搗いて臍上に貼る。良久して尿が出て痛が止まる。(楊氏嬰孩寶鑑)『陰毒腹痛』厥逆し、唇青く、卵縮し、六脈の絶えんとするには、葱一束を根、及び青を去つて白を

留め、二寸を臍上に置いて熨斗火でその上から熨し、葱が壞れたときは易へる。良久して熱氣が透入して手、足が温まり、汗が出れば瘥える。そこで四逆湯を服する。

熨して手、足が温まらぬものは活きない。(朱睦南陽活人書) 「脱腸の危症」凡そ大吐し、

大泄して、四肢が厥冷して人事不省となり、或は房事後に小腹、腎が痛み、外腎が縮し、冷汗が出て厥逆するは須臾にして絶望になる。先づ葱白を炒り熱して臍

を熨し、後に葱白二十一莖を搗り爛して酒で煮て灌ぐ。陽氣が直ちに回復するものだ。これは華佗が卒病を救つた方である。【突然心の急痛するもの】牙關が緊閉し、

絶せんとするには、老葱白五本を皮、鬚を去り、膏に搗いて匙で咽中に送入し、麻油四兩を灌ぐ。ただ咽を下れば甦り、少頃して蟲積がみな黄水に化して下り、永く

再發せぬ。累りに人命を救ひ得た(瑞竹堂方)。「霍亂煩躁」坐臥不安なるには、葱白二十本、大棗二十箇、水三升を二升に煎じて分服する(深師方)。「蚘蟲心痛」葱莖白

二寸、鉛粉二錢を搗いて丸にして服すれば止む。葱は能く氣を通じ、粉は能く蟲を殺すものだ。(楊氏經驗方)。「腹皮の麻痺」不仁なるには、葱白を多く煮て食へば自ら瘥

える。(危氏方)。「小便閉脹」治療せねば死に至る。葱白三斤を剉んで炒り、帕に二箇

(○)大觀ニ搗ニ作  
ル。

に盛り別けて更互に小腹を慰す。氣が透つて通じる。(許學士本事方) 【大、小便閉】葱  
白と酢とを擣き和して小腹を封じ、同時に七壯灸する。(外臺祕要) 【大腸の虛閉】勺  
氣散——連鬚葱一根、薑一塊、鹽一捻、淡豉二十一粒を擣いて餅にし、烘やいて臍中  
を擗おほふて紮定さつていする。良久してその氣が通ずれば通じがある。通ぜぬときは再び試み  
る。(楊氏直指方) 【小兒の虛閉】葱白三根の煎湯で生薑、阿膠末あけうを調へて服し、同時に  
葱頭に蜜を染めて肛門に挿入すれば少頃して通ずる。(全幼心鑑) 【急淋陰腫】泥葱半斤  
を煨熟わいじやくして杵き爛し、臍上に貼る。(外臺) 【小便淋澀】或は尿にち白あるには、赤根  
樓葱を根に近い部分一寸ばかりを截つて臍中に置き、艾わで七壯灸する。(經驗方) 【小  
兒の不尿】胎熱のためだ。大葱白を四斤に切つて乳汁半盞と共に煎じ、片時して四  
回に分服すれば通じる。乳を飲まぬものもこれを服すれば乳を飲む。若し臍しの四旁はう  
に青黒色があり、また口を撮するものならば望なし。(全幼心鑑) 【腫毒尿閉】腫毒が潰  
れぬために小便が通ぜぬには、葱を切つて蘆油に入れて黒色になるまで煎じ、葱を  
去り油を取つて腫處に塗れば通じる。(普濟) 【水癰病腫】葱根白皮の煮汁一盞を服  
す。水を下出するものだ。病が已に困篤なるには、根を擣き爛してそれに坐る。白



ら氣水を取下す（聖濟錄）【陰囊腫痛】葱白、乳香を搗いて塗る。即時に痛が止み、腫が消く。又ある方では、煨葱に鹽を入れて泥のやうに杵いて塗る。【小便濁血】葱白一握、鬱金一兩、水一升を二合に煎じ、一日三回溫服する（普濟方）【腸痔で血の出るもの】葱白三斤を湯に煮て熏じ洗へば立ろに效がある（外臺）【赤、白下痢】葱白一握を細かに切り、米を和し粥に煮て日毎に食ふ（食醫心鏡）【便毒の初期】葱白を炒り熱して布に包み、數回熨して藥を傳ければ消く。○永類方では、葱根に蜜を和して搗いて傳け、紙でそれを密護し、外に通氣藥を服すれば癒える。【癰疽腫硬】烏金散。癰癤の硬く腫れて頭がなく、色の變ぜぬものを治す。米粉四兩、葱白一兩を共に黒く炒り、研末して醋で調へて貼り、一伏時してまた換へ、消するを度とする（外科精義）【一切の腫毒】一日四五回葱汁に漬ける。【乳癰の初期】葱汁一升を頓服すれば散る（いづれも千金）【疔瘡惡腫】刺し破つて老葱、生蜜を杵いて貼る。三四時間で疔が出てから醋湯で洗ふ。神效がある（聖濟錄）【小兒の禿瘡】冷汁れい汁で洗淨し、羊角葱を泥に搗いて蜜を入れて和して塗る。神效がある（楊氏）【刺瘡、金瘡】あらゆる治療も效なきには、葱の濃煎汁に漬けるが甚だ良し。【金瘡の瘀血】腹に



在るには、大葱白二十箇、蕪子三升を杵き碎き、水九升で一升半に煮て頓服する。

膿血を吐出して癒えるものだ。なほ盡きぬときは再服する。(いづれも千金方) 【血壅怪

病】全身から突然錐のやうに肉が出て、痒く且つ痛み、飲食不能なるを血壅と名け

る。速に治療を加へねば必らず潰膿血となる。赤皮の葱を灰に焼いて淋し洗ひ、豉

湯數盞を飲めば自ら平安になる。(夏子益怪病奇方) 【金銀の毒を解す】葱白の煮汁を飲

む。(外臺秘要) 【腦破骨折】蜜と葱白とを搗きませて厚く封ずれば立ろに效がある。

(肘后方) 【自縊して垂死のもの】葱心で耳、鼻中を刺す。血が出れば甦へる。

葉 主治 【煨き研つて金瘡が水に入つて鞍腫せるに傅け、鹽で研つて蛇虫

傷、及び射工、溪毒に中りたるに傅ける】(日華) 【水病足腫に主效がある】(蘇頌) 【五

臟を利し、目、精を益し、黃疸を發する】(思邈)

發 明 頌曰く、煨葱で打撲損を治することは劉禹錫の傳信方に記載があつて

『崔給事が傳へたものだ。葱の新に折り取つて(二) 燂火で煨熱して皮を剥ぎ、その間

にある涕を取つて損した處を罨ひ、同時に多く煨いて置いて次ぎ次ぎと熱したもの

に易へる。崔給事の話に近頃李抱眞と澤潞に判官を勤めてゐた時、李相が毬杖で毬

(一〇) 大葱ニ入糖灰火  
二作ル。

を打つてゐると、同じく駐屯中の某軍將も杖を以て互にその技を闘はし、勢に乗じて李相の拇指を傷め、爪甲まで劈裂したことがあつた。その際遽に金創藥を求めて創を裹み、強ひて酒を飲み始めたが、飲めば飲むほど顔色がますます青くなり、非常な痛を耐へてゐた。するとある軍吏がこの方の話をしたので、早速それを三回まで易へて試ると、顔色が反對に赤くなり、少時すると、もう痛まなくなつた。凡そ十數回熱葱、并に涕でその指を纏裹して、その席の畢るまで愉快に談笑を續けた」といふとある。

時珍曰く、按ずるに、張氏經驗方に『金創、折傷の出血には、葱白を葉附きのまま煨き熱し、或は鍋烙で炒熱して擣き爛して傅け、冷えれば再び易へる。石城の尉戴堯臣が馬を試みて大指を損じ、血出淋漓たる有様だつたが、余がこの方を用ゐて再び易へると痛が止み、翌日洗面の際に見ると痕跡がなくなつてゐた。宋推官、鮑縣尹いづれもこの方を得て、殺傷者がある毎に、呼吸のまだ絶えぬときは早速この方を用ゐしめて、人命を救つたことが甚だ多い』とある。又、凡そ頭、目が重悶し、疼痛するものには、余は毎に葱葉を鼻中に二三寸、并に耳中に挿入させるが、

氣が通じて清爽になる。

### 附方

曹三、新二。

【水病の足腫】葱莖葉を湯に煮て一日三五回漬けるが妙である（韋宙獨行方）【小便不通】葱白を葉共に擣き爛らして蜜を入れ、外腎上に合せれば通ずる（永類鈴方）【瘡傷風水】腫毒には、葱青葉を取つて乾薑、黃蘗と等分を湯に煮て浸し洗へば立ろに癒える（食療）【蜘蛛咬瘡】全身に瘡を生じたるには、青葱葉一莖を尖を去り、蚯蚓一條をその中に入れ、化けて水となるを待つて取り出し、それを咬まれた患部に點ければ癒える。（李絳兵部手集）【代指毒痛】黃に萎れた葱葉を取つて煮た汁を熱して漬ける（千金方）

### 汁 氣味 【辛し、溫、滑にして毒なし】

### 主治

【溺血にはこれを飲む。藜蘆、及び桂の毒を解す】（別錄）【瘀血を散じ、

衄を止め、痛を止め、頭痛、耳聾を治し、痔漏を消し、衆くの藥の毒を解す】（時珍）

【能く玉を消して水となし、五石を化す。仙方で使用する】（弘景）

### 發明

時珍曰く、葱汁、即ち葱涕である。功は葱白と同じ。古方に多く葱涎を用ゐて藥を丸にすとあるは、やはりその上焦の風氣を通散する點を取つたのだ。

勝金方では、汁を取り、酒少量を入れて鼻中に滴し、衄血の止まぬを治し『直ちに血が腦から散下するを覺える』といつてある。又、唐璣經驗方では、葱汁に蜜少量を和して服するも佳しとして『隣媼もこれを用ゐて甚だ效があつた。老僕にもこれを試みてやはり效驗があつた』といつてある。この二物は共に食へば人體に害がある。如何なる關係でこの疾には治療の效能があるものか。恐らくその人の脾、胃が異常であつたのだらう、甚だ急切な場合以外には輕輕しく試むべきでない。

慎微曰く、三洞要錄に『葱は菜の伯であつて、能く金、錫、玉、石を消す。神仙金玉漿の法は、冬至の日に葱汁、及び根を壺盧に盛つて庭中に埋め、翌年の夏至に掘り出して見ると盡く化けて水になつてゐる。ある一定の方法に依つてその水に金、玉、銀、青石各三分を漬けると自から消ける。それを暴乾すると飴のやうになり、食へば糧食を休め得る。また金漿ともいふ』とある。

#### 【附方】

舊四、新二。

『衄血の止まぬもの』方は前項を見よ。『金瘡出血』止まぬ

には、葱を取つて炙き熱し、接んで汁を塗る。直ちに止まる。（梅師方）『火瘡丹毒』頭から起つたものには、生葱汁を塗る。【痔瘻の痛むもの】葱涎と白蜜を和して塗

る。豫め木鼈子もくべつしの煎湯で熏じ洗ふ。塗ると水のやうに冷くして效がある。ある者が

この病のとき、早朝これを用ゐると正午頃には平安になつた（唐仲舉方）【鉤吻こうふんの毒

を解す】顔色青く、口噤して死せんとするには、葱涕を啖くへば解す（千金）

### 鬚す 主治

【氣を通ずる】（孟詵）

【飽食、房勞のために血が大腸に滲入して便

血、腸澼、痔となり、口乾くものを療ず。研末して二錢づつを溫酒で服す（時珍）

### 附方

舊一。

【喉中腫塞】氣の通ぜぬには、葱鬚そうしゆを陰乾して末にし、二錢づつ

に蒲州膽礬末一錢を入れて和勻し、一字づつを吹く。（杜壬方）

### 花 主治

【心、脾すいが錐たい、刀で刺すやうに痛み、腹脹するには、一升を呉茱

萸一升、水二八合と共に七合に煎じて滓を去り、三回に分服する。立ろに效があ

る（頌） 記載は崔元亮の方にある。

### 實 氣味

【辛し、大溫にして毒なし】

### 主治

【目を明にし、中氣不足を補す】（本經）

【中を溫め、精を益す】（日華）

【肺に宜く、頭に歸す】（思邈）

### 附方

舊一。

【眼の暗きに中を補す】葱子半升を末にし、一匙を湯一升半に

（二）大觀ニ一大升ノ  
三字水下ニアリ。

煎じて滓かすを去り、米を入れ粥かゆに煮て食ふ。また末にして蜜で梧子大の丸にし、食後に米湯で一二十丸を服するもよし。一日三回。(食醫心鏡)

茗 葱 (千金)

和名 ギヤウジャニン  
學名 *Allium victorialis*, L.  
科名 ヨリ科(百合科)

釋 名 山葱

保昇ほしょう曰く、茗葱は山谷に生ずる。薬用には入れない。

集 解

頤い曰く、爾雅に『茗は山葱なり』とあり、説文には『茗葱は山中に生ずる。莖細く、葉が太い』とある。食つては通常の葱より香美かうびだ。薬用に入るに宜し。

時珍ししん曰く、茗葱は野葱であつて、山原、平地いづれにもある。沙地に生えるものをば沙葱さそうと名け、水澤に生えるものをば水葱と名け、野人はいづれも食ふ。白花を開いて小葱頭のやうな子を結ぶものだ。世俗には胡葱、即ち蒜葱さんそうなることに明な智識がなく、誤つてこの物を指して胡葱としてゐる。詳細は胡葱の條を見よ。保昇は薬用に入れないといひ、蘇頌は薬用に山葱、胡葱を入れて宜しといつたが、茲に思

(二) 牧野云フ、山中ニ生ズル品テ本屬甲葉ノ最モ潤キ者デアル、救荒本草ニ山葱一名隔葱又ノ名鹿耳葱トシテ其ノ圖説ガアル。



(二) 藪音次、毛蟲有毒ノモノ。

(一) 牧野云フ、本品ハ未詳ノ種デ我邦ニハ之レヲ見ナイ、人ニヨリ之レヲたゞれギ即チ *Allium Cepa* L. ニ充ツレドモ非デアル。

邈の千金食性を調べて見ると、自ら蒼葱の功用があるのだ。諸本草に記載を失してゐるが、此に採録してその缺を補ふて置く。

氣味

【辛し、微温にして毒なし】時珍曰く、佛教徒は蒼葱を五葷の一に數へてゐる。蒜の條を見よ。

主治

【瘴氣、惡毒を除く。久しく食すれば志を強くし、膽氣を益す】(思邈)

【諸惡ニ藪、狐尿刺毒、山溪中の沙蟲、射工等の毒に主效があり、煮汁に浸し、或は擣いて傅ければ大效がある。やはり小蒜、茱萸などと兼用するもので、單獨には用ゐない。(蘇恭)】

子氣味

葱に同じ。

主治

【洩精】(思邈)

(一) 胡葱 (宋開寶)

和名 無し  
學名 *Allium* sp.  
科名 ゆり科(百合科)

釋名

蒜葱(綱目) 回回葱

時珍曰く、按ずるに、孫真人の食忌に蒔葱と書

いてあるは、その根が蒔蒜こさんに似てゐるからで、俗に蒜葱と稱するは正にその兩者の

意味を合せたものだ。元朝人の作つた飲膳正要には回くわい葱じゆいそうと書いてある。この物が胡地から渡來したといふ意味を表はしたらしい。故に胡葱といふのである。

集解

詵曰く、胡葱は蜀郡の山谷に生ずる。形状は大蒜に似て小さく、形は圓く、皮は赤く、梢は長くして鋭い。五月、六月に採る。

保昇曰く、葱に凡そ四種あつて、冬葱は夏枯れ、漢葱は冬枯れ、胡葱は莖、葉が粗く短く、根は金燈のやうだ。茗葱は山谷に生ずる。

頌曰く、胡葱は食葱に類するもので、根、莖いづれも細く白い。或は、根、莖は微し短く、金燈のやうだといひ、或は大蒜に似て小さく、皮が赤くして鋭いともいふ。

時珍曰く、胡葱、即ち蒜葱であつて、孟詵、韓保昇の説が正しい。野葱ではないのであつて、野葱は茗葱と名け、葱に似て小さいものだ。胡葱といふは一般に種植し、八月種を下して五月收取し、葉は葱に似て根は蒜に似たものだ。その味は薤わいのやうで甚だ臭くない。江西にある水晶葱といふは、根は蒜、葉は葱のやうなものだ。蓋しこの類のものである。李廷飛の延壽書に『葱胡、即ち薑子けうし』とあるは、蓋し相



〔葱 胡〕  
——葱回回——

似てゐるために誤つたので。現に俗間ではみな野葱を胡葱といつてゐるが、それは蒜葱を識らないところから蒼葱を指してそれと謬つてゐるのである。

修治

煑曰く、凡そこれを採取したならば、理紋に従つて擘碎し、綠梅子と相對して拌ぜ、一伏時の間蒸して梅子を去り、砂盆に入れて研つて膏のやうにし、瓦器に盛つて晒し乾して用ゐる。

氣味

【辛し、溫にして毒なし】時珍曰く、生では辛くして平である。熟すれば甘くして溫である。説曰く、やはりこれも薰するもので、久しく食へば神を傷め、性を損じ、人をして多く忘れしめ、目の明を損じ、血脈を絶し、痼疾を發する。胡葱、露菌を患ふ人がこれを食へばますます甚しくなる。思邈曰く、四月に葱葱を食つてはならぬ。人をして氣喘し、多く驚せしめるものだ。

主治

【中を溫め、氣を下し、穀物を消化し、食を能くし、蟲を殺し、五臟の

不足の氣を利す】(孟詵) 【腫毒を療ず】(保昇)

發明

時珍曰く、方術家では、溪澗の白石を煮て食糧にし、また牛、馬、驢の骨を煮て軟にするが、いづれも胡葱を用ゐるので、やはり堅きを軟にする性質を有つ物である。陶弘景が『葱は能く五石を化し、桂を消して水にする』といつたがこれは諸種の葱はいづれも能く石を軟にするからである。現今では茗葱みくそうを採つて石を煮、胡葱といつてゐる。

附方

新二。【身體、面部の浮腫】小便利せずして喘急するには、胡葱十莖、

赤小豆三合、消石一兩を用ゐ、水五升で葱と豆とを煮て、熟したときに共に搗すつて膏にし、空心に溫酒で半匙づつを服す。(聖惠方)

子主治

【諸毒肉に中つて吐血して止まず、萎黃し憔悴せうすんするには、一升を水煮し、晝一回、夜一回、半升を冷服する。血が定つて止まる】(孟詵)

薤

音は械(カ)ある。(別錄中品)

和名 らつきょう  
學名 Allium lakeri, Regel.  
科名 ゆり科(百合科)

(一) 牧野云フ、ちつきょうハ我日本ニハ野生ハ無ケレドモ、今ハ舊ク民間ニ栽培

テ其製重麟莖即チたまれヲ食用ニシテキル。

〔釋名〕

葍子

音は叫（ケウ）である。或は蕎と書くが、それは正しくない。葍

子

音は釣（テウ）である。火葱（綱目） 菜芝（別錄） 鴻書 音は會（ケイ）である。

時珍曰く、薤の本來の文字は薤と書き、韭の類だ。故にその文字は韭に従ひ歟。音

は槩（ガイ）に従ふの諧聲である。今は一般にその根が白いので葍子と呼び、江南

地方では訛つて菝子といふ。その葉が葱に類し根は蒜のやうで、採收した種をば火

で熏すべきものであるところから、俗間一般に火葱と呼んでゐる。羅願は『物は芝

より美なるはない。故に薤を菜芝といふ』といつた。蘇頌はまた菝子を蒜の條に附

録したが、誤だ。

〔集解〕

別錄に曰く、薤は魯山の平澤に生ずる。

（二）魯山ハ草部芳草類  
類本草ノ註、隰草類  
惡質ノ註參照。



〔薤〕

恭曰く、薤は韭の類のものである。

葉は韭に似て濶く、白が多くして實がなく、赤、白の二種あつて、白いものは補して美味だが赤いものは苦くして無味だ。

頌曰く、薤は處處にある。春、秋分に蒔き、冬になると葉が枯れる。爾雅に『勤は山薤なり』とあるは山中に生えるもので、莖、葉は家薤と相類してゐるが、根がやや長く、葉がやや太く、あだかも鹿葱のやうで、體、性もやはり家薤と同じである。今は一般に用ゐることが少だ。

宗奭曰く、薤は、葉は金燈の葉のやうでやや狭くして更に光る。故に古人は薤露といつた。それはその光滑にして、屹らぬ意味をいつたのだ。

時珍曰く、薤は八月に根を栽ゑて正月に分蒔する。肥壤の地がよく、數枝が一本に生え、茂つて根が太くなる。葉の形狀は韭に似てゐるが、韭葉は中が實して扁く、劍脊があり、薤葉は中が空で、細い葱の葉に似て稜があり、氣はやはり葱のやうだ。二月に紫白色の細花を開き、根は小さい蒜のやうで一本に數顆相依つて生える。五月に葉の青いとき掘るもので、さなくば肉が滿たない。その根は煮て食ふもよく、酒の芼として糟で淹藏するもよく、醋で浸してもいづれもよし。故に内則に『葱、薤を切り、諸醢に實て柔かにする』といつてある。白樂天の詩に『酥は暖なり薤白の酒』とあるは、酥で薤白を炒つて酒に投じたもののことをいつたのだ。水晶葱と



いふ一種のものは、葉は葱のやう、根は蒜さんのやうで、薤と似てゐるが臭くない。やはりその類のものだ。按ずるに、王禎の農書に『野薤、俗に天薤と名ける。麥原中に生じ、葉は薤に似て小さく、味は益辛いしんい。やはり食料に供し得るものだが、ただ多くないものだ』とあるは、爾雅にいふ山薤そのものである。

薤白 氣味

【辛く苦し、溫、滑にして毒なし】好古曰く、手の陽明の經に入る。頤曰く、薤は青を去り白を留めて用うべきもので、白は冷だが青は熱である。洗曰く、發熱する病には多食してはよくない。三四月に生のものを食つてはならぬ。大明曰く、生で食へば涕唾を引く。牛肉と食合せてはならぬ、癥瘕ちようがとなるものだ。

主治

【金瘡、瘡敗。身を輕くし、饑えず、老に耐へる】(本經) 【骨に歸し、寒熱を除き、水氣を去り、中を溫め、結氣を散ずる】(義) にして食へば病人を利す。諸瘡が風寒、水氣に中つて腫痛するには、搗ういて塗る【(別錄)】煮て食へば寒に耐へ、中を調へ、不足を補し、久痢、冷瀉を止め、人體を肥健にする【(日華)】洩痢下重を治し、能く下焦、陽明の氣滯を泄せす【(李杲)】好古曰く、下重するは氣滯である 四逆

散にこれを加へて用ゐて氣滯を泄す。【少陰の病で厥逆し、洩痢するもの、及び胸痺刺痛を治し、氣を下し、血を散じ、胎を安ずる】（時珍）【心病はこれを食ふが宜し、産婦を利す】（思邈）【婦人の帶下赤白を治するに、羹にして食ふ。骨哽の咽に在つて去らぬには、これを食へば下る】（孟詵）【虚を補し、毒を解す】（蘇頌）【白きものは補益し、赤きものは金瘡、及び風を療じ、臍肉を生ずる】（蘇恭）【蜜と共に搗いて湯火傷に塗れば甚だ速效がある】（宗奭）【温補して陽道を助ける】（時珍）

### 發明

弘景曰く、薤は性温補するもので、仙方、及び服食家いづれもこれを用ゐるが、偏に諸膏に入れて用ゐるのである。生では噉はない。葷辛が忌なためだ。詵曰く、薤は白色のものが最も好し。辛味はあるけれども五臓を葷せない。道術を學ぶ者は長くこれを服し、神に通じ、魂魄を安じ、氣を益し、筋力を續け得るものとしてある。

頤曰く、白薤の白は性冷にして補す。又曰く、薤子を煮て産蓐中の婦人に與へて飲ませると分娩を容易にする。また脚氣にも主效がある。

時珍曰く、薤は、味は辛く、氣は温である。諸家は温補するものだといひ、蘇頌

の圖經だけが冷補するといつてあるが、按ずるに、杜甫の薤の詩に『東<sup>ひがし</sup>ねて青<sup>せい</sup>芻<sup>そう</sup>の色に比し、圓くして玉<sup>ぎよく</sup>筍<sup>しゆん</sup>の頭に齊<sup>ひらけ</sup>し。衰<sup>さい</sup>年<sup>ねん</sup>關<sup>かん</sup>膈<sup>かく</sup>の冷には、味<sup>あじ</sup>暖<sup>ぬく</sup>にして併<sup>ひと</sup>て憂<sup>うれ</sup>なし』とあつて、やはり溫補することはいひ、經の文と合致する。して見ると冷補の説は蓋し當つてゐない、又按ずるに、王禎は『薤は生では氣が辛く、熟すれば甘美である。これを種<sup>う</sup>えれば蠹<sup>ご</sup>せず、これを食へば益あり。故に學道の人はこの<sup>よ</sup>に資<sup>あ</sup>る。老人はこれが宜し一といつた。しかし道家では薤を五葷の一としてあるが、諸氏の説ではこれを葷せぬとしてある。如何なるわけであらうか。薛用弱の齊諧志に『安陸の郭坦の兄は、天行病<sup>てんかうびやう</sup>を患<sup>わづら</sup>つてから後、非常に大食になり、毎日一斛まで食ふやうになつたので、五年の後には貧の極、乞食になり、ある日饑<sup>う</sup>ゑに耐へかね、野菜畑へ往つて薤を一畦<sup>あひ</sup>、大蒜を一畦食つて了つた。ところが甚しく悶<sup>あ</sup>えて地に臥し倒れ、籠のやうな物をそこに吐出した。それが漸次に縮小するのであつたが、ある者がその上へ飯を撮<sup>お</sup>くと、即時に消<sup>き</sup>けて水になつた。病はそれで瘳<sup>しやう</sup>えて了つた』とあるが、按ずるに、これもやはり薤が結を散じ、瘳を消する例證だ。

宗<sup>しゆ</sup>兩<sup>りやう</sup>曰く、薤葉は光滑で露もまた乾<sup>こ</sup>り難い。千金の肺氣喘急を治する方の中にこ

れを用ゐたのは、やはりその滑泄の關係を利用したのだ。

附方

萬十五、新八。

【胸痺刺痛】張仲景の栝樓薤白湯——胸痺して痛が心、背

に徹し、喘息し、欬睡し、氣短く、喉中燥痒し、寸脈が沈遲に、關脈が弦數なるを治

す。これは治療を加へねば死亡するものである。栝樓實一箇、薤白半升、白酒七升

を二升到煮取り、二回に分服する。○千金の胸痺を治する半夏薤白湯——薤白四兩、

半夏一合、枳實半兩、生薑一兩、栝樓實半箇を咀し、白朮漿三升で一升到煮取り、

一日三回到温服する。○肘後では、胸痛で瘥えても後に發するを治す。薤根五升の

搗汁を飲む。立ろに瘥える。○諺の音は在（サイ）、酢漿である。【中惡の卒死】卒死

し、或は豫め病があり、或は何事もなく寢に就いて忽ち死ぬものはいづれも中惡で

ある。薤汁を鼻中に灌入すれば意識が回復する。（肘後）【霍亂乾嘔】止まぬには、薤

一虎口を水三升で一升到煮取つて頓服する。三回到過ぎずして已む。（章帝獨行方）【奔

豚氣痛】薤白の搗汁を飲む。（肘後方）【赤痢の止まぬもの】薤と黃蘗とを共に煮て汁

を服す。（陳藏器）【赤、白下痢】薤白一握を米と共に粥に煮て日毎に食ふ。（食醫心鏡）

【小兒の疳痢】薤白を生で搗いて泥のやうにし、粳米粉と蜜とを和して餅にし、炙熱

(三) 瘡犯惡露ノ四字、大觀傷手足而犯惡露ノ七字ニ作ル。

(四) 大觀ニ瘡ヲ癰ニ作ル。

して與へて食はせる。二三服に過ぎずしてよし。(楊氏產乳)「産後の諸痢」多く薤白を煮て食ひ、同時に羊腎脂と共に炒つて食ふ。(范汪方)「妊娠胎動」腹内の冷痛するには、薤白一升、當歸四兩、水五升を二升到煮て三回に分服する。(古今錄驗)「鬱肉肺の毒」薤の杵汁二三升を服するが良し。(葛洪方)「瘡の惡露を犯したもの」甚しきは死亡する。薤白を搗き爛して帛に裹み、煨熟して帛を去つて傅け、冷えれば易へる。また搗いて餅にし、艾で灸するもよし。熱氣が瘡に入れば水が出て瘡える。(梅師方)「手指の赤色なるもの」月の生死に隨ふには、生薤一把を苦酒で煮熟し、搗き爛して塗る。癒えれば止める。(肘後方)「疥瘡の痛癢」薤葉を煮て搗き爛して塗る。(同上)「灸瘡の腫痛」薤白一升、猪脂一斤を切つて苦酒に一夜浸し、微火で煎じて三回火にかけ三回下し、滓を去つて塗る。(梅師方)「手、足の窩瘡」生薤一把を熱醋に投入し、それで瘡上を封じて效を取る。(千金)「毒蛇の螫傷」薤白を搗いて傅ける。(徐玉方)「虎、犬の咬傷」薤白の搗汁を飲み、并に塗る。一日三服。瘡えれば止る。(葛洪方)「諸魚の骨哽」薤白を柔に嚼み、繩で中を括つて吞み、哽處に達したとき引けば出る。(同上)「誤つて釵、銀を吞みたるとき」薤白を取つて曝して萎えしめ、そ



れを煮熟して切つて一大束を食ふ。釵は随つて出る（葛洪方）【日中の風翳】ふうま痛むには、薤白を取つて截斷し、膜上全面に置き、痛むときはまた試みる（范汪方）【咽喉腫痛】薤根を醋で搗いて腫處に傅け、冷えれば易へる（聖惠）

附 錄

藜藿（拾遺）藏器曰く、味辛し、溫にして毒なし。霍亂くわらんの腹冷、脹滿、

冷氣が攻撃して腹滿不調のもの、産後の血攻で胸膈の刺痛するに主效がある。煮て服す。平澤に生じ、その苗は葱、韭のやうだ。

時珍曰く、これもやはり山薤の類で、地方名が異ふだけだ。

（二）蒜（別錄下品）

和名 こびる  
學名 *Allium sativum*, L.  
科名 ゆり科（百合科）

釋 名

小蒜（別錄）蒠蒜 音は卯（オウ）である。葷菜 時珍曰く、蒜の字は

蒠に従ふ。音は蒠（サン）の諧聲であつて、また蒜の根の形を形容したものだ。中國には初めはこの物だけだったが、後に漢の時代こさんに蒠蒜を西域から將來したので、これをば小蒜と呼んで區別するやうになつたのだ。故に伏候の古今注に『蒜とは蒠蒜ほうさん

（一）牧野云フ、こびるノ和名アレドモ我邦ニハ産セヌ、にんにくニ似テ少シク小ナルモノナル、支那ニハ全國ニ栽培シテキル普通品デア



(二) 練形家ハ食治養  
生ヲ脩スル人。

のことで、俗にいふ小蒜のことだ。胡國に一株に十子ある胡蒜といふ蒜がある。俗にいふ大蒜そのものだ』とある。蒜は五葦ごこんの一だから許氏の説文には葦菜といつてある。五葦、即ち五辛であつて、辛臭にして神を昏し、性を伐ふしなふものといふ意味だ。

(三) 練形家では、小蒜、大蒜、韭、芸薹うんたい、胡荽こすゐを五葦とし、道家では韭、薤、蒜、芸薹、

胡荽を五葦とし、佛家では大蒜、小

蒜、興渠、慈葱じそう、茗葱かくそうを五葦として

ある。興渠とは阿魏のことだ。それ

ぞれ不同はあるが、しかしいづれも

辛熏のもので、生で食へば悲けいを増し、

熟して食へば嬌えんを發し、性靈を損す

るところがあるから絶つことにして



大蒜

〔蒜 小〕

あるのだ。

〔集 解〕

別錄に曰く、蒜とは小蒜のことだ。五月五日に採る。

弘景曰く、小蒜は葉の生えてゐるときは煮和しやくわして食へる。五月になると葉が枯れ

るもので、そのとき根を取る。亂子と名けるが正にそれだ。噉へばこれも甚だ靈臭だ。

保昇曰く、小蒜は處處に野生してある。小なるもので、一名亂——音は亂(ラン)

——一名蒿——音は力(リキ)——といひ、苗、葉、根、子いづれも蒠に似てゐるが、

幾分の一ほどの細かいものだ。爾雅に『蒿は山蒜なり』とあり、注に『説文に「菜は葦菜なり」とある。菜の美なる者は雲夢の葦菜といふ。山中に生ずるものを蒿と名ける』とある。

頤曰く、本草では大蒜を蒠といひ、小蒜を蒜といつてあつて、説文の所謂葦菜は大蒜のこと、蒿、即ち小蒜である。典籍に傳はる記載には、物の別名にかやうな不同がある。藥に使用するには餘程正確な考査を要する。

宗奭曰く、小蒜、即ち蒜であつて、苗は葱針のやう、根は白くして大なるは烏芋子ほどあり、根共に煮て食ふ。これを宅蒜といふ。

時珍曰く、家蒜に四種あつて、根、莖共に小さくして瓣が少く、辣の甚しいものは蒜であり、小蒜である。根、莖共に大きくして瓣が多く、辛くして甘を帶ぶるも

(一) 雲夢ハ澤名、今ノ湖北省安陸縣ノ南ニ在リ。モト二澤ニシテ、雲澤ハ揚子江ノ北ニ在リ、夢澤ハ揚子江ノ南ニ在リ。方ハ九百支里、安陸以南、華容以北、枝江以東、ミナソノ地ナリ。後ニ悉ク邑居聚落トナル。因テ併稱シテ雲夢トイフ。此ニ雲夢トハソノ一帯ノ地方ヲ指スナリ。又、縣名ニ雲夢縣アリ。西魏ニ置ク、今ハ湖北省江漢道ニ屬ス。

〔4〕蒿山、時珍ノ山  
蒜ノ註ニ據レバ、江  
蘇省丹徒縣附近ノ蒜  
山ガ古ノ蒿山ナリト  
イフ。

のは蒟であり、大蒜である。按ずるに、孫炎の爾雅正義に「帝（一）蒿山（二）に登り、蓂芋（三）の毒に遭ふて將に死せんとしたとき、蒜を得て嚼み食つて解した。そこで採收して來て植ゑたもので、能く腥、癩、蟲、魚の毒を殺す」とあり、又、孫愐の唐韻に『張鷟（四）が西域に使したとき、始めて大蒜の種を得て歸つた』とある。これに據つて見ると、小蒜の種は蒿から移植されたもので、古代から有つたのである。故に爾雅には蒿を山蒜と呼んで家蒜との區別を置いたのだ。大蒜の種は胡地から移入され、漢の時代に始めて中國に有るやうになつたのである。故に別錄には蒟を大蒜と呼んで中國の小蒜との區別を置いたのだ。又、王禎の農書には「澤蒜といふ一種は最も滋蔓し易いもので、刷くするに隨つてまた茂り合ふ。熟した時に子を探つて漫散して種ゑるものだ。吳地方では煮物の調理に多くこれを用ゐる。根は菹そにすると更に葱、韭に勝るものだ」とある。按ずるに、これは正に別錄の所謂小蒜そのもので、その始には野澤から移植したものだから澤なる名稱を冠されたのだ。寇氏は誤つて宅の字を書いてある。諸家はいづれも野生の山蒜、澤蒜の説明を移うつして農家で栽培する小蒜の解釋をしてゐるが、いづれも考證の正確を失してゐる。小蒜は蒿から出たに

しても、既に人工的栽培を経た以上、性氣にも相當の變化がなければならぬわけだ。故にその點に十分注意を要する。

### 蒜

小蒜根である。

氣味

【辛し、溫にして小毒あり】弘景曰く、味辛し、

性熱であつて人を損ずる。長く食つてはならぬ。思邈曰く、毒なし。三月には久しく食つてはならぬ。人の志性を傷めるものだ。黃帝の書に『生魚と共に食へば人をして奪氣し、陰核を疼ましめる』とある。瑞曰く、脚氣、風病の人、及び時病後にはこれを食ふことを忌む。

### 主 治

【脾、腎に歸す。霍亂の腹中不安に主效があり、穀物を消化し、胃を

理し、中を溫め、邪痺、毒氣を除く】(別錄) 【溪毒に主效がある】(弘景) 【氣を下し、

蠱毒を治す。蛇蟲、沙蟲の瘡に傅ける】(日華) 恭曰く、この蒜と胡葱と配合すれば、

惡戢毒、山溪中の沙蟲、水毒を治するに大效があるもので、山間の人民、狸獠(蠻人

を指す) が時にこれを用ゐる。【丁腫に塗るが甚だ良し】(孟詵)

### 葉

#### 主 治

【心煩痛。諸毒を解す。小兒の丹疹】(思邈)

### 發 明

頌曰く、古方では多く小蒜を中冷霍亂を治するに用ゐて、煮汁を飲ま

(五) 木村康曰ク、  
Allium Sativum L.  
var. vulgare (セリ  
やうにんにく) 鱗莖  
ハ水分六四(%)、糖  
分痕跡、含窒素物二  
六・三、粗纖維〇・七  
七、灰分一・四四、脂  
肪〇・〇六、又「イヌ  
リン」ヲ有ス。油分ハ  
「ガスルフィド」ヲツ  
ルスルフィド」等有  
機硫黃化合物ヨリナ  
ル。

せた。南齊の褚澄は李道念の雞瘕けいかをこれで治して瘥えた。

宗奭そうしやく曰く、華佗が用ゐた蒜齏さんさいは即ちこの蒜である。

時珍曰く、按ずるに、李延壽の南史に『李道念が已に五年も病むでゐたとき、丞相褚澄が診て「これは冷でもなく熱でもない。白淪びやくりん雞子の食過ぎだ」といつて蒜一升を取つて煮て食はせた。するとある物を吐出したが、涎に裹まれてゐるその物をよく見ると、それは雞の雛で、翅や足も完全に具つてゐた。しかし、澄は「まだ出盡きない」といつて更に吐かせ、凡て十二箇吐かせてそれで瘥えた』とある。蒜の字を蘇と書いてもあるが、それは誤だ。范曄の後漢書には『華佗は、噎いして食物の下らぬ一病人を見て、餅店家の蒜齏水二升ばかりを取つて飲ませた。すると立ろに一條の蛇を吐いた。やがて病人がその蛇を車に載せて華佗の家を訪ねて見ると、壁の北側に數十條の蛇が懸かつてゐたので、如何にも不思議に思つた』とある。又、夏子益の奇疾方には『人の頭部、面部に光があつて、他人の手を近けると火の燃え盛るやうに感ずるは中蠱である。蒜汁半兩に酒を和して服すれば蛇のやうな状態のものを吐出する』とある。以上三書の所載の事實を觀ると、蒜は蠱を吐かす要藥で



ある。しかるに後世一般にはそれに關する知識がなくなつた。

附方

舊七、新七。

【時氣溫病】發病の當初、頭痛壯熱し、脈の大なるには、

直ちに小蒜一升を杵き、汁三合を取つて頓服する。二回に過ぎずして癒える。（肘後方）  
【霍亂脹滿】吐、下せぬものを乾霍亂と名ける。小蒜一升、水三升を一升到煮て頓服する。（肘後方）  
【霍亂轉筋】腹に入れば死亡する。小蒜、鹽各一兩を搗いて臍中に

傅け、灸を七壯すれば立ろに止む。（聖濟錄） 【積年の心痛】忍び難きには、十年、五

年のものに拘らず、手に隨つて效が現はれる。小蒜をハク濃汁に煮て飽くまで食ふ。鹽を著けてはならぬ。曾てこれを用ゐて奏效し、再び發しなかつた。（兵部手集） 【水毒

ハク大觀ニ濃汁ハ鹽醋ニ作ル。

に中つたもの】一名中溪、一名中溼、一名水病ちうじつといふ。射工に似たもので物がなない。その初には惡寒をかんし、頭、目が微疹し、朝は醒めて夕に劇しく、手、足逆冷し、三日にして蟲が生じ、食が下り、痒からず痛まず、六七日經過すると蟲が五臟を食ひ、注下して禁ぜぬものである。小蒜三升を煮て微熱し——大いに熱しては力が無くなる——それで身體を溶する。身體に赤斑文せきはんもんを發するものならば、他の病としての治療を加へてはならぬ。（肘後方） 【射工の毒に中つたもの】瘡となる。蒜を取つて切片



して瘡上に貼り、灸を七壯する。(千金) 【瘡疾の止截】小蒜を多少に拘はらず泥に研り、黄丹少量を入れて、莢子大の丸にし、一丸づつを東に向つて新汲水で服するが至つて妙である。(唐慎微) 【刺すやうな陰腫】汁の出るには、小蒜一升、韭根一升、楊柳根二斤、酒三升を煎沸し、熱に乗じて熏ずる。(永類方) 【惡核腫結】小蒜、吳茱萸等分を搗いて傅ければ散る。(肘後) 【五色丹毒】不規則に、また足踝に發するには、蒜を杵いて厚く傅け、頻りに易へる。(葛氏) 【小兒の白禿】頭上が團團と白色になるには、蒜を切つてその切口で揩る。(子母秘錄) 【蛇、蠍の整傷】小蒜の搗汁を服し、滓を傳ける。(肘後) 【蜈蚣の咬瘡】小蒜を嚼んで塗るが良し。(肘後方) 【蝮蛇の耳に入りたるとき】小蒜を洗淨して搗き、その汁を滴す。なほ出ぬときは再び滴す。(李緯兵部手集)

## 山 蒜 (拾 遺)

和名 宋詳  
學名 *Allium* sp.  
科名 ヨリ科(百合科)

### 釋 名

蒜 音は歷(レキ)である。澤蒜

(一) 牧野云フ、我邦ノ先輩之レチのびる(A. nipponicum, Fr. et Sav.)ニ充テキルガ、多少似タ點ハアルガ今遽カニサウ

斷定ハ出來難ク、且  
のびるが果シテ支那  
ニ在ルカ、別ニ其證  
ハナイカラ其邊頗ル  
不明デアル。

自<sup>(一)</sup>非<sup>(二)</sup>曰ク、前條蒜及  
此條時珍ノ說明ヲ見  
ルニ、蒜ハ山蒜即嵩  
及澤蒜チ人家ニ移植  
シタモノトイフ事ニ  
ハツテ居ル故、此條  
ハ蒜ノ原種ト見ルカ  
妥當ノ様ニ思ハル。  
(一)京口ハ今ノ江蘇  
省丹徒縣治ナリ。

(二)傳、大觀ニ服ニ  
作ル。

## 集解

頤曰く、江南の一種の山蒜は大蒜に似て臭い。

藏器曰く、澤蒜は、根は小蒜のやう、葉は韭のやうだ。又、石間に生ずるものを  
ば石蒜と名ける。蒜と相異がない。

時珍曰く、山蒜、澤蒜、石蒜は同一物で、ただ山と澤と石間とその生える場所に  
相異があるだけだ。一般に栽培される小蒜は、本來はこの三種のものが移植され  
に始まるので、それで今でも澤蒜なる名稱が遺つてゐるのだ。爾雅に『蒿は山蒜な  
り』とあつて、現に<sup>(一)</sup>京口に蒜山といふがあつて蒜を産する。それが此蒿山である。  
これは處處にあるもので、獨り江南のみにあるのではない。又、呂忱の字林に『葦  
は水中の蒜なり』とあるところを見ると、蒜はただ山に産するだけではなく、また  
水にも産するものだ。別に山慈姑、水仙花、老鴉蒜、石蒜などいふ類の根、葉いづ  
れも蒜に似たものもあるが、それは食へないもので、花も異ふ。いづれも草部中に  
記載してある。

## 氣味

【辛し、溫にして毒なし】

## 主治

【山蒜は、積塊、及び婦人の血癥を治す。苦醋に磨つて<sup>(二)</sup>傳ければ多く

效がある】〔蘇頌〕【澤蒜、石蒜、いづれも溫補し、氣を下し、水の源を滑する】〔藏器〕

葫 (別錄下品)

和名 にんにく  
學名 *Allium Scordopastum*, L. var. *viviparum*, Nakino.  
科名 ゆり科(百合科)

(一) 牧野云フ、にんにくハ昔ノおほびるデ、今日我邦ヲ蓋ネク哉エラレデキルモノデアル、然シ昔支那カラ渡シタモノデ固ヨリ我邦ニハ野生ハナイ。

釋名

大蒜(弘景) 壹菜

弘景曰く、今は一般に葫を大蒜といひ、蒜を小蒜といふ。その氣が類して相似たるものだからだ。時珍曰く、按ずるに、孫愐の唐韻に『張騫が西域に使したとき、始めて大蒜、葫荽こやんを持つて來た』とあるところから見ると、小蒜は中國に舊もとからあつたものだが、大蒜は胡地に産したものだから胡なる名で呼ばれたのだ。この二種の蒜はいづれも五葷に屬するものだから通じて葷と稱して差さ閤あひない。蒜の條に詳記してある。

集解

別錄に曰く、蒜は大蒜である。五月五日に獨子ひとりごのものを採つて藥に入れるが尤も佳し。

保昇曰く、葫は、(一) 梁州に産するものは大徑二寸ほどあつて最も美しく、少し辛い。(二) 涇陽のものは皮が赤くして甚だ辣からい。

(一) 梁州ハ石部特生藥石ノ註見ヨ。

(二) 涇陽ノ地名ニアリ。一ハ晉ノ縣、今尙ホソノ縣名ヲ稱シ、陝西省關中道ニ屬ス。一ハ漢縣、故城ハ今ノ甘肅省平涼縣ニ在リ。

(四) 木村(康)曰ク、にんにくノ(成分)ハ種種ノ糖、硫黄或ハ窒素ヲ含ム有機體、窒素及硫黄ヲ含ム鹽基及「イヌリン」ヲ含有ス。杉原氏ハ其鱗素ヨリ一種ノ配糖體ヲ分離シ、之ヲ「グルコミナル」ト命名セリ、本物質ハ酸又ハ「ミロジン」ノ加水分解ニヨリ、硫黄ヲ含有スル精油ヲ分離ス。小湊氏ニヨレバ、此精油ハ大蒜特有ノ臭氣ヲ有シ、恐ラクせいやうにんにくニ於ケル「ザアリルスルフィド」ニ類スル物質ナルベシト。加來氏ニヨレバ、朝鮮産大蒜(にんにく)ハ之ヲ水蒸氣蒸溜スルニ約〇・一九五(%)ノ精油ヲ得。本油ハ大蒜特有ノ臭

頭曰く、現に處處で畑に種<sup>う</sup>ゑる。一顆毎に六七瓣あつて、初めに一瓣を種<sup>う</sup>ゑ、それがその年の内に獨子蒔となり、翌年にはその本に復する。その花は中に實があつて、やはり蒔の瓣の形狀をなしてゐて極めて小さい。これもやはり種<sup>う</sup>ゑ得る。時珍曰く、大、小の二蒜はいづれも八月に種<sup>う</sup>ゑ、春は苗を食ひ、夏の初には蘖<sup>たけ</sup>を食ひ、五月には根を食ひ、秋期に種を收穫する。北方の地では一日も缺くべからざるものとなつてゐる。

### (四) 氣味

【辛し、溫にして毒あり。久しく食すれば人の目を損ずる】弘景曰く、性最も熏臭<sup>くわんしう</sup>で食へないものだ。俗間では一般にこれで作つた齏<sup>さい</sup>で鱠肉<sup>くわいにく</sup>を食ふが、性を損じ、命を伐<sup>そご</sup>ふことこれより甚しきはない。ただ生で食ふもので、煮るべきものではない。

恭曰く、この物で煮た羹、臠<sup>くわく</sup>は饌中<sup>せんちゆう</sup>の俊とされてゐる。しかるに陶氏は『煮るべきものでない』といつたが、これは陶氏にその經驗がなかつたからだらう。

藏器曰く、初めて食つたときは目に利あらぬものだが、多く食へば却て明になる。久しく食へば人の血を清<sup>きよ</sup>からしめ、毛髪を白からしめる。

氣ヲ有シ、ソノ主成  
 分ヲナス 硫化物ハ  
 $\text{CaH}_2\text{S}$ ,  $\text{CaHS}$ 、チ  
 主トシ、せいやうに  
 んにくト大差ナク、  
 タダ Semmlerノ見出  
 セル〇〇〇〇ハ見出  
 サズ。又〇〇〇〇ノ  
 少量ト、一種ノ光澤  
 アル斜狀長板狀ノ有  
 機酸(融點攝氏七六・  
 五―七七度、分子量  
 三五・五)ノ少量ヲ  
 得タリ。ソノ他「アル  
 ギニン」、「イイチ  
 ン」等ヲ含有ス。  
 (藥理)杉原氏ノ實驗  
 ニヨレバ、家兎ノ體  
 重一兩ニ付〇・六五  
 ノ「グリコミナル」  
 ナ與フルトキハ血壓  
 急激ニ下降シ、遂ニ  
 呼吸運動停止シテ死  
 ニ至ル。  
 (藥用)藥用及び食用  
 ニ供スルにんにく  
 ハ、鱗莖ヲ採掘シ乾

時珍曰く、久しく食へば肝を傷り、眼を損ずる。故に嵇康の養生論に「葷辛は口  
 を害ふ」といつて、この物を甚しとしてあり、現に北方人は蒜を嗜んで宿炕——オ  
 ンドルに寝ることなり——するところから盲瞽者が最も多い。陳氏が『多く食へば  
 目を明にする』といったのは別録と相異する。その理由が判らない。

震亨曰く、大蒜は火に属し、性は熱であつて喜く散じ、膈を快くし、善く肉を消  
 化する。暑期には一般に多く食ふ。しかし氣を傷るの禍は久しくして自ら現れるも  
 のだ。養生家はこれを忌む。肉を消化する功力も取立ていふほどのことはない。

頤曰く、多食すれば肺を傷め、脾を傷め、肝、膽を傷め、痰を生じ、火を助け、  
 神を昏くする。

思邈曰く、四月、八月に葫を食へば神を傷め、人をして喘悸せしめ、味覺が錯爽  
 する。多く生葫を食つて房事を行へば肝氣を傷り、顔に色が無くなる。生葫と青魚  
 鮓とを食合せれば腹内に瘡が生じ、腸中が腫れ、また疝瘕となり、黃疾を發する。  
 蜜と食合せれば人を殺す。凡そ一切の補藥を服するにはこれを食べつてはならぬ。

### 主 治

【五臓に歸し、癰腫、蠱瘕を散じ、風の邪を除き、毒氣を殺す】(別錄)



燥シタルモノニシテ  
 無靜藥トス。阿魏ノ  
 如ク惡臭ニヨリ反射  
 的ニ神經ニ作用スル  
 ナラン、腸内寄生蟲  
 驅除ニ效アリ、中脘、  
 黒田兩氏ハ酒精越幾  
 斯チ十二指腸蟲驅除  
 ニ用キテ效果ヲ認メ  
 タリ。(用量一回一〇  
 五) 硫黄含有スル精  
 油ハ細菌ニ對シ強キ  
 殺菌性ヲ有シ、ソノ  
 〇・五%水溶液ハ「チ  
 プス」菌ヲ五分間ニ  
 死滅セシム。又、人  
 にくノ搾リ汁チ「プ  
 イヨン」培養基中ニ  
 三%ノ割合ニ混シタ  
 ル場合ニハ、各種ノ  
 菌ニ對シ殆ンド完全  
 ニ發育ヲ制止セリト  
 云フ。其他本精油ノ  
 殺菌作用ニツイテ、  
 馬場、長濱、江口、志  
 田氏等ノ研究アリ。  
 新藥「アールス」(東

【氣を下し、穀物を消化し、(五) 肉を化す】(蘇恭)

【水惡痒氣を去り、風濕を除き、冷

氣を破り、げんへき 瘰癧を爛し、邪惡を伏して宣通、溫補し、さうぜん 瘡癰を療じ、鬼を殺し、痛を

去る】(藏器) 【脾胃を健にし、腎氣を治し、霍亂轉筋の腹痛を止め、邪祟を除き、溫

疫を解し、勞瘡冷風を療じ、風損冷痛、惡瘡、蛇蟲蠱毒、溪毒、沙蠱とむしつに傳けいづれ

も擣いて貼る。熱醋に浸して年を経たものが良し】(日華) 【溫水で擣爛して服すれば

中暑の醒めぬを治す。擣いて足心に貼れば鼻衄びせくの止まぬを止める。豆豉に和して丸

にして服すれば暴下血を治し、水道を通ずる】(宗奭) 【擣汁を飲めば吐血心痛を治

す。煮汁を飲めば角弓反張を治す。鮑魚と共に丸にすれば膈氣を治す。蛤粉かふんと共に

丸にすれば水腫を治す。黄丹と共に丸にすれば痢瘥、孕痢ようりを治す。乳香と共に丸に

すれば腹痛を治す。擣いて膏にして臍に敷けば、能く下焦に達して水を消し、大、

小便を利し、足心に貼れば能く熱を引いて下行し、泄瀉、暴痢、及び乾、濕霍亂を

治し、衄血を止め、こうちゅう 肛中に納れば能く幽門を通じて關格不通を治す】(時珍)

### 發明

宗奭曰く、葫は氣が極めて葷するが、臭肉中に置けば反つて能く臭を  
 掩ふ。凡そ暑毒に中つた場合は、二三瓣を嚼み爛して溫水で送下する。咽を下れば



京日進學社ハ本生  
藥ノ製劑ニシテ、一  
般結核性患者ニ效ア  
リト云フ。

（金）大觀ニ化肉ヲ瘴  
ニ作ル。

（金）錫脂ノ毒ハ腐敗  
ノ毒物。

反應があるものだ。但し冷水を飲むことを禁ずる。又、鼻衄の止まぬには、擣いて  
足心に貼り、衄が止んだときは直ちに拭ひ去る。

時珍曰く、葫蒜は太陰、陽明に入り、その氣は薰烈にして能く五臟に通じ、諸竅  
に達し、寒濕を去り、邪惡を辟け、癰腫を消し、癥積、肉食を化する。これがその  
功である。故に王禎はこれを稱揚して『味久しく變ぜず、以て生を資くべく、以て  
遠く致すべく、臭腐を化して神奇となし、鼎俎を調へるに醢、醬に代へ、これを旅塗  
に携へるときは炎風、瘴雨も加ふる能はず、（金）錫脂の毒を食へども害する能ず、夏月  
にこれを食へば暑氣を解す。北方にては肉麪を食ふに尤も無かるべからず。乃ち食  
經の上品、日用の多助なるものなり』といつてある。蓋しその辛は能く氣を散じ、熱  
は能く火を助け、肺を傷め、目を損じ、神を昏し、性を伐ふの害あることを知らぬ  
ので、いつとはなく知らず知らずの間にその禍を受けながら、しかもそれとは悟ら  
ぬのである。嘗てある婦人が、一晝夜衄血が止まず、さまざまの治療も奏效しな  
かつたとき、余（時珍）が蒜を足心に傅けさせると即時に血が止まつた。眞に奇方であ  
る。又、葉石林の避暑錄に『一人の下男が暑期に馬を驅つてゐて、突然地に仆れて

絶命せんとしたとき、同寮の王相が教へて、大蒜、及び道路上の熱土各一握を研り爛し、新汲水一錢で和して汁を取り、齒を決がいて灌ぎ込ませると、少頃して甦つた。それが世間に傳はつて、徐州の市中にはいつしかこの方を書いて版行するものもあり、これを用ゐたものはいづれも神仙救人の方だといつてゐた』とある。

藏器曰く、昔、ある瘡癰の患者が、夢にある人から毎日大蒜三顆を食へと教へられて、それを服して見ると初には瞑眩みんげんし、吐逆し、下部が火のやうに覺えるのであつたが、後にある人から、それは數片を取つて皮を合せて兩頭に截つて吞むのであつて、内灸と名けるものだと教へられて、果して大效を得た。

頤曰く、經に『葫は癰腫を散ず』とあるが、按ずるに、李絳兵部手集方には『毒瘡、腫毒で號叫して就眠し得ず、病の何なるかを判別しかねるには、獨頭蒜二顆を取つて擣き爛らし、麻油で和して厚く瘡上に傅け、乾けば易かへる。屢、用ゐて人を救つた。必ず神效のあるものだ。盧坦侍郎は肩上に瘡が生じ、心に連つて痛悶したが、これを用ゐて直ちに瘡えた。又、李僕射は腦癰を患うつて久しく瘡えなかつたが、盧侍郎がこの方を與へてやはり瘡えた』とある。又、葛洪の肘後方には『凡そ

(七) 大觀ニ應ヲ立ニ  
作ル。

(八) 江寧府ハ草部山  
草類白鮮ノ註ヲ見  
ヨ。

背腫には、獨顆蒜どくくわさんを取つて横に厚さ一分に截り、それを腫の頭上に置き、炷艾しゆかいを梧  
子大ほどでその蒜の上から百壯灸する。いつとはなく漸次に消する。多く灸するほ  
ど善し。灸するには太はなはだしく熱せしめてはならぬ。痛を覺える場合にはその蒜を取  
り起し、蒜が焦げたときは別の新しいものと換へる。皮、肉を損じてはならぬ。  
余(洪)は嘗て小腹下に一大腫が生じて苦んだが、その灸でやはり瘥えた。數々これ  
を他人に施して(七)應效せぬといふことはなかつた』とある。又、(八)江寧府かうねいふの紫極宮に  
は石にそのことを刻記して『但是れ發背、及び癰疽、惡瘡、腫核しゆかくの初起に異あるに  
は、皆之を灸す可し。壯數を計らず、惟だ痛む者は灸して痛まざるに至り、痛まざ  
る者は灸して痛むに至り、極つて止むを要す。疣贅いりざいの類はこれを灸すれば亦便ち癰  
と成つて自ら脱す。其の效神の如し。乃ち知る方書は空言無き者なることを。但だ  
人意を以て詳審すること能はず、則ち盡く應ずるを得ざるのみ』とある。  
時珍ししん曰く、按ずるに、李迅は蒜錢灸法を論じて『癰疽の發したときは、灸するが  
藥を用ゐるに勝る。熱毒の中鬲ちうかくに緣よつて上下通せぬものは、必ず毒氣が發洩するを  
得て、然る後に解し散ずるものだ。凡そ發病の初期一日以内ならば、大獨頭蒜を小

錢ほどの厚さに切つて頂上に貼り、三壯灸して一回易へ、大抵百壯を標準とする。一には瘡をして開大せざらしめ、二には内肉をして壞れざらしめ、三には瘡口を合し易からしめ、一舉にして三様の効果を得る。但し頭、及び項以上に發した瘡の場合には絶對にこの灸を用ゐてはならぬ。氣を上に引いて更に大なる禍を惹き起す虞がある』といひ、又、史源は蒜灸の功を記して『予の母が背の脾の部位に當つて痒を覺え、半寸ばかりの赤暈が生じ、黍ほどの白粒が生じたとき、灸を二十一壯するとその赤が随つて消えたが、二晩經つと長さ二寸ばかりの赤が流下した。すると家族の者はみな灸が悪かつたのだといひ、外科醫がそれを膏藥で貼護すると、一日に一暈を増し、二十二日にして横斜に約六七寸になり、堪へ難く痛楚するのであつた。たまたまある人の話に、この病のとき灸で癒えたといふことをある尼が聞いたので、予は早速その尼を訪ふて訊ねると、尼のいふには、當時病が劇しかつたので何事も覺えがないが、ただ范奉議坐守が八百餘壯灸してくれたので甦つたので、その使つた艾が籬に一箇ほどあつたとだけ聞いてゐるといふのであつた。そこで予は直ぐに取つて返し、一炷の艾を銀杏大にして十數壯灸して見ると、一向に痛みを覺

えなかつたが、四旁に灸すると赤い部分がみな痛んで、一壯毎に火が熾さるに随つて赤が縮入し、三十餘壯にして赤暈が全部收退した。蓋し灸が遅れたために、初發の部分の肉が已に壞れたから痛まなかつたので、灸が好肉の部分に當つた時だけ痛んだのであつた。ところが夜に入つて背の全部が熾熱し、瘡が山のやうに高くなつて熱したが、その夜は安眠し、明方に見ると一箇の甌を覆せたやうに高さ三四寸になり、上に百餘の小竅が出来て色が正黒になり、手當をするとそれで安かになつた。蓋し山のやうに高くなつたのは毒が外に出たため、多數の小竅は毒が聚らぬため、色の正黒なるは皮、肉が壞れたためであつて、艾火で毒を壞肉の裏から出さなかつたならば、五臓に内迫して危險に陥つたことと思はれる。凡庸醫師の傳貼藥で涼冷にし消散するといふやうな説はいかで信ぜられようぞ』とある。

#### 附方

舊十六、新三十一。

【背瘡の灸法】凡そ背上に腫硬、疼痛を覺えたならば、濕紙を貼つて瘡の頭の部分を確め、大蒜十顆、淡豉半合、乳香一錢を細研し、瘡頭の大小に随ひ、竹片を用ゐて圓く圍ふて藥を内に二分厚さに定填し、その上に艾を著けて灸する。痛むものは灸すれば痒くなり、痒きものは灸すれば痛くなる。百壯



(一)大觀ニ熱ニ作  
ル。

を標準とする。功力は蒜錢灸法と同じ。(外科精要) 【疔腫惡毒】門口灰一撮を細かに篩ひ、獨蒜、或は新蒜じんさんたう葉にその灰をつけて瘡口を擦り、瘡から自然に少し汗が出るを候つて再び擦る。少頃して消散する。發背癰腫でもやはりこれを擦るがよし。【五色丹毒】一定の色なきもの、及び足踝そくかくに發したものは、蒜を搗いて厚く傅け、乾けば易へる。(肘後方) 【關格脹滿】大、小便不通なるには、獨頭蒜を燒き、熟して皮を去り、綿に裹んで下部に納れる。氣が立ろに通ずる。(外臺祕要) 【乾濕霍亂】轉筋、大蒜を搗いて足心に塗れば立ろに癒える。(永類鈴方) 【水氣腫滿】大蒜、田螺、車前子等分を熬つて膏にし、臍中に攤貼たんでふする。水は排尿と共に下つて數日にして癒える。象山の人民が水腫を患つたとき、ある卜者からこれを用ゐることを傳受されて效があつた。(仇遠稗史) 【山嵐瘴氣さんらんじやうき】生、熟の大蒜各七片を共に食ふ。少頃して腹が鳴り、或は吐血し、或は大便を泄して癒える。(攝生妙用方) 【瘡疾寒熱】肘後では、獨頭蒜を炭上で燒き、方寸匕を酒で服す。○簡便では、桃仁半片を内關穴上に置き、獨蒜を搗き爛らして罌わいふて縛住すれば止まる。男は左、女は右。隣家の嫗はこれで他人に治療を施して屢、效を擧げた。○普濟方では、端午の日に取つた獨頭蒜を煨熟し、



礬紅等分を入れ、搗いて芡子大の丸にし、一丸づつを嚼んで白湯で飲下す。【寒瘧

冷痢】端午の日の獨頭蒜十箇、黃丹二錢を搗いて梧子大の丸にし、九丸づつを長流水で服するが甚だ妙である。【普濟方】

【泄瀉暴痢】大蒜を搗いて兩足心に貼る。また

臍中に貼るもよし。【千金方】

【下痢禁口】及び小兒の泄痢には、方はいづれも上に同じ。【腸毒下血】蒜連丸——獨蒜を煨いて搗き、黃連末を和して丸にし、日毎に米

湯で服す。【濟生方】

【暴下血痢】葫蒜五七箇を皮を去つて膏に研り、豆豉を入れて搗

いて梧子大の丸にし、五六十丸づつを米飲で服す。瘰癧えぬものなし。【寇宗奭本草衍義】

【鼻血の止まぬもの】藥を服しても反應なきには、蒜一箇を皮を去つて泥のやうに

研り、錢ほどの大いさ、豆一粒ほどの厚さの餅子にし、左鼻の出血には左足心に、

右鼻の出血には右足心に貼り、兩鼻俱に出血するには俱に貼る。立ろに瘥える。【簡

要濟衆方】

【血逆心痛】生蒜の搗汁二、三升を服すれば瘥える。【肘後】

【鬼疰腹痛】忍び難きには、獨頭蒜一箇と香墨を棗の大いさほどとを搗き、醬汁一合を和して頓

服する。【永類鈴方】

【心腹冷痛】法醋に二三年浸した蒜を數顆まで食ふ。その效神の如

きものだ。【李時珍綱目集簡方】

【夜啼腹痛】顔色青きは冷證である。大蒜一箇を煨き研

(一)大觀ニ一ニ作  
(二)大觀ニ千金ニ作  
此

つて日光で乾し、乳香五分と擣いて芥子<sup>かひしだい</sup>大の丸にし、七丸づつを乳汁で服す。<sup>（危氏得效方）</sup>【寒濕氣痛】端午の日に收取した獨蒜<sup>どくさん</sup>を麝粉<sup>しんぶん</sup>と共に擣いて塗る。<sup>（唐璣經驗方）</sup>【鬼毒風氣】獨頭蒜一箇<sup>うわ</sup>に雄黃、杏仁を和して研つて丸にし、空腹に三丸を飲下して靜坐する。少時して毛を下出して安らぐものだ。<sup>（孟詵食療本草）</sup>【狗咽氣塞】喘息<sup>ぜんそく</sup>して通ぜず、須臾に絶せんとするには、獨頭蒜二箇を兩頭を削り去り、左患には右鼻を塞ぎ、右患には左鼻を塞ぎ、口中に膿血の出るを候<sup>ま</sup>つ。立ろに效がある。<sup>（聖惠）</sup>【喉痺腫痛】大蒜で耳、鼻中を塞ぎ、一日に二回易へる。<sup>（肘後方）</sup>【魚骨硬咽】獨頭蒜で鼻中を塞げば自ら出る。<sup>（十便良方）</sup>【牙齒の疼痛】獨頭蒜を煨熟して切り、痛處を轉易しつゝ熨す。また蟲痛にも主效がある。<sup>（外臺祕要）</sup>【眉毛動搖】目<sup>め</sup>が交睫<sup>かうせつ</sup>し得ず、喚<sup>よ</sup>べども應<sup>こた</sup>へず、ただ飲食だけ十分なるものには、蒜三兩を杵き、その汁を酒で調へて飲めば癒える。<sup>（夏子益奇疾方）</sup>【腦瀉鼻淵】大蒜を切片して足心に貼り、效を取つて止める。<sup>（摘玄方）</sup>【頭風の苦痛】易簡方では、大蒜の研汁を鼻中に嚙<sup>す</sup>ふ。○聖濟錄では、大蒜七箇を皮を去り、先づ地を紅く焼いて、蒜を一箇づつその地上で磨つて膏子にし、殭蠶<sup>きやうさん</sup>一兩を頭、足を去つてその蒜上に置き、一夜碗で覆ふて氣の透らぬやうに

し、ただその蠶を取つて研末し、それを鼻中に嚙入して口中に水を含む。甚だ效がある。【小兒の驚風】總錄。方は上に同じ。【小兒の臍風】獨頭蒜を切片して臍上に置き、艾で灸する。口中に蒜の臭氣が出て止まる。(黎居士簡易方) 【小兒の氣淋】宋の寧宗皇帝がまだ郡王であつた時淋を病み、晝夜に凡そ三百回ほど厠に起ち、宮廷の御用醫は手當に窮し、ある者の推舉に依つて孫琳に治療を命ぜられた。琳は大蒜、淡豆豉、蒸餅の三物を搗いて丸にし、溫水で三十丸を進めて『今日中に三服を進めれば病は三分の一を減じ、明日も同様で三日で病は除ける』といつた。果してその通であつたので、報酬として千緡せんびんを賜つた。ある人がその説を問ふと、琳は『小兒に何の理由で淋があらう。ただそれは水道が利せぬだけだ。三物はいづれも能く通利するものだから奏效したのだ』といつた。(愛竹翁談叢) 【産後の中風】角弓反張し、言語を發せぬには、大蒜三十瓣を水三升で一升到煮取り、それを灌げば甦る。(婦傑子母秘錄) 【金瘡中風】角弓反張するには、蒜一升を心を去り、無灰酒四升で極端に煮爛し、滓を并せて服す。須臾にして汗が出て瘥える。(外臺秘要) 【婦人の陰腫】痒さには、蒜湯で洗ひ、效が現はれたならば止める。(永類鈴方) 【陰汗で痒さも

の』大蒜、淡豉を搗いて梧子大の丸にし、硃砂しゆしやを衣にかけ、空腹にして三十丸づつを燈心湯で服す。【小便淋瀝】或は尿があり、或は尿なきには、大蒜一箇を紙に包んで煨熟し、一夜露さらし、空心に新水で送下する（朱氏集驗方）。【小兒の白禿】ぼつぼつと圓くなるには、蒜を切つて日毎に揩する（祕錄）。【閉口椒毒へいこうせうどく】氣閉して絶せんとするには、蒜を煮て食ふ（張仲景方）。【射工溪毒】獨頭蒜を三分厚さに切つて上に貼り、上に灸して蒜氣を射入せしむれば瘥える（梅師方）。【蜈蚣むごの蝮くつの螫傷せきやう】獨頭蒜で摩れば止む（梅師）。【蛇、虺きの螫傷せきやう】孟詵（孟詵）曰く、卽時に蒜を嚼んで封じて六七回易へ、かくて蒜一升を皮を去つて乳二升で煮熟し、空心に頓服し、翌日また進め、外部には皮を去つた蒜一升を細に搗ういて小便一升で煮て三四沸し、それで損處を浸す。○梅師では、獨頭蒜、酸草を搗き、絞つて咬まれた患部に傳ける。【脚肚の轉筋】大蒜を足心に擦つて熱せしめれば平安になる。かくて冷水で一瓣を食ふ（梅生方）。【蟹を食つた中毒】乾蒜の煮汁を飲む（集驗方）。【蛇癰じやうがで顔面の光るもの】火で炙くやうに發熱するには、蒜汁一盃を飲む。蛇のやうな状態のものを吐出して平安になる（危氏方）。

# 五辛菜 (拾遺)

和名 いしんさい  
洋名 Five pungent vegetables.

## 集解

時珍曰く、五辛菜とは、元旦、立春の日に葱、蒜、韭、蓼、蒿芥の辛嫩なる菜を雜和して食ふものことで、迎新の意味を取つたものだ。これを五辛盤といふ。杜甫の詩に所謂『春日春盤細生菜』とあるそのものだ。

## 氣味

【辛し、溫にして毒なし】時珍曰く、熱病後に食へば多くは日を損ずる。

## 主治

【元日の朝これを食へば五臓の氣を助發する。常食すれば中を溫め、惡氣を去り、食物を消化し、氣を下す】(藏器)

## (一) 蕒 薹 (唐本草)

和名 うんだいあぶらな(新種)  
學名 Brassica sp.  
科名 十字科

## 釋名

寒菜 胡居士方) 胡菜 同上) 薹菜(埤雅) 薹芥(滄志) 油菜 綱目)

時珍曰く、この菜は蕒が起ち易く、その薹を採つて食ふもので、採れば必ず多く枝

が分れるところから蕒薹と名けたので、淮地方ではこれを蕒芥と謂ふ。即ち今の油

(一) 牧野云フ、本品ハ我邦テ從來カラ作ツテキルあぶらな即チなたれなトハ全ク別ノモノデアル、此レト混雜スルノテ今うんだいあぶらなノ新和名ヲ下シタ。

菜であつて、その子から油を搾れる。羌隴、氏胡ではその土地が甚だ寒いが、冬期に多くこの菜を種ゑて能く霜雪を經凌ぐ。その種は胡地から來たものだ。故に服虔の通俗文にはこれを胡菜といひ、胡洽居士の百病方には寒菜といつてある。いづ

(一) 雲臺成、未詳。



〔臺 葵〕

れも右の意味を取つたものだ。或は、塞外に雲臺成といふ地名があつて、この菜は始めその地から種が來たのでそれでかく名けたのだといふが、やはりそれでも通じる。

〔集 解〕

恭曰く、別錄に『葵

臺とは一般人の噉ふ菜のことだ』とある。

宗奭曰く、葵臺は甚だ香しくはない。冬を経て根が枯死せぬ、臺を辟けるものだ。

諸菜中ではやはり甚だ佳いものではない。

時珍曰く、葵臺は方藥に多く用ゐてあるが、諸家の註にも明な記載がなく、現に



一般人も何の菜を指すかを識しるものがないが、予（時珍）の調査考究したところでは今の油菜そのものだ。九月、十月に種を下し、生える葉は形も色も微かたじけなくに白菜に似たもので、冬、春に薹の心を探つて茹じゆにする。三月には老いて食へなくなり、黄色で小さい四瓣の芥花のやうな花を開き、莢さやを結ぶ。その子を取收めるのだが、やはり芥子のやうで灰赤色だ。炒つて油を搾る。その油は黄色で、燈火に點けると甚だ明だが、食つては麻油に及ばない。近來は一般にその油が有利なところから、栽培も廣く行はれてゐる。

### 莖葉

#### 氣味

【辛し、溫にして毒なし】大明曰く、涼なり。別錄に曰く、春期にこれを食へば能く膝の痼疾を發する。洗つ曰く、先に腰脚を患わづらつたものは多く食つてはならぬ。これを食へばますます劇しくなる。又、陽氣を損じ、瘡を發する。また口齒の病あるもの、胡臭の人は食つてはならぬ。又、能く腹中の諸蟲を生ずる。道家では特にこれを忌んで五葷の一としてある。

#### 主治

【風遊丹腫、乳癰（唐本草）】癰癤結血を破る（門賈）。【産後の血風、及び瘀血を治す（日華）】。【煮て食へば腰脚痺を治す。葉を搗いて婦人の吹奶ふいたに傳ける（藏）】。

【療瘡】豌豆瘡を治し、血を散じ、腫を消し、蓬砂を伏す。（時珍）

【發明】

藏器曰く、芸藁は血を破る。故に産婦は食ふがよし。

馬志曰く、現に俗間の方に、病人も芸藁は喫へるといつてある。それは血病に宜いのだ。

内江縣、北周ニ  
中江縣ヲ置キ、隋ニ  
内江縣ニ改ム。今ノ  
四川省内江縣ノ西ニ  
支里ニ故城在リ。

思邈曰く、貞觀七年三月、予は内江縣にゐて、酒を飲む機會が多かつたが、夜に入つて四體、骨肉が疼痛し、明方には頭痛して額角に彈丸ほどの赤腫が生じて痛み、正午頃には全體が腫れて日が開けなくなり、日を経るに隨つて殆んど危険な状態に陥つた。その時予は、本草に「芸藁は風遊丹腫を治す」とあるに氣がついて、葉を取つて搗いて傳けると、手に隨つて消き、その效驗神の如くであつた。また搗汁を服してもよし。

【附方】

新八。

【赤火丹毒】方は前項を見よ。【天火熱瘡】初期は癰に似て漸次に水泡のやうになり、火燒瘡に似て赤色のものは、急速に能く人を殺す。芸藁葉の

搗汁で大黃、芒消、生鐵衣等分を調へて塗る。（近效方）【風熱腫毒】芸藁の苗、葉、根、蔓菁根各三兩を末にし、雞子清で和して貼る。直ちに消く。蔓菁がなければ

商陸根しょうりくこんを代用する。甚だ有效だ。(近效方) 【手、足の瘰癧】この瘰はよく手、足、肩、

背に生じ、るるるる瘰癧とした赤豆のやうで、剥げば汁が出る。雲臺葉の煮汁一升を服し、

并に乾熟菜を數頓食ひ、鹽、醬を少し與へる。冬期には子を用ゐ、研つて水で服す。

(千金方) 【癰に似た異狀な疔】癰のやうで小さく、異狀のもので、小豆汁のやうな膿

を出し、今日出し去れば明日滿つるものである。雲臺を擣き熟して布袋に盛り、熱

灰中で煨熟わいじやくして更互に熨す。二三回以内でよし。葉のないときは乾いたものを用ゐ

る。(千金) 【豌豆斑瘡】雲臺葉を湯に煎じて洗ふ。(外臺秘要) 【血痢腹痛】晝夜止まぬ

には、雲臺葉の搗汁二合に蜜一合を入れて溫服する。(聖惠方) 【腸風下血】上に同じ。

子 氣味 【辛し、溫にして毒なし】 主治 【夢中洩精むちうせつせい、鬼と交接する

もの】(思慮) 【油を取つて頭に傅ければ髪を長く黒くする】(藏器) 【帶血やを行り、冷

氣を破り、腫を消し、結を散じ、難産、産後の心腹諸疾、赤丹熱腫、金瘡、血痔を

治す】(時珍)

發明 時珍曰く、雲臺葉は子と葉と同功であつて、その味は辛、氣は溫で、

能く溫め能く散ずる。その功用は血滯を行り、結氣を破るに特長があるところから、

(五)木村(康)曰ク、  
本邦産あぶらな種子  
ノ成分ハ「フイトス  
リン」(フイチン)或  
ハ含硫黄含有成分チ  
含ム、ソノ組成分  
(%)ハ水分三一  
、脂肪三三・四三、  
含窒素物一八・二  
二・三、無窒素物  
ニ組織糖三六・五

四、灰分三・五—五、  
 内無水磷酸四六％、  
 葉ハ枸橼酸及ビ「メ  
 コン」酸、「チトベクチ  
 タン」酸、「チトベクチ  
 ン」酸、「アミラーゼ」  
 ノ發酵素原體ヲ有ス  
 而シテソノ灰分一匙  
 中銅八・三毫ヲ存ス。  
 あぶらなノ組成（％）  
 ハ食用植物誌ニヨレ  
 バ水分九五・二八、蛋  
 白質二・一五、脂肪  
 〇・一六、無窒素物  
 〇・二一、木纖維一・  
 一六、灰分一・七。

古方では腫を消し、結を散じ、産後一切の心腹氣血痛、諸種の遊風丹毒、熱腫、瘡痔を治する諸藥にみなこれを用ゐてある。經水が行つて後に四物湯にこれを加へて服すれば、能く産を斷つといふ。又、小兒の驚風を治す。兒の頂顙ちやうしんに貼れば氣を引いて上に出るのである。婦人方の産難を治する歌に『黃金花の結ぶ粟米の實、細研して酒で下す十五粒。靈丹の效妙神の如し、難産の時能く急を救ふ』とある。

### 附方

新十二

【藁朮散】

産後惡露が下らずして、血結衝心しやうしんし、刺痛を伴ひ、

冒寒し、冷えた處を踏めばその血が必ず心腹の間に往來し、忍び難く刺痛するを治す。これを血母といふ。并に産後心腹の諸疾を治す。産後三日間は缺くべからざるものである。藁朮子を炒り、當歸、桂心けいしん、赤芍藥と等分を用ゐ、二錢づつを酒で服す。惡物を趕かひ下す（楊氏產乳）

【産後の血運】藁朮子、生地黃等分を末にし、三錢づつを薑七片、酒、水各半盞、童尿半盞で七分に煎じて溫服すれば甦る（溫隱居海上

方）【血を補し、氣を破る】追氣丸——婦人の血刺、腹痛の忍び難きものを治す。や

はり常服するがよし。血虛を補し、氣塊を破り、甚だ效がある。藁朮子を微すこし炒り、桂心と各一兩、高良薑半兩と末にし、醋糊で梧子大の丸にし、五丸づつを淡醋湯たんさくたうで

(六) 四眼ノ人ハ方相氏ナ云フ、發病ヲ逐フ神、又葬禮ニ與カレ神。

(七) 牧野云フ、たう豆ハ唐藥ノ意ヲ背支離カ、始メテ入ッテ藥部ニ増シテ時ニ

服す。(沈存中靈苑方) 【腸風臟毒】下血するには、藁蘘子を生で用ゐ、甘草を炙き、末に

して二錢づつを水で煎じて服す。(普濟方) 【頭風の痛むもの】藁蘘子一分、大黃三分

を末にして鼻に嚙すふ。 【風熱牙痛】藁蘘子、白芥子、角茴香かくふうきやう等分を末にし、左の痛

には右鼻に、右には左鼻に嚙すふ。(聖惠) 【小兒の天釣てんてう】藁蘘子、生烏頭しやうとうづを皮、尖を去

り、各二錢を末にし、一錢づつを水で調へて頂上に塗る。これを塗頂散と名ける。

(聖濟總錄) 【風瘡の癒えぬもの】陳ちんい菜子油と穿山甲せんざんかふまつ末とを共に熬つて膏にし、それ

を塗れば直ちに癒える。(攝生衆妙方) 【熱癰腫毒】藁蘘子、狗頭骨等分を末にし、醋で

和して傳ける。(千金方) 【傷損の接骨】藁蘘子一兩、小黃米せうわうまいを炒つて二合、龍骨少量

を末にし、醋で調へて膏にし、紙上に攤のして貼る。(乾坤秘鑑) 【湯火傷灼】菜子油で

蚯蚓尿きゆうりんいを調へて搽る。(楊起簡便單方) 【蜈蚣ごこうの螫傷】菜子油を地上に傾け注いで擦り、

その地上の油を搽ぬるが好し。(四眼の人に見られてはならぬ。(陸氏積德堂方)

## 菰 (別錄上品)

和名 たうた、はくた、  
學名 *Bruscia jekinusis*, Imper.  
科名 十字科



## 釋名

## 白菜

時珍曰く、按ずるに、陸佃の埤雅に『菘は性冬を凌いで晚く潮み、四時常に見え、松の操がある。故に菘といつたのだ』とある。現に俗間ではこれを白菜といふ。その色が青白だ。

## 集解

弘景曰く、菘に數種あるが、やはりこれは一類のもので、ただその美なると美ならざるとに因つて品さだめしただけだ。菜類中で最も常食とされるものだ。

宗奭曰く、菘は、葉が燕薺のやうで緑色がやや淡く、その味は微し苦く、葉が嫩くしてやや潤い。

頤曰く、揚州の一種の菘は、葉が圓くして大きく、或は薺のやうで、啖つても渣がなく、他の土地のものよりも遙に勝れてゐる。牛肚菘ではないかと思ふ。

時珍曰く、菘とは現に一般に白菜と呼ぶそのもので、二種ある。一種は莖が圓く厚くして微し青く、一種は莖が扁く薄くして白い。その葉はいづれも淡青白色だ。

燕趙、遼陽、揚州で栽培するものは最も肥大で厚く、一本の重量十餘斤のものがあつた。南方で栽培する菘は畦の内で冬を過すが、北方で栽培するものは多くは窖

下シタ和名デアル、又しろな、いんげんなノ名モアル、今日我邦ニ入りテ廣ク栽培シテキルモノハはくさい(白菜)デ、普通其葉包擁シ大ナル球ヲナスノデ、之レヲ結球白菜ト呼バレテキル、是レハ人工テ園藝的ニ改良シタモノデアル。

(一)揚州ハ草部薺草類通草ノ註ヲ見ヨ。

(二)燕趙ハ今ノ河北、山西兩省地方。



に入れる。(四) 燕京えんきやうの農家ではまた馬糞を窖中に入れて風や日光に當らぬやうに壅おほふて培つちかひふが、成長して出る苗、葉はみな嫩黄色になり、脆く美味で滓がない。これは



〔菰 白〕

適しないものだ。

〔正 誤〕

恭こう曰く、菰には三種あつて、牛肚菰といふは葉が最も大きく厚くして味が甘い。紫菰といふは葉が薄く細くして味が少し苦い。白菰ばんこといふは蔓菁まんせいに似たものだ。菰菜は北方の地には生じない。ある人が子を持つて往つて北方で種うゑた

黄芽菜と呼んで貴族、富豪が珍重する食品だ。蓋しこれも韭黄きうわうを作る方法に倣つたものである。菰の子は菰菜の子のやうで灰黒色だ。八月以後にこれを種こゑ、二月に芥花のやうな四瓣の黄花を開き、三月にやはり芥のやうな角さやを結むすぶ。この菜は類るいにして食たふが就中良く、蒸し、晒すには

が、初一年には半は蕪菁がせいになり、二年目には菰この種は全然絶えて了つた。蕪菁を南方へ持つて來て種ゑても全然變つて了ふ。かやうに土地そのものに適不適がある。

頤曰く、菰は南、北いづれにもある。蔓菁と相類するもので、梗が長く、葉の光らないものを蕪菁といひ、梗が短く、葉が潤くうる厚くして肥腴ひうなるものを菰といふ。舊説に、北方の地には菰がないといふが、現にモ京洛で種ゑてゐる菰は全然南方で種ゑるものに類し、ただ肥厚な點がやや及ばないだけである。

機曰く、蔓菁と菰菜とは恐らく一種のもので、ただ南方の地のものは葉が高くして大きく、菰といひ、秋、冬にもある。北方の地のものは葉が短くして小さく、蔓菁といひ、春、夏にある。

時珍曰く、白菰とは白菜のこと、牛肚菰とは最も肥大なもののこと、紫菰とは蘆菔ろふのことで、紫色の花が開くから紫菰といつたのだ。蘇恭が、白菰は蔓菁に似たものだといつたのは誤で、根も葉も同じくない、白菰は根が堅く小さくして食へないものだ。又、南、北で變種するといつてゐるが、蓋し蔓菁と紫菰しすとを指して言つたのだらうけれども、紫菰は根は蔓菁に似てゐるが葉は同じくなく、種類もやはり別

(五) 京洛ハ今ノ河南  
省北部、黄河以南、  
開封、洛陽兩地間ノ  
地ヲ指ス。

だ。又、北方の地には菰がないといふが、唐より以前はさうであつたかも知れぬが、近來は白菰、紫菰は南、北を通じてある。ただ南方の地では蔓菁を種ゑず<sup>う</sup>にこれを種ゑるが、やはり生じ易いからである。蘇頌は漫然、南、北いづれもよしと斷言し、汪機は當てもない臆斷の辨をなしてゐるが、いづれも謬誤<sup>びうご</sup>だ。此に悉く正して置く。

莖葉 氣味 「甘く、溫にして毒なし」大明曰く、涼にして微毒あり。多く食へば皮膚の風癢<sup>ふうさう</sup>痒を發す。誥曰く、風冷を發する。内虛の人は食つてはならない。熱ある人が食つては一向病を發せぬところを見ると、性の冷なることが首肯<sup>うなづ</sup>される。本草に性溫なりとしてあるはその意味が解らない。弘景曰く、性和にして人を利するが、多食すれば少し冷のやうである。張仲景は『藥中に甘草<sup>かんさう</sup>があつても、菰を食つては病が除けなくする』といつた。頤曰く、小毒あり。多く食つてはならぬ。多く食つても生薑を食へば解す。瑞曰く、夏至<sup>げし</sup>の前に食へば氣を發し、疾を動ずる。足疾あるものはこれを忌む。時珍曰く、氣虛、胃冷の人が多く食へば惡心<sup>なげん</sup>し、吐沫する。氣壯の人に適するものだ。

### 主治

「腸、胃を通利し、胸中の煩を除き、酒渴を解す」(別錄) 【食物を消化

し、氣を下し、瘴氣を治し、熱氣嗽を止める。冬の汁が就中佳し〔蕭炳〕〔中を和し、大、小便を利す〕〔寧風〕

附方

舊一、新二。

〔小兒の赤遊〕上下に行つて心に至れば死亡する。菘菜を搗いて傅ければ止まる〔張傑子母秘錄〕〔漆毒の瘡〕白菘菜を搗き爛らして塗る。〔飛絲の目に入りたる時〕白菜を揉み爛らして帛に包み、汁を二三點目に滴し入れれば出る〔普濟方〕

子「氣味」

「甘し、平にして毒なし」

「主治」

「油にして頭に塗れば髪を長

くする。刀劍に塗れば縮びぬ」縮の音は秀〔シユウ〕である。〔弘景〕

附方

舊一。

〔酒酔の醒めぬもの〕菘菜子二合を細研し、井華水一盞で調へて二回に服す。〔聖惠方〕

芥

〔別錄上品〕

和名 からし、ながらし  
學名 Brassica ceruua, Hemsl. (Sinapis ceruua, Thunb.)  
科名 十字科

釋名

時珍曰く、按ずるに、王安石の字説に『芥とは界の意味で、汗を發し、

〔一〕牧野云フ、我邦  
善ク栽培シテキテ其  
種子ヲ辛味料ニ使用  
シ、又葉ヲ蔬トスル  
故ニながらし〔菜芥  
ノ意〕ノ名ガアル。

氣を散じ、我を界するものの意味だ』とあり、王禎の農書に『その氣味辛烈にして菜中の介然たるもので、食へば剛介かうけの象がある。故に文字は介に従ふのだ』とある。

〔集解〕

弘景こうけい曰く、芥は菘そうに似て毛があり、味は辣からい。生でも食ひ、また茹にもなる。その子は冬瓜を貯藏するによし。又、蕒わう——音は郎らう（ワウ）——といふものもあつて、茹にすると甚だ辣い。



〔芥〕

恭こう曰く、芥には三種あつて、葉が大きく子の麤こなるものは、葉をば食ひ子をば薬に入れて用ゐる。葉が小さく子の細いものは、葉は食はず、ただ薹たいにするだけだ。

又、白芥子といふがあつて、粗大

で色が白く、白梁米はくりょうまいのやうで甚だ辛美だ。これは西戎から来る。

頤い曰く、芥は處處にある。青芥といふは菘そうに似て毛があり、味は極めて辣い。紫芥は薹、葉が純紫で美しく、薹にして最も美味だ。白芥といふは本條の記載があ

る。その他、南芥、旋芥、花芥、石芥の類があつて、いづれも菜茹さいじよとして美味なものだが、悉く録載するわけに行かぬ。概して南方の地には芥が多く、言ひ傳ひに、嶺南には蕪菁がない。ある人が種を携へて彼の地に種ふたが、みな芥に變化して丁つたといふ。地氣の關係でさうなるのだ。

時珍曰く、芥に數種あつて、青芥はまた刺芥ともいひ、白菰に似て柔毛がある。

大芥といふはまた皺葉芥そうたふかいともいひ、葉が大きくして皺紋があり、色が尤も深緑で、味が更に辛辣だ。この二芥は藥用に適する。馬芥といふは葉が青芥のやうだ。花芥といふは葉に刻缺が多くして蘿蔔英らふたのやうだ。紫芥といふは莖、葉みな紫で蘇のやうだ。石芥といふは低く小さいものである。いづれも八九月に種を下し、冬期に食ふものを俗に臘菜と呼び、春期に食ふものを俗に春菜と呼び、四月に食ふものを夏芥といひ、芥心の嫩蘗さかだいを芥藍といひ、淪あでて食へば脆やわで美味だ。花は三月に開き、黄色の四出で、一二寸の莢さやを結ぶ。子の大いさは蘇子ほどで色は紫、味は辛い。研末して泡つけて芥醬にし、それを肉食の脍たきけにすると辛香愛すべきものである。劉恂の嶺南異物志に『南方の地の芥は高さ五六尺、子の大いさ雞子ほどある』とあるが、



これはまた芥としては異状なものだ。

## 莖葉

### 氣味

【辛し、温にして毒なし】詵曰く、煮て食へば氣と風とを動じ、生で食へば丹石を發する。多食してはならぬ。葉の大なるものが良く、細くして毛あるものは人を害す。寧原曰く、瘡瘍、痔疾、便血あるものはこれを思む。思遼曰く、兎肉と共に食へば惡邪の病となる。鯽魚と共に食へば水腫を發する。

### 主治

【鼻に歸し、腎の經の邪氣を除き、九竅を利し、耳、目を明にし、中を安じ、久しく食すれば中を温める】〔別錄〕【欬嗽上氣を止め、冷氣を除く】〔日華〕【欬逆に主效があり、氣を下し、頭面風を去る】〔孟詵〕【肺を通じ、痰を豁し、膈を利し、胃を開く】〔時珍〕

### 發明

時珍曰く、芥は性辛熱にして散ずる。故に能く肺を通じ、胃を開き、氣を利し、痰を豁するが、久しく食つては温が積つて熱となり、辛の散が甚だ盛なために人の眞元を消耗し、肝木に病を受け、眼目を昏くし、瘡瘍を發するものだ。しるに別錄には、この物を能く耳、目を明にするといつてあるが、それは暫時の快を知つて積久の害を知らぬのだ。素問に「辛は氣に走る。氣病には多く辛を食つ

てはならぬ。多く食へば肉胝が生じて唇が褰する』とあるはこの物の類を指したものである。陸佃は『梅を望んで津を生じ、芥を食つて涙を墮すは五液の外より至るものだ。慕つて涎垂れ、媿て汗出るは五液の内より生ずるものだ』といつてある。

## 附方

新四。

【牙齦の腫爛】臭水の出るには、芥菜稈を焼いて性を存して研末し、頻りに傅ければ癒える。【飛絲の目に入つたるとき】青菜汁を點ける。神の如き效がある。(補玄方) 【漆瘡の搔痒】芥菜の煎湯で洗ふ。(千金方) 【痔瘡の腫痛】芥菜を搗いて餅にし、頻りにそれに坐る。(談禁翁經效方) 子 (一) 氣味 【辛し、熱にして毒なし】時珍曰く、多く食へば目を昏くし、火を動じ、氣を泄し、精を傷ふ。

## 主治

【鼻に歸し、一切の邪惡、疰氣、喉痺を去る】(弘景) 【疰氣の部位不規則に發するもの、及び射工の毒には、丸にして服し、或は搗いて末にして醋で和して塗る。手に随つて效驗がある】(蘇恭) 【風毒腫、及び麻痺を治するには、醋で研つて傅ける。撲損瘀血、腰痛、腎冷には、生薑と和して研つて塗貼する。又、心痛を治するには酒で調へて服す】(日華) 【研末して醬にして食へば、香美にして五臟を通利す

(二) 木村(康)曰く、からしノ種子ハ配糖體「ジニグリン」及加水分解酵素「ミロシン」ヲ含有ス、即チ種子ノ粉末ニ水ヲ加ヘテ放置スレバ「ジニグリン」ハ「ミロシン」ノ作用ニヨリ加水分解シテ揮發芥子油約一%ヲ生ズ、又脂肪約三七%ヲ含有シ、主トシテ「エルカ」酸及ビ「アラビン」酸等ノ「グリセリド」ニヨリナル。からしノ蔬菜トシテノ組成ハ食用植物志ニヨレバ、

産地	水分	蛋白質	脂肪	無窒素物	灰分
内地	83.30	2.87	—	4.40	2.04
臺灣	90.655	2.028	0.309	6.232	0.776

(應用)芥子(局方)ハ  
ソノ細末ニ微温湯  
(攝氏五十度内外)ヲ  
加ヘテ所謂芥子泥ト  
ナシ、皮膚ニ塗布シ  
テ引赤藥トス。リウ  
マチス、神經痛ノ局  
處ニ貼用シテ反對的

る【孟詵】「研末して水で調へて頂顙に塗れば衄血を止める」(吳瑞)「中を温め、寒を散じ。痰を豁し、瘀を利し、胃寒吐食、肺寒欬嗽、風冷氣痛、口噤唇緊を治し、癰腫、瘀血を消散する」(時珍)

### 發明

時珍曰く、芥子の功は菜と同じ。その味は辛で氣は散ずるものだから、能く九竅を利し、經絡を通じ、口噤、耳聾、鼻衄の證を治し、瘀血、癰腫、痛痺の邪を治する。その性は熱にして中を温めるものだから、又よく氣を利し、痰を豁し、嗽を治し、吐を止め、心腹諸痛に主效がある。白芥子は辛烈が更に甚しいもので、治病に就中良し。後の本條に記載してある。

### 附方

舊五、新十八。

【感寒で汗なきもの】水で芥子末を調へて臍中を填て、著衣の上から熱物で熨す。汗を取り出して妙である(楊起簡便單方)「身體の麻木」芥菜子末を醋で調へて塗る(濟生秘覽)「中風口噤」舌本の縮むには、芥菜子一升を研り、醋二升に入れて一升到煎じ、額顙下に傅ければ效がある(聖惠方)「小兒の唇緊」馬芥子の搗汁を曝して濃くし、摺り破つて頻りに塗る(世氏要方)「喉痺腫痛」芥子末を水で和して喉下に傅け、乾けば易へる。○又、辣芥子を研末して醋で調へ、汁を

ニ疹癩ヲ輕減セシムル效アリ。芥子ノ粉末ハ貯藏ニヨリ容易ニソノ效力ヲ失フヲ以テ、壓搾シテ脫脂セル粉末ヲ真トス。又芥子ハ揮發芥子油ノ製造原料トス、揮發芥子油ハ卒倒、假死等ニ刺戟藥トシテ其少量ヲ紙片ニ浸シ吸入セシム。其他芥子、芥子漬、「カレー」粉、其他食用嗜好品トシテ重要ナリ。食慾亢進症ニ防腐ノ效ヲ有ス、又葉ハ蔬菜トシテ實用サレ。

取つて喉内に點入し、喉内の鳴るを待つて、陳麻骨ちんまこつを烟に燒いて吸入すれば立ろに癒える。(いづれも聖惠方) 【突然の聾閉】芥子末を人乳汁で和し、綿で裹んで塞ぐ。(外臺秘要) 【雀目で見えぬもの】眞紫芥菜子を黒く炒つて末にし、羊肝一頭分を八服に分け、一服毎に芥末三錢を肝に捻つて箒簪じんだくで裏定して煮熟し、冷えてから食つて汁で送下する。(聖濟總錄) 【目中の翳膜】芥子一粒を手で軽く按んで眼中に入れ、少頃して井華水、雞子清で洗ふ。(總錄) 【眉毛の生えぬもの】芥菜子、半夏はんげ等分を末にし、生薑の自然汁で調へて搽る。數回にして生える。(孫氏集效方) 【鬼疰勞氣きとらうき】芥子三升を研末して絹袋に盛り、酒三斗の中に七日間入れ、一日三回溫服する。(廣濟方) 【熱痰煩運】方は白芥の條にある。 【霍亂吐瀉】芥子を細に擣き、水で和して臍上に傅ける。(聖濟總錄) 【反胃吐食はんゐ どりしやく】芥子末を、一日三回、方寸匕ほうすんひつづ酒で服す。(千金方) 【上氣嘔吐】芥子末を蜜で梧子大の丸にし、井華水せいけくわすゐで寅の刻に七丸を服し、申の刻に再服する。(千金方) 【臍下の絞痛】方は上に同じ。 【腰、脊の脹痛】芥子末を酒で調へて貼れば立ろに效がある。(摘玄方) 【走注風毒】痛むには、小芥子末を雞子白で和して塗る。(聖惠) 【一切の癰腫ようしゆ】猪膽汁で芥子末を和し、一日三回貼る。猪脂でもよし。(千金方)

三 大觀ニ方ニ作ル。

（一）大觀ニ酒上ニ苦字アリ。

（二）牧野ハフ、宋ダ  
我邦ニ見ザル一種デ  
此ニしろがらしトシ  
マノハ其種名ニ葉キ  
テノ名デ西洋デモ俗  
ニ *White Mustard*  
ト稱スヤ、本草綱目  
醫家ニハ之レヲ芥ノ  
異品トミテ、之レニ  
しろがらしノ名ヲ署

金翼）「癰腫熱毒」家芥子末と柏葉とを搗いて塗る。瘰癧えぬものなし。大いに效驗がある。山芥であれば更に妙である。（千金翼）「熱毒瘰癧」小芥子末を醋で和して貼り、消くを見て止める。肉を損ずる恐があるからだ。（肘後）「五種の瘰癧疾」芥子末を水と蜜とで和して傅け、乾けば易へる（廣濟方）「射工の毒に中つたとき」瘡あるには、芥子末を（肘）酒で和して厚く塗る。半日で痛が止まる。（千金方）「婦人の經閉」行らぬこと一年に至り、臍腹が痛み、腰腿が沈重し、寒熱往來するには、芥子二兩を末にし、食前に二錢づつを熱酒で服す。（仁存方）「陰證傷寒」腹痛し、厥逆するには、芥菜子を研末し、水で調へて臍上に貼る。（生生編）

## （一）白 芥 （宋開寶附）

和名 しろがらし、きくばがらし  
學名 *Brassica alba*, Boiss. (*Sinapis alba*, L.)  
科名 十字科

### 釋 名

胡芥（蜀本草） 蜀芥 時珍曰く、その種は（二）胡、戎の地から來たもの

で、蜀で盛に栽培するからかく名けたのだ。

### 集 解

恭曰く、白芥子は粗大で色白く、白粱米ほどのもので、甚だ辛美であ



る。戎地方から来るものだ。  
藏器曰く、白芥は太原、河東に産する。葉は芥のやうで白く、茹にして食へば甚だ美味だ。

シテアレドモ、之レヲ芥ノ變<sup>リ</sup>品ト觀ルハ穩カデナイ、從テしるからしノ名ハ私ノ言フしるがらしトハ種類カ違フ、白芥ハ歐洲、北亞弗利加、亞細亞ノ產ヲ、其葉ハ羽狀ニ分裂シ、果實ハ毛ヲ有シ且著シイ嘴ガアル。

(一) 胡、戎ハ蒙古、甘肅、西鄙以西、青海、西藏、新疆省等西北番地方ヲ稱ス。蜀ハ今ノ四川省ノ地。太原、河東ハ今ノ山西省南北部ヲ指ス。



〔芥 白〕

保昇曰く、胡芥は近道にもある。葉は大きく、子は白く且つ粗く、藥用、及び喫ふに最も佳いものだが、しかし一般にはまだ多く用ゐられてゐない。

時珍曰く、白芥は何處にでも種<sup>タネ</sup>えられるものだが、ただ一般にその栽培法を知るものが少いのだ。八九月に種を下せば冬生えて食へる。春深くなると莖の高さ二三尺になり、そ

の葉、花には<sup>ア</sup>が<sup>ア</sup>あつて花芥のやうだ。葉は青白色で、莖は起ち易いが中が空で性が脆く、狂風、大雪を最も畏れるから十分にそれを保護してやらねばならぬ。保護さへよければ折損しない。三月に香の郁<sup>かみ</sup>しい黄色の花を開き、芥の角<sup>そや</sup>のやうな角を結び、



その子は梁米ほどの大いさで黄白色だ。又、莖が太く中が實して尤も高い一種がつて、その子もやはり大きい。この菜は芥類には相違ないが、全然特殊な別種である。しかし薬用としては芥子に勝る。

莖葉

氣味

【辛し、溫にして毒なし】

時珍曰く、肘後方に『熱病の人は

胡芥こかいを食つてはならぬ』とあるはその性が暖だからだ。

主治

【冷氣（臟器）】

【五臟を安ずる。功は芥と同じ（日華）】

子氣味

【辛し、溫にして毒なし】

主治

【汗を發し、胸膈の痰冷、上

氣の面目黃赤に主效がある。又、醋に研つて射工の毒に傳ける（別錄）。【惡氣（さんし）、通尸、飛尸、及び暴風毒腫が四肢に流れて疼痛するを禦ぐ（弘景）。【烟に燒き、及び服して邪魅（ちりぞ）を辟ける（日華）。藏器曰く、鎮宅の方に入れて用ゐる。【欬嗽、胸脇支滿。上氣で唾多きものには、七粒づつを溫酒で吞下す（思邈）。【氣を利し、痰を豁（くわつ）し、寒を除き、中を暖め、腫を散じ、痛を止め、喘嗽（ぜんそう）、反胃（はんのみ）、痺木、脚氣、筋骨腰節の諸痛を治す（時珍）】

發明

震亨曰く、痰の脇下、及び皮裏膜外に在るは、白芥子以外では能く達

せぬものだ。古方の控涎丹（こうぜんたん）に白芥子を用ゐてあるは正にこの意味だ。

時珍曰く、白芥子の辛は能く肺に入り、温は能く發散する。故に氣を利し、痰を豁し、中を温め、胃を開き、痛を散じ、腫を消し、惡を辟ける功力がある。按ずるに、韓愈の醫通に「凡そ老人で痰氣喘嗽に苦しみ、脇滿して食に懶（ろう）きは、妄（ふ）に燥利の藥を投してはならぬ。反つて眞氣を耗するものだ。予（愈）はある人からその親の（三）靜中の治療を依頼されて、三子養親湯を處して治療したが、それを試みると隨つて效があつた。蓋し白芥子は白色にして痰を主り、氣を下し、中を寬にする。紫蘇子は紫色にして氣を主り、喘を定め、嗽を止め、蘿蔔子の白種（らふし）のものは食を主り、痞（ひ）を開き、氣を降すものである。各々微し炒つて研り破り、主とするところを看て君とし、每劑三四錢以内として、生絹袋に盛つて湯に煮て飲ませたのである。煎じ過ぎてはならぬ。過ぎれば味が苦辣（くち）となるものだ。若し大便が元來實するものならば蜜一匙を入れ、冬期には薑一片を加へるが尤も良し。（四）南陵の未齋子はこの藥の贊辭を作つてある。

附方

舊一、新八。

【反胃上氣】白芥子末一二錢を酒で服す。（善濟方）

【熱痰煩

（三）靜中詳サラズ、痰氣、喘息、胸滿ノ症ヲ云フナラン。

（四）南陵ハ隋以後ノ縣名。故城ハ今ノ安徽省貴池縣ノ西南ニ在リ。

乳癖ハチマメ、  
乳頭ノ破裂スル症。

〔牧野云フ、蜜寒  
ハ歐洲、原産デアル  
が、其ハ昔昔支那  
ニ入り支那カラ日本

運】白芥子、黑芥子、大戟だいげき、甘遂かんすい、芒消ぼうしょう、硃砂等分を末にし、糊で梧子大の丸にし、二

十丸づつを薑湯で服す。これを白芥丸と名ける。（普濟）【冷痰痞滿れいたんぷまん】黑芥子、白芥子、

大戟、甘遂、胡椒、桂心等分を末にし、糊で梧子大の丸にし、十丸づつを薑湯で服

す。これを黑芥丸と名ける。（普濟方）【腹冷氣起】白芥子一升を微し炒つて研末し、

湯に浸した蒸餅で小豆大の丸にし、十丸づつを薑湯で服するが甚だ妙である。（續傳信

方）【脚氣で痛むもの】方は白芷びやくしの條下にある。【小兒の乳癖】白芥子を研末し、

水で調へて攤膏たんかうにして貼る。平安を得るまでを期とする。（本草綱目）【痘の目に入る

を防ぐ】白芥子末を水で調へて足心に塗る。毒を引いて下に歸し、瘡疹をして目に

入らしめない。（全効心鑑）【腫毒の初期】白芥子末を醋で調へて塗る。（瀛洲集簡方）【胸

脇の痰飲】白芥子五錢、白朮一兩を末にし、棗肉で和し搗いて梧子大の丸にし、五

十丸づつを白湯で服す。（摘玄方）

## 二 燕 菁 （別錄上品）

和名 かぶ、かぶら  
學名 *Prunella Kaya, L.*  
科名 十字科

## 釋名

蔓菁 唐本

九英菰(食療)

諸葛菜

藏器曰く、

蔓菁は北方では蔓菁

と名けるが、現に二并汾、河朔地方ではその根を食ひ、蕪根と呼んでゐる。これ

はやはり蕪菁なる名稱からしたもので、蕪菁といふが南、北に通ずる名稱だ。塞

北、河西で種ゑるものは九英蔓菁と名け、また九英菰ともいふ。根、葉が長大で味

が美くない。その地方ではこれを軍糧にする。

禹錫曰く、爾雅に『須は蕪菁なり』とあり、又『詩の谷風に「葍を采り、菲を采

る』とあり、毛萇の註に「葍は須なり」とあり、孫炎は「葍、一名葍菰」といつ

た。禮の坊記には「葍は蔓菁なり。陳、宋地方で葍といふ」とあり、陸機は「葍

は蕪菁なり。幽州地方では芥といふ」といひ、郭璞は「蕪菁は羊蹄に似て葉が細

く、味は醋くして食へるものだ」といひ、揚雄の方言には「蕪菁は蔓菁である。陳、

楚では蕪といひ、齊、魯では蕪といひ、關西では蕪菁といひ、趙、魏では

大芥といふ」といつた。して見ると、葍といひ、須といひ、蕪菁といひ、蔓菁と

いひ、蕪菁といひ、蕪といひ、芥といふ七種に呼ばれるものは一種の物だ」とある。

時珍曰く、按ずるに、孫愔の『蕪とは蔓菁の苗のことだ』といつた説が甚だ穩當

ニ傳ヘタモノデ、今ハ一般重要ナ蔬菜ノ一トナツテ居リ其異品モ頗ル多イ。釋名ノ諸葛菜ト同名異物ノモノニ今 Morien-dia sonchifolia, Look. fil. ト云フ品ガアツテ、紫花ヲ開キ支那ノ諸處ニ野生シテキル。

(一) 并汾ハ并州、汾州地方、并州ハ石部石膏ノ註、汾州ハ同部石鹽ノ註ヲ見ヨ。

(二) 河朔ハ今ノ河北省地方。

(三) 塞北ハ蒙古地方ヲ指ス。河西ハ草部山草類甘草ノ註ヲ見ヨ。

(四) 大觀ニ須ニ作ル。

(五) 陳、宋ハ今ノ河南省ノ東北部、商丘、宛丘地方ヲ指ス。

(六) 幽州ハ草部山草類人參ノ註ヲ見ヨ。

(七) 楚ハ石部石炭ノ

註ヲ見ヨ。

(一〇) 齊魯ハ山東省地方。

(一一) 關西ハ禽部水禽類鶴ノ註ヲ見ヨ。

(一二) 趙魏ハ山西省地方。

(一三) ナ觀ニ芥字ノ下ニ讀音同ノ四字アリ。

(一四) 江陵ハ石部石鍾乳ノ註ヲ見ヨ。

(一五) 熊羆ハ雲南、廣西、西南ニ住ム蠻夷ノ部落ヲ指

だ。掌禹錫は蓂蕪を移して蔓菁を解釋し、陳藏器は蓂蕪を酸模さんもだといつたが、陳氏

の説が優まさつてゐる。詳細は草部の酸模の條を見よ。劉禹錫の嘉話錄に『諸葛亮は、軍隊を駐こまめると兵士を指揮してそこに蔓菁だけを種こふさせたものだ、それは一いっには纔わずか

に苗が生え初めると生で啖くへる。二

には葉が舒のびれば煮て食へる。三に

は久しくそこに滞在すればますます

繁茂し成長する。四には棄てて去つ

ても惜くない。五には再びその地へ

向つた場合に尋ねて採り易い。六に

は冬も根があつて食へる。諸種の蔬

菜に比してその利用の甚いだ博ひろい點に

著眼したものだ。現在でもなほ蜀地方では諸葛菜と呼び、(一四)江陵でもやはりさう呼

んでゐる』とあり、又、朱輔山の溪蠻叢話には『(一五)熊羆ゆうれう、(一六)獐ちやう、(一七)貉はく地方に馬王菜といふ

を産する。味が濃くして刺が多い。即ち諸葛菜だ。馬殷のが遺したものだと言ひ傳へ



〔蔓菁〕  
蔓 菁



ス。金部金。夷瘠ノ註、石部丹砂ノ鑛、猪獠等ノ註參照。

二六 西川ハ今ノ四川省の西牛地方。

二七 江表ハ江蘇省揚子江以南ヲ指ス。

二八 痺ハ卑ニ通ズ、ヒタキ事ヲ云フ。

るのでかく名けたのだ』とある。又、蒙古地方ではその根を沙吉木兒と呼ぶ。

### 集解

弘景曰く、別錄には蕪菁、蘆服ろふくを同條に記載してあるが、蘆服とは今の溫菰もんものことで、その根は食へるが葉は噉くへないものだ。蕪菁は根は溫菰よりも細いが葉は菰に似て食ふに好いものだ。二六西川せいせんではただそれだけを種ふる。その子は溫菰と甚だよく似てゐるが、俗方では用ゐない。ただ服食家で鍊つて食ふが、蘆服子とはいはないから、子は恐らく用ゐぬのであらう。俗間では一般にその根を蒸し、また茹ゆにして食ふ。但し少し薰臭くにおなものである。

恭曰く、蕪菁は北方では蔓菁まんせいと名ける。根、葉、及び子はいづれも菰もの類で、蘆服とは全然別だ。體用もやはり異ふ。陶氏は、蕪菁は蘆服に似て、蘆服の葉は食へないといつたが、これは二七江表かうへうには二物を産せぬので、その物の實際が判らなかつたのだ。菰子は黒色、蔓菁子は紫赤色で大いさは相似たものだ。蘆服子は黄赤色で大いさは數倍し、且つ圓まるくない。

大明曰く、蔓菁は蘆服に比すれば梗が短くして細く、葉は大きく、地上に連つて生え、厚く潤ひろく、短く肥えて二八痺しびである。その色は紅い。



こち吐谷渾へ草部芳  
草類本香ノ註ヲ見  
ヨ。

頤曰く、蕪菁は南、北いづれにもあるが北方の地に就中多く、四時常にあつて、春は苗を食ひ、夏は心を食ひ、また薹子だいしともいふ。秋は莖を食ひ、冬は根を食ふ。河朔では多く種ゑて饑饉ききんの歳の備にする。菜類中の最も有益なるはただこの物である。その子は夏、秋に熟した時に採る。

宗奭そうしやく曰く、蕪菁は、夏期になると枯れるので、その時に野菜畑へまた種ゑ、雞毛菜けいまさいといふ。心を食ふは春の間だ。諸菜中では有益無損にして一般人の生活に功あるものだ。十分摘み採つた残りは子を取つて油にし、それを燈火に點ずると甚だ明だ。西方の地ではその油も食ふ。河東、太原に産するものは根が極めて大きく、他の土地のものは及ばない。又、西番さいばん、吐谷渾とこくじんの地にも産する。

機けい曰く、葉は蕪菁、根は蘆菔だ。

時珍ししん曰く、別錄に蕪菁、蘆菔を同一條に記載したところから、種種なる臆説を生み、或る者は二物を一種とし、或る者は二物は全然別だといひ、或るものは南に在ては菴菔かうふくといひ、北に在つては蕪菁といふといひ、一向に一定した見解がないが、今按ずるに、この二物は根、葉、花、子が全く別であつて一類のものでない。蕪菁とい

(二〇)永、一本ニ苦ト  
アリ。

(二一)花葉ハ葉ニ剪彩  
刻アルヲ云フ。

(二二)九莢ハ九英ノ  
誤。次ノ九英二字ハ  
衍文。

ふは芥<sup>かい</sup>屬<sup>ぞく</sup>のもので、根は長くして白く、その味は辛く苦くして短く、莖<sup>あし</sup>は粗く、葉は大きくして厚く濶く、夏の初に莖が起ち、四出で芥のやうな黄色の花を開き、やはり芥のやうな角<sup>さか</sup>を結び、その子は平均して圓く、芥子に似て紫赤色だ。蘆<sup>あし</sup>服といふは菘屬<sup>そうぞく</sup>のもので、根は圓く、また長いものもあつて、紅、白の二色あり、その味は辛く甘くして(二〇)永く、葉は甚だ大きくして糙<sup>ざう</sup>澀<sup>じふ</sup>だ。また(二一)花葉のものもある。夏の初に莖が起つて淡紫色の花を開き、蟲のやうな状態で腹が太く尾の尖つた角を結び、子は胡蘆<sup>ころは</sup>巴<sup>は</sup>に似て平均せず、圓くなく、黄赤色だ。かやうに分けて見ると自ら明白である。この莖菁<sup>せい</sup>は六月種<sup>こ</sup>ふたものは根が大きくして葉に薺<sup>ざ</sup>がつき、八月に種<sup>こ</sup>ふたものは葉が美しくして根が小さい。ただ七月の初に種<sup>こ</sup>ふたものは根、葉俱に良し。賣らうとして作るものは純<sup>ちん</sup>ら(二二)九莢、九英のものを種<sup>こ</sup>ふるので、根は大きい味が短く、淨め削つて菹にするが甚だ佳し。現に燕京地方では瓶で醃<sup>かん</sup>藏<sup>ざう</sup>して閉<sup>へい</sup>甕<sup>かう</sup>菜と呼んでゐる。

根 葉 氣 味

【苦し、溫にして毒なし】時珍曰く、辛く甘く苦し。宗奭曰く、多く食へば氣を動ずる。

主治

【五臓を利し、身を軽くし、氣を益す。長く食ふがよし】（別錄） 【常食すれば中を通じ、人をして肥健ならしめる】（蘇頌） 【食を消し、氣を下し、嗽を治し、消渴を止め、心腹の冷痛、及び熱毒風腫、乳癰、妬乳、寒熱を去る】（孟詵）

發明

説曰く、九英菰きうえいこは河西に産する。葉が大きく、根も粗く長い。羊肉に和して食ふが甚だ美である。常食として全然病を發した例がない。冬期に茹にし、羹かうに煮て食へば、宿食を消化し、氣を下し、嗽を治す。諸家の説を大體參考するに、その性冷である。しかるに本草に溫とあるは恐らく誤であらう。

附方

舊八、新四。【時疾の豫防】立春後、庚子に當る日に蔓菁汁を溫め、一家大小いづれも多少に限らず服す。一年間時疾を免れる。二三（神仙教子法） 【鼻中衄血びやくけつ】

二三大觀ニ傷寒類要  
ニ作ル。  
二四大觀ニ孫真人食  
忌ニ作ル。

諸葛菜を生で搗ついて汁を飲む。二四（十便良方） 【大醉して堪へざるとき】連日病困する

には、蔓菁菜に少量の米を入れて煮熟し、滓を去つて冷飲するがよし。（肘後方） 【飲

酒に氣を辟ける】乾蔓菁根十四箇を二回蒸して末に碾すり、酒後に二錢を水で服す。

酒の氣がなくなる。（千金） 【一切の腫毒】生蔓菁根一握に鹽花少量を入れて共に搗

き、それで封じて一日三回易へる。○肘後方では、蔓菁葉を水に中てずに灰に燒き、

臘猪脂で和して封ずる。【根のある丁腫】だいしん大鍼で刺して孔を作り、蔓菁根を鍼の太さに削つて鐵生衣を染けて孔中に刺し入れ、更に蔓菁根、鐵生衣等分を搗いて上に塗り、膿が出るとき易へる。須臾にして根が出て立ろに瘥える。油膩、生冷、五辛、粘滑、陳臭のものを忌む。(肘後)【乳癰寒熱】蔓菁の根、并に葉を水で洗はずに土を去り、鹽を和して搗いて塗り、熱すれば換へる。三五回に過ぎずして瘥える。冬期にはただ根を用ゐる。この方は已に十數人を救つた經驗がある。風を避けねばならぬ。(李鋒兵部手集)【婦人の妬乳】しやうまんないこん生蔓菁根を搗き、鹽、醋、漿水を和して煮てその汁で洗ふ。五六回で良し。又ある方では、雞子白を和して封ずるも妙である。(瘰癧)

【斗ほどになる陰腫】生蔓菁根を搗いて封ずる。一般に治療不能のものを治す。(集療方)【豌豆斑瘡】あんどうはんそう蔓菁根を搗き、瘡を挑破してその汁を塗る。三時間ほどで根が出る。(肘後方)

【犬咬傷瘡】重發せるには、蔓菁根の搗汁を服するが佳し。(肘後)【小兒の頭禿】蔓菁葉を灰に焼き、こま脂で和して傳ける。(千金)【飛絲の眼に入つたとき】

蔓菁葉を揉み爛らして帕はくに包み、汁を二三點滴せば出る。(普濟方)

子 (二六)

氣味

【苦く辛し、平にして毒なし】

主治

【目を明にする】(荆錄)

(二五)大觀ニ醋ニ作ル。

(二六)木村(康)曰ク、

蕪菁 R. Tapa L.、

成分 ニツイデハ Wo-Invert. D. Maltose-

stoffo II Anthrac, 338. 文獻ニ〇チ學  
グ、種子ハ少量ノ配  
糖體「ジニケリッ」  
揮發芥子油等チ出ダ  
ス、ソノ組成〇〇ハ  
水分七・八六、脂肪三  
三・五三、含窒素物二  
〇・四八、無窒素物二  
四・四一、粗纖維九  
九一、灰分三・八一。  
又根「アロダン」水素  
チ含ミ、花ハソノ一  
〇〇瓦中一・五匙、葉  
ハ〇・四匙（莖ハ〇）  
ノ確黃分ヲ含ム。食  
用植物志ニヨレバ、  
食用トシテ實用セラ  
ルル我内地產蕪菁根  
（Is. Kapu var. rapi-  
ficera）ノ組成〇〇ハ  
水分九四・〇〇、蛋白  
質一・六二、脂肪〇・  
〇七、無窒素物二・八  
二、纖維〇・七、灰分  
〇・七八。  
三七 蒜髮ハ宜髮ノ誤

【黃疸を療じ、小便を利す。水で煮た汁を服すれば癥瘕積聚に主效があり、少しづつ汁を飲めば霍亂の心腹脹を治す。末にして服すれば目暗に主效があり、油にして面膏に入れば黒野皺文を去る（蕪菁）】「油で和して蜘蛛咬に傳ける（藏器）】「壓取した油を頭に塗れば能く（二七）蒜髮を變ずる（孟詵）】「丸藥に入れて服すれば人をして肥健ならしめ、就中婦人に宜し（蕭炳）

### 發明

藏器曰く、仙經に「蕪菁子を九蒸九曝して末に擣き、長く服すれば穀食を斷つて長生し得る」とある。蜘蛛に咬まれて毒が内に入る恐のあるには、末に擣いて酒で服し、また油で和して傳ける。蕪菁の畑に蜘蛛のゐないのは相畏れる關係があるからだ。

時珍曰く、蕪菁子は、升によく、降によく、能く汗し、能く吐し、能く下し、能く小便を利し、又、能く目を明にし、毒を解す。その功甚だ偉なるものだが、何ゆゑか世間で用ゐることを知るものが罕だ。夏初に採つた子を炒つて油を搾り、麻油と共に鍊熟すると全然同一なものとなる。西方の地では多くこれを食べ、燈火に點けるが、甚だ明だ。但し烟はやはり目を損ずるもので、北魏の祖珽が地窖中に幽囚



宜髪へ黑白毛相雜ルナリ。

されたとき、燕薺子油の燈を點けてゐたために視力を傷めたといふはそれである。

### 附方

舊四、新十八。

【目を明にし、氣を益す】燕薺子一升、水九升を汁が盡き

るまで煮て日光で乾し、かく三回繰返してから研細し、一日三回、水で方寸匕を服

す。また水に研り、米を和して粥に煮て食ふもよし。(外臺祕要) 【常服して目を明にす

る】人をして腸腑を洞視せしめる。燕薺子三升を苦酒三升で煮熟して日光で乾し、

研り篩つて末にし、一日三回、方寸匕を井華水で服す。忌むものなし。抱朴子に「一斗

を服し盡せば夜でも物を視得る」とある。(千金方) 【青盲眼障】ただ瞳子さへ壞れぬ

ものならば十中の九まで癒える。蔓薺子六升を蒸し、氣を飢内全部に普遍させて取

下し、釜中に入れて熱湯を淋ぎ、それを曝乾してまた淋ぎ、かく三回繰返して取收

め、杵いて末にし、一日二回、食前に清酒で方寸匕を服す。(崔元亮海上方) 【虛勞目

暗】方は前記の法に同じ。(普濟方) 【肝を補し、目を明にする】燕薺子を淘つて一斤、

黃精二斤を共に和して九蒸九晒して末にし、一日二回、空心に二錢づつを米飲で服

す。○又ある法では、蔓薺子二升、決明子一升を和勻し、酒五升で煮乾して曝して末に

し、一日二回、二錢づつを溫水で調へて服す。(いづれも聖惠) 【風邪の目を攻むるもの】

(二八)大觀ニ方チニニ  
作ル。



視力の明ならぬは肝の氣虛である。蔓菁子四兩を甕瓶じへいろう中に入れて黒く焼き、聲がなくなつてから取出し、蛇蛻じわぜい二兩を入れ、また焼いて灰にして末にし、一日三回、半錢づつを食後に酒で服す。（聖濟總錄）【服食辟穀】蕪菁子の熟したとき採り、水で三回煮て苦味を盡し、曝して末に擣き、一日三回、二錢づつを溫水で服す。久しく穀食を辟さけ得る。（蘇頌圖經本草）【衣服に染まる黃汗】涕唾までみな黃なるには、蔓菁子を末に擣き、早朝井華水で一匙を服し、日に再服して兩匙までに増加し、知あるを度とする。毎夜尿に帛を浸して見て逐日漸次に白くなれば瘥える。五升以上を服するに及ばぬ。（外臺祕要）【金のやうな黃疸わうたん】眼睛が黃になり、小便の赤きには、生蔓菁子末方寸匕を、一日二回、熱水で服す。（孫真人食忌）【急黃黃疸】及び内黃で腹が結して通ぜぬには、蔓菁子を末に擣き、水で汁を絞つて服す。嚏くもひをして鼻から黃水を出し、また下痢するもので、それで瘥える。子から油を取つて一盞づつ服するが更に佳し。（陳藏器本草拾遺）【熱黃便秘】蕪菁子を末に擣き、水で和して汁を絞つて服す。少頃して一切の惡物を瀉するもので、沙石、草、髪いづれも出る。（孟詵食療本草）【二便關格】脹悶して絶せんとするには、蔓菁子油一合を空腹に服すれば通ずる。通じて後汗が

出ても怪しむに及ばぬ。(聖惠方)

【心腹の脹るもの】蔓菁子一大合を揀り淨めて搗き

爛し、水一升を和して研り、汁を濾して一盞を頓服する。少頃して自利し、或は自

吐し、或は汗を出して癒える。(外臺祕要)

【霍亂脹痛】蔓菁子を水で煮て汁を飲む。

(瀕湖集簡方)

【妊娠溺澀<sup>ねうじふ</sup>】

蔓菁子末方寸匕を水で服す。一日二回(子母祕錄)

【風癰<sup>ふうよう</sup>の腹

に入りたるもの】身體が強し、舌の乾硬するには、蔓菁子三兩を末にし、一錢づつ

を溫酒で服す。(聖惠方)

【癰疽<sup>へうそ</sup>發熱】

疽が手、足、肩、背に生じ、米のやうに蟻<sup>あひる</sup>と起

り、色白く、刮れば汁が出て復た發熱するには、蔓菁子を搗き熟して帛に裹み、晝

夜休まずその上に展轉する。(肘後方)

【骨疽の癒えぬもの】癒えても復た發し、骨が

孔中から出るものには、蔓菁子を搗いて傅け、帛で裹定し、日に一回易へる。(千金方)

【小兒の頭禿】蔓菁子末を酢で和し、一日三回傅ける。(千金方)

【眉毛の脫落】蔓菁

子四兩を炒つて研り、醋で和して塗る。(聖惠)

【面皰<sup>めんそ</sup>瘰<sup>れい</sup>癧<sup>てん</sup>點】

蔓菁子を研末し、面脂中

に入れて毎夜塗る。また面皰をも去る。(聖惠方)

## 花

氣味

【辛し、平にして毒なし】

主治

【虚勞で眼の暗きもの。久し

く服すれば長生し、夜間讀書し得る。三月三日に花を採つて陰乾し、末にして二錢

づつを空心に井華水で服す】(慎微)

二 萊菔 (唐本草)

音は來比(ライヒ)である。


和名 だいこん  
學名 *Raphanus sativus*, L.  
科名 十字科

釋名

蘆菔 郭璞曰く、蘆の音羅(う)菔は音比(ヒ)である。菔と同じ。蘿蔔

音は羅北(ラホク)である。 雲薺(爾雅註) 紫花菘(同上) 溫菘(同上) 土酥 保昇

(一)牧野云フ、だいこんハ元來歐洲方面ノ原産デアルガ、往昔之レガ支那ニ入り後支那カラ我邦ニ傳ヘ、今日デハ世界中我カ日本ガ同品ノ最モ發達シタ國トナツテ居ル、從テ其品類多ク頗ル僞品ニ富ンデキテ、其巨大ナモノニハさくらじまだいこんノ如キモノカアル、古名ノ蘆菔ハ音譯字デ是レハ *Euphorbia*, *raphanus*, *rapum*, *rapus*, *raphanus* ナドノ語ガ其元チナスモノデアラウト思ハレル、之レニ據ツテ見レバ、だいこんノ源ガ歐洲方面ニアル事ヲ推想シ得ラル



〔菔 菜〕  
—— 蘿蔔 ——

曰く、萊菔は俗に蘿蔔と名ける。按ずるに、爾雅に『菑さいは蘆菔らふなり』とあり、孫炎の註に『紫花菘のことだ。俗に溫菘と呼ぶ。燕薺えんさいに似て根が大きい。俗に電菑でんさいと名ける』とある。一名蘆菔といふそのものだ。  
頤曰く、紫花菘、溫菘とはい

ル、我邦海邊ニハまだいこんト云ノノガアルガ、是レハ栽培ノだいこんガ逸出シタモノデ、決シテ別種ノ品デハナイ。

(二) 小野蘭山曰、鼈ハ鼈ノ誤ナラン。鼈ハ蒲草ノ反、鼈ハ蒲包ノ反ナリ。

づれも南方地方で呼ぶ名で、吳地方では楚菘と呼び、廣南地方では秦菘と呼ぶ。

時珍曰く、按ずるに、孫愐の廣韻に『魯地方では菹漣——音は拉苔(ラツタフ)——

と名け、秦地方では蘿蔔と名ける』とあり、王禎の農書には『北方の地では蘿蔔一種のものに四種の名があつて、春は破地錐といひ、夏は夏生といひ、秋は蘿蔔といひ、冬は土酥といふ。これはその潔白にして酥のやうだといふ意味だ』とある。予(時珍)が按ずるに、菘といふは菜の名で、その物が冬に耐へて松柏のやうだといふ意味に因る。菜菔といふは根の名で、上古にはこれを蘆菔といひ、中古には轉じて菜菔となり、後世には訛つて蘿蔔となつたのである。南方では蘿蔔ニ鼈と呼ぶ。鼈は電と同じで、晉灼の漢書註の中に書いてある。陸佃は『菜菔は能く麪毒を制する。

これは來麪らいめんの服するところのもので、それゆゑに菔の音は服なのだ』といつたが、これはやはり文字から意味を考へ出したものである。王氏の博濟方には、乾蘿蔔を仙人骨と稱してあるが、これも方士が呼ぶ出鱈目でたらめの名稱だ。

### 集解

弘景曰く、蘆菔とは今の溫菘のことで、その根は食へる。俗間ではその根を蒸し、及び菹にして食ふが、ただ少し薰臭くんしゅうなものだ。葉は啖くへない。又、葵

(三) 江北ハ揚子江以北ノ江蘇地方。  
 (四) 河北ハ河北省地方。  
 (五) 秦晉ハ山西、陝西地方。  
 (六) 登萊ハ山東省ノ東部地方。  
 (七) 河朔ハ河北トイフニ同シ。  
 (八) 江南ハ揚子江以南ノ江蘇、浙江地方。  
 (九) 安州ハ元ニ置ケ、今ノ河北省新縣ソノ地ナリ。  
 (一〇) 洪州ハ章部山草類草犀ノ註ヲ見ヨ。  
 (一一) 信陽ハ縣名、今ハ河南省汝陽道ニ屬ス。

といふがあるが、根は細くして辛味が過ぎ、服するに適しない。

恭曰く、菜菔、即ち蘆菔であつて、嫩葉せんえふは生菜として食ひ、大葉は熟して啖へる。

陶氏は食へないといつたが、事實と違つてゐる。(三) 江北、(四) 河北、(五) 秦晉に最も多く、(六) 登萊さうらいのものも好し。

頤曰く、菜菔は南、北を通じてあるが、北方の地に尤も多い。大、小の二種あつて、大なるものは肉が堅く、蒸して食ふに宜し。小なるものは白くして脆く、生で啖ふに宜し。(七) 河朔には極めて大なるものがあるが、(八) 江南、(九) 安州、(一〇) 洪州、(一一) 信陽のものも甚だ大きく、その重量五六斤のものもあり、或は一秤しやうに近いものもある。やはり一もつはら時期と栽培の力に因るものだ。

瑞曰く、夏期に復た種ゑるものをば夏蘿蔔と名け、形の小さくして長いものを蔓青蘿蔔と名ける。

時珍曰く、菜菔は今は全國到る處にある。昔の人が蕪菁、菜菔の二物を混淆こんかうして註釋したことは已に蔓菁の條下に述べた通りである。耕作者が菜菔を栽培するには、六月に種を下し、秋に苗を採り、冬に根を掘る。春末に高い蔓たうが抽ひき出て紫碧色の



小花を開き、夏初に角<sup>さや</sup>を結ぶ。その子は大麻子ほどの大いさで、圓きもの長きもの等があつて平均しない。色は黄赤だ。五月にまた再び種<sup>こ</sup>えられる。その葉は大なるは蕪菁<sup>わしやう</sup>ほどのものがあり、細きは花芥<sup>かさい</sup>ほどで、いづれも細い柔毛がある。その根には紅、白の二色あつて、その形狀にも長、圓の二類があるが、概して沙地に生えたものは脆<sup>ちやう</sup>くして甘く、瘠地に生えたものは堅くして辣<sup>から</sup>い。根、葉、いづれも生でもよく、熟してもよく、菹にするもよく、醬にもよく、豉にもよく、醋にもよく、糖にもよく、腊にもよく、飯にもよし。乃ち蔬菜中の最も利益あるものである。しかるに、古人は深くこれに詳考を加へてないが、それは物が賤いから忽<sup>ゆるが</sup>せにしたといふわけではあるまいか。それとも、この物の利用の特長を知らなかつたものであらうか。

### (二二) 氣味

【根は辛く甘し、葉は辛く苦し、溫にして毒なし】説曰く、性は冷である。思邈曰く、平である。地黄と共に食つてはならぬ。髪を白くするものだ。

それはこの物が營衛を澀するためだ。時珍曰く、萊菔を多く食へば氣を動ずるが、ただ生薑<sup>しやうきやう</sup>が能くその毒を制す。又、礪砂<sup>りさ</sup>を伏す。

(二二) 木村(庚)曰ク、  
食川植物誌ニヨレバ  
苦が宮重大根ノ組成  
(%)ハ水分九四・五  
五蛋白質〇・七三、  
脂肪〇・〇一、無窒素  
物三・七〇、木纖維  
〇・五一、灰分一・四



九、Werner: d.

Pflanzenstoff II.

Anhang 411, 413, 414

文獻二〇餘チアゲテ

次ノ四變種ノ成分チ

述ブ

R. Sat. var. alba =

於テハ、根ハ酵素ニ

ヨツテ揮發油ヲ生成

スル一種ノ配糖體

「ラファノール」作用

ノ強力ナル「サアス

ターピ」、メチルメ

ルカブタン、ロタ

ン水素、有機硫黃化

合物、ペントザン」等

ヲ含ム、ソノ組成

(%)ハ水分八六・九

二、含窒素物一・九

二、脂肪一・一、無

窒素物六・九〇(ソノ

一糖分一・五)、粗纖

維一・五五、灰分一・

七、種子、脂肪油

三七・五五(四五―五

〇%)、エルカ、酸、油

質等ノ一ガリツエリ

## 主治

【散にして服し、及び炮き煮て服食すれば、大いに氣を下し、穀物を消化し、中を和し、痰癰を去り、人體を肥健にする。生で搗いて汁を服すれば消渴を止める。實驗上大いに效驗があつた】(唐本) 【關節を利し、顔色を理し、五臓の惡氣を練り、麪毒を制し、風氣を行<sup>や</sup>り、邪熱氣を去る】(蕭炳) 【五臓を利し、身を輕くし、人體を白淨にし、肌を細ならしめる】(孟詵) 【痰を消し、欬を止め、肺痿吐血を治し、中を溫め、不足を補す。羊肉、<sup>三</sup>銀魚と共に煮て食へば勞瘦欬嗽を治す】(日華) 【猪肉と共に食へば人に益あり。生で搗いて服すれば禁口痢を治す】(汪頤) 【搗汁を服すれば吐血、衄血を治す】(吳瑞) 【胸膈を寬にし、大、小便を利す。生で食へば渴を止め、中を寬にし、煮て食へば痰を化して消導する】(寧原) 【魚の鯉氣を殺し、豆腐積を治す】(汪頤) 【胃酸に主效があり、積滯を化し、酒毒を解し、瘀血を散ずるに甚だ效がある。末にして服すれば五淋を治し、丸にして服すれば白濁<sup>びやくだく</sup>を治す。煎湯で脚氣を洗ふ。汁を飲めば下痢、及び失音、并に烟熏で死せんとするを治す。生で搗いて打撲、湯火傷に塗る】(時珍)

## 發明

頤曰く、萊菔の功は蕪菁と同じだが、力の猛<sup>つよ</sup>いことは更にそれ以上だ。

ド」硫黄含有ノ有機  
游離酸等ヲ含ム、種  
子ノ組成(%)ハ脂肪  
三・二、含窒素物一  
八・三六、無窒素物及  
纖維四・三四、水分  
七・五、灰分三・五。  
R. Sativa var. indica  
ニ於テハ、葉ハ芥子  
油配糖體及「ミロジ  
ン」ヲ含ミ、根ハ〇・  
〇〇二五%ノ硫黄含  
有油分、結晶性「ラフ  
アノール」等ヲ、種子  
ハ揮發油〇・一〇八  
%、脂肪油三九%、  
「ミロジン」芥子油配  
糖體等ヲ含ム。  
R. Sativa var. indic-  
culis ニ於テハ、根ハ  
「ラフアノール」、紅  
色素、「ベントザン」、  
「ペリチン」類有機硫  
黃化合物等ヲ含ミ、  
種子ハ「ミロジン」、  
揮發油(〇・一〇六  
%)、脂肪油(三四・

斷下の方にはやはりその根を用ゐ、焼き熟して薬に入れる。就中能く麴毒を制するもので、昔、ある婆羅門僧が中國へ來て、麥麴を食ふを見て『かかる大熱のものを如何にして食ふのであらうか』と驚いたが、その膳部の中に蘆朮のあるを見て『なるほどこれがあればその性を解すわけだ』といつた。それから相傳へて麴を食ふには必ず蘆朮を啖ふ。

炳曰く、擣き爛らして麴を制し、それを餠飪にして食ふが最も佳く、飽食しても熱を發しない。酥で煎じて食へば氣を下す。凡そ飲食過度の場合には、生で嚼んで嚙めばそれで消化する。

慎微曰く、按ずるに、楊億の談苑に『江東の居民は「芋を三十畝に種ゑれば、その結果米三十斛を省ける。蘿蔔を三十畝に種ゑれば、その結果米三十斛を多く消費する」といふ。これで見ると、蘿蔔は果して能く食物を消化するものだといふことが首肯される』とある。

宗奭曰く、地黄、何首烏を服した人が菜朮を食へば髭髮が白くなる。世間ではみなこの物は味が辛くして氣を下すことが速なためと考へてゐるが、然らば生薑、芥

七)チ有ス。

It. Sativa var. oleifera (It. chinensis Mill.)ノ種子ハ、〇・一三三%ノ揮發油及ビ三三%ノ脂肪油ヲ含ム。

(應用)根及ビ葉ハ葯トシテ重要ナリ、民間ニテ根ノ切片ヲ水飴ト混ジテ咳嗽ニ效アリトテ用サ、又種子ハ健胃祛痰藥トス。

二)大觀ニ銀子鯉ニ作ル。

子は更に辛いが、その結果さうでないのは何故かといふに、それはただ能く散するだけのものだからで、蓋し葉菴は辛くしてまた甘い。故に能く散じ、緩ゆるにしてまた氣を下すことが速かなものなのだ。氣を散ずるに生薑を用ゐ、氣を下すに葉菴を用ゐる理由はそれである。

震亨曰く、葉菴は土に屬して金と水とを有する。寇氏は、この物を『氣を下す』とが速だ一といつたが、一般に煮て過多に食ふと往往にして停滯たいじして溢飲いっぴんを起す。

これは甘が多くして辛が少いからではあるまいか。

時珍曰く、葉菴は根、葉同功であつて、生で食へば氣を升し、熟して食へば氣を降す。

蘇、寇二氏はただこの物を『氣を下す』と云ふのみひ、孫真人は『久しく食へば營衛を澀す』といつたが、やはりその物は生では噎氣あいきし、熟すれば洩氣せつきし、升、降同じからぬ點を知らないのだ。概して太陰、陽明、少陽の氣分に入るものだから、主とするところはみな肺、脾、胃、三焦の病である。李九華は『葉菴を多く食へば人の血を滲しみす』といつた。して見ると、その人の髮かみを白くするも蓋し亦この關係に因るのであつて、獨り氣下し、營衛を澀するに因するだけのもの

ではない。

〔四〕齊州ハ石部滑石ノ註ヲ見ヨ。

按ずるに、洞微志に『〔四〕齊州のあるものが狂を病んで、かういふことを言ひ出した「夢で紅裳を著た少女子に連れられてある宮殿へ往つたが、そこにゐた年頃の娘に毎日歌を歌へといはれて

五靈樓閣曉玲瓏 天府由來是此中

惆悵悶懷言不盡 一丸蘿蔔火吾宮

と歌つてゐた」と。ところがある道士がそれを聞いて「この病は大麥の毒を犯したのだ。その夢の少女は心の神、年頃の娘は脾の神だ。醫經に蘿蔔は麴毒を制すところあるから、それで吾が宮を火くといつたので、火くとは毀るといふ意味だ」といつて、藥、并に蘿蔔を以て治療したが、果してそれで癒えた」とある。

又、按ずるに、張杲の醫說に『〔五〕饒の住民李七といふ者が鼻衄を病んで甚だ危ふかつたとき、醫師が蘿蔔の自然汁に無灰酒を和して飲ませると直に止んだ。蓋し血は氣に隨つて運るもので、氣が滯るから血が妄行するのであつて、蘿蔔は氣を下して消導するものだから奏效したのだ』とあり、又『ある人は好んで豆腐を食つて中

〔五〕饒州ハ土部白瓷器ノ註ヲ見ヨ。

毒し、醫師の治療も效がなかつたが、ふと豆腐屋が「女房が誤つて鍋の中へ蘿蔔湯を入れたところが、とうとう豆腐に成らなくなつて了つた」と話してゐるを聞き、心の裡になるほどと悟り、そこで蘿蔔湯を飲んで見るとそれで癒えた。物の理にはかやうな妙がある』とある。

又、延壽書には、李師は難を逃れて石窟中に入つて、賊に烟で熏じられて死に垂とするに至つたが、蘿蔔菜一束を搜り取り、嚼んでその汁を嚥下すると甦つたといふ記載がある。これは急に備へる法として心得置くべきことである。

#### 〔附方〕

舊二、新三十一。

「物を食つて酸く覺えるもの」蘿蔔數片を生で嚼む。或

は生菜を嚼むも佳し。絶だ妙である。乾いたもの、熟したものの、鹽で醃けたもの、及

びその人が胃冷の場合にはいづれも效がない。(瀕淵集簡方) 【反胃噎疾】蘿蔔を蜜で

煎じ浸し、少しづつ嚼んで嚥むが良し。(普濟方) 【消渴飲水】獨勝散——子を出了し

た蘿蔔三箇を淨洗して切片し、日光で乾して末にし、猪肉を煎じて湯を澄清して二

錢づつを調へ、一日三回服し、漸次に三錢まで増加する。生のものの搾汁もよし。

或は汁で粥を煮て食ふ。(圖經本草) 【肺痿歎血】蘿蔔に羊肉、或は鱖魚を和し、煮熟し



て頻りに食ふ（普濟方）【鼻衄の止まぬもの】蘿蔔の搗汁半盞に酒少量を入れて熱服し、并に汁を鼻中に注ぐ。いづれも良し。或は煎沸した酒に蘿蔔を入れて再煎して飲む（衛生易簡方）【下痢禁口】蘿蔔の搗汁一小盞、蜜一盞、水一盞を共に煎じ、早朝一服し、正午一服し、日晡に米飲で阿膠丸百粒を吞む。もし蘿蔔がないときは子を搗つた汁もよし。ある方では、枯礬七分を加へて共に煎じる。ある方では、ただ蘿蔔の煎湯を日毎に飲む。○普濟方では、蘿蔔片を新、舊に拘らず蜜を漬けて嚼み、汁を嚥む。味が淡くなつたときは換へる。食思がついたときは肉と粥を煮て食はせる。多過ぎてはならぬ。【痢後の腸痛】方は上に同じ。【大腸便血】大蘿蔔皮を焼いて性を存し、荷葉を焼いて性を存し、蒲黃を生で等分を末にし、一錢づつを米飲で服す。（普濟）【腸風下血】蜜で炙いた蘿蔔を任意に食ふ。昔、ある婦人がこれを服して效を擧げた。（百一選方）【酒疾下血】十日間も引續き止まぬには、大蘿蔔二十箇を青葉一寸餘を留め、罐に入れて井水で十分に煮爛し、淡醋を入れて空心に任意に食ふ。（壽親養老方）【大腸脱肛】生萊菔を搗いて臍中に實て束ねる。瘡あるを覺えたときは直ちに除く。（摘玄方）【小便白濁】生蘿蔔を中を剝り去つて蓋を留め、吳茱萸を填



滿まんして蓋をし、糯米飯上にさし込んで蒸熟し、取り出して葉莢を去り、その蘿蔔を焙じて研末し、糊で梧子大の丸にし、一日三回、五十丸づつを鹽湯で服す。(普濟)  
【沙石諸淋】忍び難く疼うづくには、蘿蔔を切片して蜜に浸し、少時して炙き乾し、焦こげ過ぎぬやうにして數回繰返し、一日三回、細に嚼んで鹽湯で服す。これを腹眩みんけんかう膏と名ける。(普濟) 【全身の浮腫】果實を生じ了つた蘿蔔、浮麥等分を湯に浸して飲む。(聖濟總錄) 【脚氣走痛】蘿蔔の煎湯で洗ひ、同時に晒し乾した蘿蔔の末を足袋の底に鋪しく。(聖濟總錄) 【偏、正頭痛】生蘿蔔汁を蜆殼けんてくの一つだけ、仰臥して左右に随つて鼻中に注ぐ。神效がある。王荊公が頭痛を病んだとき、ある道人がこの方を傳授して間もなく癒えた。これで人の病を治した例は枚舉に遑ない。(如宜方) 【失音不語】蘿蔔を生で搗いた汁に薑汁を入れて共に服す。(普濟方) 【喉痺腫痛】蘿蔔汁と皂莢漿さうけふしやうを和して服し、吐を取る。(同上) 【滿口爛瘡】蘿蔔の自然汁で頻に嗽くついで涎を去るが妙である。(瀕淵集簡方) 【烟熏のために死せんとするもの】方は發明の項に記載してある。【湯火傷灼】生蘿蔔を搗いて塗る。子でもよし。(聖濟總錄) 【火花で肌を傷めたとき】方は上に同じ。【打撲の血聚】皮の破れぬものには、蘿蔔、或はその葉を用ゐ、

擣いて封ずる。(邵氏方)

子 氣味 【辛く甘し、平にして毒なし】

主治 【研汁を服すれば風痰を

吐す。醋と共に研つて用ゐれば腫毒を消す】(日華) 【氣を下し、喘<sup>ぜん</sup>を定め、痰を治し、

食を消し、脹を除き、大、小便を利し、氣痛、下痢後重を止め、瘡疹を發する】(時珍)

發明 震亨曰く、萊菔子は痰を治するに牆<sup>かき</sup>を推し壁を倒すやうな功がある。

時珍曰く、萊菔子の功は氣を利するに特長があつて、生では能く升り、熟すれば

能く降り、升つては風痰<sup>のほ</sup>を吐し、風寒を散じ、瘡疹を發し、降つては痰喘、欬嗽を

定め、下痢後重を調へ、内痛を止める。いづれも氣を利するの效果であつて、予は

曾てこれを用ゐて果して著しい成績を擧げた。

附方

舊二、新十四。

【上氣痰嗽】喘<sup>ぜん</sup>促<sup>そく</sup>して膿血を唾するには、萊菔子一合を研

細し、湯に煎じて食上に服す。(食醫心鏡) 【肺痰欬嗽】萊菔子半升を淘淨し、焙じ乾し

て黃に炒つて末にし、糖で和して菟<sup>けん</sup>子<sup>しだ</sup>大の丸にし、綿で裹んで含み、汁を嚥む。甚だ

妙である。(勝金方) 【齁喘痰促】味の濃厚な物を食ふと發するものだ。蘿菔子を淘淨

し、蒸熟し晒して研り、薑汁に浸した蒸餅で綠豆大の丸にし、一日三回、三十九づ

つを口津こうしんで嚙かみ下す。これを清金丸と名ける。（醫學集成）【痰氣喘息】蘿蔔子を炒り、

皂莢を焼いて性を存し、等分を末にして薑汁と煉蜜とで梧子大の丸にし、五七十丸

づつを白湯で服す。（簡便單方）【久嗽痰喘くそうたんぜん】蘿蔔子を炒り、杏仁を皮、尖を去つて炒

り、等分を蒸餅で麻子大の丸にし、三五丸づつを時時に津で嚙む。（醫學集成）【老人の

氣喘】蘿蔔子を炒つて研末し、蜜で梧子大の丸にし、五十丸づつを白湯で服す。（積

生秘覽）【風痰の宣吐】勝金方では、蘿蔔子末三錢を溫水で調へて服す。良久ながくして涎

沫を吐出する。もし攤緩風なんくわんふうの患者ならば、この方で吐して後に緊疎藥を用ゐ、疎し

て後に和氣散を服して瘧を取る。○丹溪の吐法では、蘿蔔子半升を細に搗すり、水一

椀で濾して汁を取り、その汁に香油、及び蜜少量を入れて溫服し、後に桐油に浸し

て晒し乾し、鶩翎がうりゅうで探吐する。【中風口禁】蘿蔔子、牙皂莢各二錢を水で煎じて服

し、吐を取る。（丹溪方）【小兒の風寒】蘿蔔子を生で研末し、一錢を溫めた葱酒で服

して微汗を取る。大いに效がある。（衛生易回方）【風秘、氣秘】蘿蔔子を炒つて一合

を水に搗り、皂莢末二錢を和して服す。立ろに通ずる。（壽域神方）【氣脹、氣蠱きこ】菜

菹子を研つて水で汁を濾し取り、宿砂一兩を一夜浸して炒り乾し、また浸してまた

炒り、凡そ七回繰返して末にし、一錢つづを米飲で服す。神の如き效がある。(朱氏集

驗方)『小兒の盤腸』氣痛するには、蘿蔔子を黃に炒つて研末し、半錢を乳香湯で服

す。(楊仁壽直指方)『年久しき頭風』萊菔子、生薑等分を搗いて汁を取り、麝香少量を

入れて鼻中に插入する。立ろに止む。(普濟方)『牙齒の疼痛』蘿蔔子十四粒を生で研

つて人乳で和し、左の疼くには右鼻に點け、右の疼くには右鼻に點ける。『瘡疹の

出ぬもの』蘿蔔子を生で研末し、二錢を米飲で服するが良し。(衛生易簡方)

花 主 治 『糟下酒で淹藏して食ふ。甚だ美味にして目を明にする』(土真)

# 生 薑 (別錄中品)

和 名 しやうが  
學 名 Zingiber officinale, L.  
科 名 しやうが科(薑科)

## 校 正

もとは乾薑の條下に附してあつたが、此には一條を分離して掲げ、本書には草部から此に移し入れた。

## 釋 名

時珍曰く、按ずるに、許慎の説文には薑を疆と書き「濕を禦ぐの菜な

(一)牧野云フ、しやうがハ薑シ太平洋洋諸島ノ原産デアラウト謂ハレテキルガ、今日デハ諸國一般ニ廣ク栽培セラレテキル我邦デハ極メテ稀ニ花穂ヲ出スコトガアルガ花ハ開クニ至ラヌ、おほしやうがト云フモノハ、地下莖ノ巨大ナ一品デアアル

が、支那ニ多ク産ス  
ル。

(二) 薤爲ハ金部鉛ノ  
註ヲ見ヨ。

(三) 大觀ニ山チ川ニ  
作ル。

(四) 朔州ハ草部陽草  
類地膚ノ註ヲ見ヨ。

揚州ハ草部山草類朮  
ノ註ヲ見ヨ。

(五) 漢ハ石部特生薯  
石藥州ノ註參照。溫

州ハ石部山石類金匱  
ノ註、池州ハ石部山

石類綠薤ノ註ヲ見  
ヨ。

り』としてある。王安石の字説には『薤は能く百邪を驅禦するものだ。故に薤とい  
つたのだ』とある。初生の嫩なめかなものでその尖さきの微紫色なるを紫薤と名け、或は子薤  
と書く。宿根を母薤といふ。

### 集解

別錄に曰く、生薤、乾薤はけんあ薤爲の山谷、及びあ荊州、揚州に生ず

る。九月に采る。

頌曰く、處處にあるが、あ漢、溫、

池州のものを良しとする。苗は高さ

二三尺、葉は箭竹葉に似て長く、兩

兩相對する。苗は青く、根は黄で、

花、實はない。秋期に根を採る。

時珍曰く、薤は原地、陽地、沙地

に適し、四月に母薤を取つて種うゑると五月に苗が生え、初生は嫩なめか盧のやうで、葉は

やや闊く、竹葉に似て對生する。葉もやはり辛香だ。秋社の前後に新芽が頗に成長

し、指を列べたやうな状態になり、取つて食へば筋がない。これを子薤といふ。秋



薤

〔薤〕

〔生〕



き木料(康)曰ク、  
 (成分)根莖ニハ辛味  
 成分「チンゲロン」ナ  
 含有ス。カツテ「ギ  
 ンゲロール」ナル名  
 稱ヲ與ヘラレシモノ  
 ハ「チンゲロン」ノ  
 粗製品ナリ、油狀ノ  
 辛味成分ヲ「シヨ  
 ガオール」ト言フ、  
 根莖中ノ精油含量ハ  
 一%内外ニシテ、其  
 成分ハ「チンギヘ  
 ール」、「チンギベ  
 ール」、「チトラール」  
 「メチルヘプテン」、  
 「ノニルアルデヒド」  
 「リナロール」、右旋  
 「ボルネオール」等ナ  
 リ。

野村博一化誌大正六

分後のものはこれに次ぎ、降霜後には老いる。性濕潮を惡んで日を畏れるものだ。それゆゑに秋熱すると薑がない。呂氏春秋に「和の美なるものに楊樸の薑あり」とある。楊樸とは西蜀に在る地名だ。春秋運斗樞には「璣星散じて薑となる」とある。

### 氣味

〔辛し、微温にして毒なし〕藏器曰く、生薑は温である。熱ならし

めんとするときは皮を去り、冷ならしめんとするときは皮を留める。

元素曰く、辛くして甘く、温である。氣、味俱に厚く、浮にして升る。陽である。

○之才曰く、秦椒しんけうが使となる。半夏はんげ、葇岩らうがんの毒を殺す。黄芩わうこん、黄連、天鼠糞を惡

む。

弘景曰く、久しく服すれば志を少かき、智を少き、心氣を傷る。現に一般に噉くふ辛辣しんの物では、ただこの物だけが最も尋常だ。故に論語に「食する毎に薑を撤せず」とある。それは常に食ふがよしといふ意味だ。但し多食してはならない。病がある者には效能がある。

恭曰く、本經に「薑は久しく服すれば神明に通じ、痰氣に主效がある」といつてある。これは常に噉つて差支ないものだ。陶氏みだりは謬にかやうな説をなしてゐるが、



檢討して見るに根據がない。

○思邈曰く、八九月に多く薑を食へば春に至つて多く眼を患ひ、壽を損じ、筋力を減ずる。妊婦がこれを食へば（七）盈指（たいていし）の兒が生れる。

○杲曰く、古人は『秋は薑を食つてはならぬ、人をして氣を瀉せしめるものだ』といつた。蓋し夏期には火が旺（さかん）で、汗し散ずべきものだから薑を食ふことを禁ぜぬのだが、幸は氣を走し、肺を瀉するものだから秋期には禁じたのだ。晦菴語錄にもやはり『秋薑は人の天年（てんねん）を天（あう）する』といふ言葉がある。

○時珍曰く、薑を食ふことが久しきに互れば積熱して目を患ふ。予（時珍）は屢々試みた實驗上誤らない。凡そ瘡病（しょうびょう）の人は、多くこれを食ひ、また兼て酒を飲めば立ろに發すること甚だ速だ。癰瘡（ようそう）の人が多く食へば惡肉を生ずる。これはいづれも昔の人の言はなかつたところである。相感志には『糟薑（そうきやう）の瓶の内へ蟬蛻（せんてい）を入れると老薑でも筋が無くなる』とある。やはり物の性に伏するところがあると見える。

（八）  
**主治**

【久しく服すれば臭氣を去り、神明に通ずる】（本草）【五臓に歸し、風邪、寒熱、傷寒、頭痛、鼻塞、欬逆、上氣を除き、嘔吐を止め、痰を去り、氣を下

（三八）二九九—化誌  
大正七（三九）七〇  
六一東北理紀要二  
（一五六五、五八一、  
五八九）一六。  
E. K. Nelson; J.  
Am. Ch. Soc. Trans.  
1917 (III) 777; 1917  
(III) 794. Brooks;  
J. Am. Ch. Soc.  
1916 (38) 430.  
（ヤ）盈指ハ六ッ指。

（八）木村（康）曰ク、  
生薑ハ香辛性健胃藥  
トシ又矯臭藥トス、  
藥師方製劑ハ生薑丁

鷄、生薑、金和朋ナリ。  
漢方ニテ常要ナルノ  
ミナラズ民間藥方ニ  
モ種々用キラル。又  
調味上ニモ重要ナル  
食料ナリ。

〔五〕木村(庚)曰ク、  
今漢藥トシテ薑根チ  
見ルニ、本草書ニ生  
薑、乾生薑、均薑、  
乾薑、炮薑等ノ別チ  
アクル事ニヨリ知ラ  
ルル如ク、生薑ハ俗  
ニイフひれしやうガ

す〔別錄〕「水氣滿を去り、欬嗽、時疾を療じ、半夏を和すれば心下の急痛に主效があり、杏仁を和して煎にすれば急痛氣實、心胸擁脇、冷熱氣を下して神效がある。搗汁に蜜を和して服すれば、中熱嘔逆で食物の落付かぬを治す」〔氣論〕「煩悶を散じ、胃氣を開く。汁を煎にして服すれば、一切の結實、胸脇を衝く惡氣を下すに神驗がある」〔孟詵〕「血を破り、中を調へ、冷氣を去る。汁は藥毒を解す」〔藏器〕「壯熱を除き、痰喘、脹滿、冷痢、腹痛、轉筋、心滿を治し、胸中の臭氣、狐臭を去り、腹内の長蟲を殺す」〔張鼎〕「脾、胃を益し、風寒を散ず」〔元素〕「菌薑、諸物の毒を解す」〔吳瑞〕「生で用ゐれば發散し、熟して用ゐれば中を和し、野禽を食つた中毒から起る喉痺を解す。浸した汁を赤眼に點け、搗汁に黃明膠を和して蒸つて風濕痛に貼るが甚だ妙である」〔時珍〕

# 乾生薑

〔五〕主 治

「嗽を治し、中を溫め、脹滿、霍亂の止まぬもの、腹痛、冷痢、血閉を治す。病人の虚して冷ゆるにはこれを加へるが宜し」〔甄權〕「薑屑に酒を和して服すれば偏風を治す」〔孟詵〕「肺の經の氣分の藥であつて、能く肺を益す」〔好古〕

## 發 明

成無己曰く、薑、棗は味辛く甘く、専ら脾の津液を行して營衛を和す

即チ生ノ薑根ヲ用ウルモノニシテ、漢方中生姜トシテ記サルモノハ、實ニ此ノ薑味ノ生薑ナサスモノナリ、而シテ乾生薑ト稱スルモノコソ今日ノ本邦生薬市場ニ生薑トシテ取扱ルモノニ充當スベク、民間人漢藥商ハ本邦以テ乾燥シタル均薑ヲ扱ヘドモ、乾生薑ハ之ヲ扱ハザルガ如シ、乾薑ハ薑根ヲ蒸シテ乾燥シタルモノ、邦産、民國共ニ市場ニアリ、概シテ邦産ノモノ小形ナリト雖モ、誤ズル時ハ一見シテ區別スルハ容易ナラズ。澱粉モ澱化セルヲ以テ澱粉乾ニ稱シテモ區別ス可ラズ、律ニ氣味ニヨリテ之ヲ知ルノミ、又薑根ノ薑

る藥の中に用ゐる。獨り發散だけに專なるものではない。

果曰く、生薑の用途に四ある。半夏、厚朴こうぼくの毒を解するが一、風寒を發散するが二、棗と共に用ゐれば辛、溫にして脾、胃の元氣を益し、中を溫め、濕を去るが三、芍藥と共に用ゐれば經を溫め、寒を散するが四である。孫真人は『薑は嘔患者に對する聖藥だ』といつたが、蓋し辛は散ずるもの、嘔は氣逆して散ぜぬもので、この藥は陽を行めぐして氣を散ずるのである。或る者は問ふて『生薑の辛溫は肺に入るものだ。胃口に入るといふは如何なるわけか』といふが、それは『俗に心下を胃口としてゐるが、それは正しくない。咽門の下は有形の物を受けて胃の系に及ぼすものだ。これが便すんち胃口であつて、肺の系と同行するものだ。故に能く肺に入つて胃口を開く』のである。また『一般に「夜間には生薑を食ふな、人をして氣閉せしめる」といふは何故か』といふに、それは『生薑は辛、溫にして開發を主とするものだ。夜間には氣が本來收斂しうれんする。然るに反かへつてこれを開發するは自然の法則に違背するからだ。病人の場合にはさうと限るわけに行かぬ』のである。生薑屑は乾薑に比すれば熱せぬ、乾生薑に比すれば溫せぬものだ。乾生薑を乾薑の代用とするは、それな

燒トシタル炮薑ハ、  
我が和漢藥店ニハ之  
ヲ見ザルガ如シ。

ればより以上僭越せんえつな働をせぬからである。俗に『上牀の蘿蔔、下牀の薑』といふは、薑は能く胃を開き、蘿蔔は食物を消化するものだからだ。

時珍曰く、薑は辛にして葷くんならず、邪を去り、惡を辟けるもので、生で啖くふにも、熟して食ふにも、醋、醬、糟、鹽にも蜜煎にも調和にも宜からぬはなく、蔬菜になり、調和劑になり、果子になり、藥になる。その利用範圍の廣いものだ。凡そ早朝の旅行や山行には一塊を含むが宜し。霧露、清濕の氣、及び山嵐さんらん、不正の邪に犯されない。按ずるに、方廣心法附餘に『凡そ中風、中暑、中氣、中毒、中惡、乾霍亂、一切の突然に發おこる劇しき病には、薑汁と童尿とを服すれば立ろに解し散ずる』とある。蓋し薑は能く痰を開き、氣を下し、童尿は火を降すものである。

頤曰く、崔元亮集驗方に、救賜薑茶治痢方——生薑を細に切つて好き茶一二盃を和し、任意に呷すへばそれで瘥える。熱痢の場合は薑の皮のあるまま用ゐ、冷痢には皮を去るが大いに妙だとの記載がある。

楊士瀛曰く、薑は能く陽を助け、茶は能く陰を助け、二物いづれも惡氣を消散するもので、陰陽を調和し、且つ濕熱、及び酒食、暑氣の毒を解げす。痢の赤、白を問

(二〇)大観ニ二八八ニ  
作ル。又附十一兩ヲ  
四兩ニ作ル。

(二一)大観ニ千金方ノ  
三字アリ。  
(二二)大観ニ二七一ニ  
作ル。醋漿二合ヲ七  
合ニ作ル。

はず通じて用ゐて宜し。蘇東坡が文潞公を治して有効だつた。

### 附方

舊二十、新三十。

【痰癖卒風】生薑<sup>(一)</sup>二兩、附子<sup>(二)</sup>一兩、水五升を二升到煮

取り、二回に分服する。猪肉、冷水を忌む。(千金) 【胃虛風熱】食事不能なるには、

薑汁半盃、生地黄汁少量、蜜一匙、水二合を和して服す。(食療本草) 【唐疾寒熱】脾、

胃痰が聚つて發して寒熱となるには、生薑四兩を擣いて自然汁一酒盃を一夜露し、

發作の日の五更に北に向つて立つて飲めば直に止まる。なほ止まらぬときは再服す

る。(易簡) 【寒熱痰嗽】初期には、燒薑一塊を含咽する。(本草衍義) 【嗽の止まぬも

の】生薑五兩、飴半升を火で煎熟して食ひ盡せば癒える。段侍御はこれを用ゐて效

があつた。(初虞世必效方) 【久患欬噎】生薑汁半合、蜜一匙を煎じ、溫めて呷ふ。三服

で癒える。(外臺祕要方) 【小兒の欬嗽】生薑四兩を煎じた湯で浴する。(千金方) 【暴逆氣

上】薑二三片を嚼む。屢效があつた。(寇氏衍義) 【乾嘔厥逆】頻りに生薑を嚼む。嘔

患者の聖藥である。(二二) 【嘔吐して止まぬもの】生薑<sup>(二)</sup>二兩、醋漿<sup>(三)</sup>二合を銀器で四

合に煎じ取り、滓共に呷ふ。また服内の長蟲を殺す。(食醫心鏡) 【心痞嘔噦】心<sup>(三)</sup>下

の痞堅するには、生薑八兩、水三升を一升到煮取り、半夏五合を洗つて水五升で一



〔三〕大薑ニ中ニ作ル。

〔一〕大薑ニ生薑ヲ取  
椒ノ二字ニ作ル。  
〔二〕大薑ニ漬チ稀ニ  
作ル。

升に煮て汁を取り、共に煮て一升半にし、二回に分服する。(千金) 【反胃羸弱】兵部  
手集では、母薑二斤の搗汁で粥を作つて食ふ。○傳信適用方では、生薑を切片し、  
薑油で煎じて末にし、軟綿にその末を蘸<sup>つ</sup>けて嚼み嚥む。【霍亂で死せんとするもの】  
生薑五兩、牛兒尿一升、水四升を二升に煎じ、二回に分服すれば止まる。(梅師方) 【霍  
亂轉筋】腹に入つて死せんとするには、生薑三兩を搗き、酒一升で煮て二三沸して  
服し、同時に薑を搗いて痛處に貼る。(外臺秘要) 【霍亂腹脹】吐、下し得ぬには、生薑  
一斤、水七升を二升に煮取り、三回に分服する。(肘後方) 【腹中脹滿】薑を煨<sup>や</sup>いて綿  
で裹んで下部に納れ、冷えれば易へる。(梅師) 【胸脇滿痛】凡そ心胸、脇下に邪氣の  
結實があつて硬痛し脹滿するには、生薑一斤を搗<sup>たう</sup>潰し、汁をば取つて置き、慢に炒  
つて潤ふを待つて絹で包み、患部に置いて丁寧に熨す。冷えれば再び汁で炒つて再  
び熨す。良久<sup>しばらく</sup>してさつぱりとして寛快になる。(陶華傷寒撮法) 【大便不通】生薑を長さ  
二寸に削り、一鹽を塗つて下部に納れる。立ろに通ずる。(外臺) 【冷痢の止まぬもの】  
〔二〕生薑を煨き研つて末にし、乾薑末と等分を醋と麴で和して餠<sup>こんざん</sup>饅にし、先づ水で煮  
てまた〔一〕清飲で煮過し、停めて冷し、一日一回十四箇を吞んで粥で送下する。(食療)



【消渴飲水】乾生薑末一兩しんくきよたんじやうを鯽魚膽汁で和して梧子大の丸にし、七丸づつを米飲で服す（聖惠） 【濕熱發黃】生薑を時時に全身に擦る。その黃は自ら退く。ある方では、

いんらんがう

茵陳蒿を加へるが尤も妙である（傷寒論法）

【暴赤眼腫】宗奭曰く、古銅錢で薑を刮

り、その錢唇の汁を取つて點ける。涙が出て、今日點ければ明日癒えること疑なし。

○一には、暴風客熱で目赤く、睛痛んで腫れるを治す。臘月に取つた生薑を搗き絞つ

た汁を陰乾して粉を取り、銅青末等分を入れ、少量づつを沸湯に泡けて澄清し、溫

めて洗ふ。涙が出て妙である。【舌上の生胎】諸病の舌胎には、布を井水に染めて

抹し、後に薑片で時時に擦れば自ら去る（陶華方） 【滿口爛瘡】生薑の自然汁で頻頻

と漱いで吐く。また末にして搽るもよし。甚だ效がある。【牙齒疼痛】老生薑を互

で焙じ、枯礬末こはんまつを入れて共に擦る。ある人は日夜呻吟したが、これを用ゐて癒えた。

（普濟方） 【喉痺毒氣】生薑二斤の搗汁と蜜五合を煎じませ、一日五回、一合づつを服

す（二方） 【鳩を食つた中毒】竹雞を食つた毒（もつこ） 【鸕胡を食つた毒】方はいづれも禽部

の本條にある。【高直くわいしやくの中毒】諸藥の中毒 【狂犬の咬傷】いづれも生薑汁を飲め

ば解す（小品） 【虎に傷けられた瘡】生薑汁を内服し、外部を汁で洗つて白礬末を傅

ける。(秘覽) 【蝮蛇の整傷】 薑末を傅け、乾けば易へる。(千金) 【蜘蛛の咬傷】 薑を炮

いて切片して貼るが良し。(千金) 【刀、斧の金瘡】 生薑を嚼んで傅ける。動いてはな

らぬ。次の日には肉が生じて甚だ妙である。(扶壽方) 【手、足の閃拗】 生薑、葱白を搗

き爛らし、麴を和して炒熱して膏ふ。 【跌撲傷損】 薑汁と酒とで生麴を調へて貼る。

【あらゆる蟲の耳に入りたるとき】 薑汁少許を滴す。 【腋下狐臭】 薑汁を頻に塗れ

ば根を絶つ。 【赤、白癰風】 生薑を頻に擦るが良し。(いづれも易簡) 【兩耳の凍瘡】 生

薑の自然汁を熬つて膏にして塗る。(暇日記) 【發背の初期】 生薑一塊を炭火で炙いて

一層を刮り、一層を末にして猪膽汁で調へて塗る。(海上方) 【疔瘡腫毒】 方は白芷の

條下にある。 【諸瘡痔漏】 久しく痂を結せぬには、生薑を皮のまま大片に切り、白礬

末を塗つて炙き焦し、研細して貼る。動かしてはならぬ。良效がある。(普濟) 【産後の

血滯】 心に冲して下らぬには、生薑五兩、水八升(七)を煮て服す。 【産後の肉線】 あ

る婦人が、産後に力業をしたために長さ三四尺の肉線を垂下し、觸れば痛みが心腹に

引いて絶命せんとする状態に陥つたことがある。その時ある道人が、老薑を買はせ

て皮のまま三斤を搗き爛らし、麻油二斤を入れてよく拌せて炒乾し、先づ練つた絹

(七七)大觔ニ升字下三  
升分三ノ四字アリ、  
又服下ニ楊氏産乳ノ  
四字アリ。

五尺を折つて方結にし、それで軽く肉線を盛り起して屈曲せしめ、三圍にして産戸に納れ、かくて先の薑を絹袋に盛つて近づけて熏じ、冷えると更に換へさせた。すると一晝夜にして大半縮入し、二日にして完全に入つた。道人は『これは魏夫人が祕傳の怪病方で、ただ線を斷らせてはならぬものだ。斷れては治らない』といった。【脈溢怪症】ある者は毛竅から節次に出血して止まず、皮は鼓のやうに脹り、須臾にして目、鼻、口が氣せられて服れ合さつた。これは脈溢といふ病である。生薑の自然汁と水と各半薑を和して服せると平安になつた。(いづれも夏子益奇疾方)

### 薑皮

氣味

【辛し、涼にして毒なし】

主治

【浮腫、腹脹、痞滿を消し、

脾、胃を和し、腎を去る】(時珍)

### 附方

舊一。

【髭髮の白を抜いて黒に換へる】老生薑を刮つた皮一大升を、

久しく用ゐて油の干著いた鍋を洗はずそのままの中に入れ、氣の通らぬやうに固濟し、眞面目な人に番をさせて文武火で煎じ、火力を急にせぬやうに注意して朝から日暮まで煎じて十分である。それを研つて末にし、白きを抜いた後へ、先づ小さい物に蕪子大ほどを點けてその毛孔に入れる。或は鬚下に點けて然る後に抜いて指で

燃り入れる 三日後には黒毛を生じて神效がある 李卿はこれを用ゐて效驗があつた。(蘇頌圖經本草)

葉 氣味

【辛し、溫にして毒なし】

主治

【鱸を食つて成つた癥は、搗

汁を飲めば消する】(張機)

附方

新一

【打撲傷の瘀血】薑葉一升、當歸三兩を末にし、一日三回、溫酒

で方寸匕を服す(范汪東陽方)

乾薑 (本經中品)

和名 かんきやう  
洋名 Dry Ginger.

校正

草部より移して此に置く。

釋名

白薑 下文を見よ。

集解

弘景曰く、乾薑は、今ではただ臨海(章安に産し、數村で作るだ

けだ。蜀、漢の薑が舊は美しいものだつた。荊州には好い薑はあるが並に乾にすることが不能だ。凡そ乾薑を作る法は、水に三日淹けて皮を去り、流水中に六日間置いて更に皮を刮り去り、然る後に晒し乾し、瓦甔に入れて三日間釀して出來上る

(一) 臨海ハ草部山草類丹參ノ註ヲ見ヨ。  
(二) 章安ハ後漢ノ縣名、今ノ浙江省台州府臨海縣ノ東南百十五支里ニ在リ。  
(三) 大觀ニ數村ヲ兩

三村胖ノ四字ニ作ル。

(自)並ノ字大觀ニ據リ補入ス。

(五)大觀ニ置蓋國中謂之藥也トアリ。

(六)襄州ハ石部埋石ノ註、均州ハ草部毒

草類藜蘆ノ註ヲ見ヨ。

ものである。

頤曰く、製造法は、根を採つて長流水で洗ひ、日光に晒せば乾薑となる。漢、温、

池州のものを良しとする。陶氏の説は漢州の乾薑法だ。

時珍曰く、乾薑は母薑で造るものだ。今は江西、(六)襄、均いづれでも造つてゐる。

白く淨かな結實せるものを良しとする。故に一般に白薑といふのだ。又曰く、均薑

はすべて薬に入れる。いづれも炮やいて用うべきものだ。

### 氣味

【辛し、温にして毒なし】緒曰く、苦く辛し。好古曰く、大熱である。

保昇曰く、久しく服すれば目を暗くする。その他は生薑と同じ。時珍曰く、大清外

術に「妊婦は乾薑を食つてはならぬ。胎内を消せしめるものだ」とある。蓋しその

性が熱にして辛、散ずるものだからだ。

### 主治

【胸滿、欬逆上氣。中を温め、血を止め、汗を出し、風溼痺を逐ふ。腸滯

下痢。生のものが尤も良し】(本草)【寒冷腹痛、中惡、霍亂、脹滿、風邪、諸毒、皮膚

間の結氣。唾血を止める】(別錄)【腰腎(七)間の疼冷、冷氣を治し、血を破り、風を去

り、四肢の關節を通じ、五臟、六腑を開き、諸結脈を宣し、風毒、冷痺、夜小便多

(七)大觀ニ中ニ作ル。

（心）大觀ニ臟トニ冷  
ノ字アリ。  
（心）大觀ニ紅ヲ洪ニ  
作ル。

きを去る【（甄權）】痰を消し、氣を下し、轉筋、吐瀉、（心）腹臍、反胃、乾嘔、瘀血、  
撲損を治し、鼻、紅を止め、冷、熱の毒を解し、胃を開き、宿食を消する【（大明）】

【心下の寒痞、目睛の久赤に主效がある】（好古）

發明

元素曰く、乾薑は、氣薄く、味厚く、半沈み、半浮き、升によく、降

によく、陽中の陰である。又曰く、大辛、大熱にして陽中の陽である。その用途に  
四あり、一には心を通じ、陽を助け、二には臟腑の沈寒、痼冷を去り、三には諸經  
の寒氣を發し、四には感寒、腹痛を治す。腎中に陽なくして脈氣の絶せんとするに  
は、黑附子（心くぶし）を引として水で煎じて服す。これを薑附湯と名ける。また中焦の寒邪を  
治す。これは寒淫の勝つところをば辛を以つて散ずるのである。又、よく下焦を補  
するものだから四逆湯にこれを用ゐる。乾薑の本來は辛いものだが、炮けばやや苦  
くなる。故に止つて移らない。能く裏寒を治するはそのためであつて、附子の行て  
止らぬやうなものではない。理中湯にこれを用ゐるのはこの物が陽を回らすものだ  
からである。

李杲曰く、乾薑は、生では辛く、炮けば苦い。陽である。生では寒邪を逐ふて表



を發し、炮けば胃冷を除いて中を守る。多く用ゐれば元氣を耗散するは、辛は散ずるもので、この場合には壯火が氣を食するからである。生甘草を用ゐて緩にすべきものだ。辛、熱は裏寒を散ずるものだから、五味子と共に用ゐれば肺を溫め、人參と共に用ゐれば胃を溫める。

好古曰く、乾薑は心、脾の二經の氣分の藥である。故に心氣不足を補するのだ。或は「乾薑は辛、熱で脾を補すとはいはない。現に理中湯にこれを用ゐてあつて、泄するといふが補すと言はぬのは何故か」といふものもあるが、蓋し辛、熱は濕を燥し、脾中の寒濕、邪氣を泄するので、正氣を泄するのではない。又曰く、乾薑を服して中を治すれば必ず上に僭するものだから注意を要する。

震亨曰く、乾薑は肺中に入つて肺氣を利し、腎中に入つて下溼を燥し、肝經に入り、血藥を引いて血を生ずる。補陰の藥と共に用ゐればやはり能く血藥を引き氣分に入つて血を生ずる。故に血虛發熱、産後大熱にはこれを用ゐる。唾血、痢血を止めるには黒く炒つて用うべきものだ。血脱で、色が白くして天して澤ならず、脈の濡なるものがある。これは大寒であつて、乾薑の辛、溫で血を益し、大熱で經を溫

むべきものである。

時珍曰く、乾薑は能く血薬を引いて血分に入り、氣薬を氣分に入れ、また能く惡を去り、新を養ふ。陽生じて陰長するの意がある。故に血虚のものにこれを用ゐるのだ。凡そ一般に吐血、衄血、下血し、陰あつて陽なきものにはやはりこれを用ゐるが宜し。これは熱因熱用の從治の法である。

附方

曹十六、新十二。

【脾胃の虚冷】食事が落ちつかず、久しきに亙つて羸弱

すれば瘵となるものである。温州の白乾薑を漿水で煮透して取出し、乾して末に搗き、陳廩米で煮た粥飲で梧子大の丸にし、三五十九づつを白湯で服す。その效神の如きものだ。（蘇頌圖經） 【脾、胃虚弱】飲食が減少し、傷み易く、化し難く、無力にして肌瘦するには、乾薑を頻に研つて四兩を用ゐ、白錫を切つた塊を水に溶して鐵銚に入れて溶化したもので和して梧子大の丸にし、空心に米飲で三十丸づつを服す。

（十便方） 【頭運吐逆】胃冷で痰が生ずるものである。川乾薑を炮いて二錢半、甘草を炒つて一錢二分、水一鍾半を半に煎じ減し、累りに服用すれば效がある。（傳信適用方） 【心、脾の冷痛】胃を暖めて痰を消する二薑丸——乾薑、高良薑等分を炮いて研末

し、糊で梧子大の丸にし、三十丸づつを食後に猪皮湯で服す。（和劑局方）【心氣卒痛】

乾薑末一錢を米飲で服す。（外臺秘要）【陰陽易病】傷寒後の婦人は、たとひ病が瘥えて

も百日未滿には男子と交合してはならぬ。ために病となつて拘急し、手足が拳し、

腹痛して死せんとする危険に陷る。これを男子の場合は陰易と名け、婦人の場合

陽易と名ける。速に汗すれば瘥えるが、滿四日を経過しては望がない。乾薑四兩を

末にし、半兩づつを白湯で調へて服し、寢具を被る。汗を出して後には手、足が伸

びて瘥える。（傷寒類要方）【中寒水瀉】乾薑を炮いて末にし、粥飲で二錢を服すれば效

がある。（千金方）【寒痢青色】乾薑を大豆大に切り、米飲で六七箇づつを服す。日中

三回、夜間一回。累りに用ゐて效を得た。（肘後方）【血痢の止まぬもの】乾薑を黒く

焼いて性を存し、放冷して末にし、一錢づつを米飲で服す。神の如き妙效がある。

（姚氏集驗）

【脾寒痞疾】外臺では、乾薑、高良薑等分を末にし、一錢づつを水一盞で

七分に煎じて服す。○又、乾薑を黒く炒つて末にし、發作時に臨んで溫酒で三錢ヒ

を服す。【冷氣欬嗽】結脈するには、乾薑末半錢を熱酒で調へて服す。或は錫糖で

丸にして嚥む。（姚僧坦方）【欬嗽上氣】（二）合州の乾薑を炮き、皂莢を炮いて皮子、及

(二二)大觀ニ一二ニ作  
ル。

(二二)大觀ニ廣利方ノ  
三字アリ。  
(三)大觀ニ廣利方ナ  
千金方ニ作ル。

バ蛇ものついた部分を去り、桂心の紫色のものを皮を去り、いづれも搗き篩ふるつて等分を用ゐ、鍊つた白蜜を和して(二二)三千杵すり搗いて梧子大の丸にし、毎服三丸を嗽くの發するとき飲で服す。一日三五服。葱、麴、油で熬りつけた物を食ふことを禁ず。その效神の如きものだ。禹錫が淮南わなんにゐたとき、同寮李亞がこれで人を治してやつてゐたが、方をば示さなかつた。或る者がそれを吝をどむものとして非難すると、李は「凡そ世間では、一般に嗽を患ふものには多く冷藥を進めてゐる。この方は熱燥の藥を用ゐてあるのだから、その方を示したならば必ず服くまうとせぬだらうと思ふ。それゆゑに方をば示さずに藥だけを出してやるのだが、多くは奏效してゐる」といつた。實際試みるに確たしかにその通りであつた。(劉禹錫傳信方) 【虚勞の不眠】乾薑を末にして湯で三錢を服し、微汗を取り出す。(千金方) 【吐血して止まぬもの】乾薑を末にし、童尿で一錢を調へて服するが良し。【鼻衄の止まぬもの】乾薑を尖に削り、煨ゆいて鼻中を塞ふさげば止まる。(二二) 【鼈鼻かめびで通ぜぬもの】乾薑末を蜜で調へて鼻中を塞ふさぐ。(二二)(廣利方) 【冷涙目昏】乾薑粉一字を湯に炮うけ、點つけて洗ふ。(聖濟錄) 【赤眼澀痛】白薑末を水で調へて足心に貼るが甚だ妙である。(聖濟方) 【突然視力の缺乏するもの】母薑

を嚼んで一日六七回舌で舐める。視力の回復するを度とする。(聖濟錄) 【突然口中の痛むもの】乾薑を圓く滑に削つて背中に納れ、汁が出るときは拭ふ。なほ痛が盡きぬときは更に更へる。(千金) 【牙痛の止まぬもの】川薑を炮き、川椒と等分を末にして摻る。(御藥院方) 【斑豆厥逆】斑豆で涼藥を過多に服し、手、足が厥冷して脈の微なるには、乾薑を炮いて二錢半、粉甘草を炙いて一錢半、水二鍾を一鍾に煎じて服す。(龐安常傷寒論) 【癰疽の初期】乾薑一兩を紫に炒つて研末し、醋で調へて頭だけを殘して四圍に傅ければ自ら癒える。これは東昌の申一齋の奇方である。(諸症辨疑) 【癰癰の斂らぬもの】乾薑を末にして薑汁で作つた糊で和して劑とし、黃丹を衣にかけ、毎日瘡の大小に隨つて内にその藥を入れる。膿を追ひ盡して肉を生ずるものだ。口の合するを度とする。もし合せぬときは葱白汁で大黃末を調へて揉れば癒える。(救急方) 【虎、狼に傷けられたとき】乾薑末を傅ける。(肘後方) 【狂犬の咬傷】乾薑末二匕を水で服す。生薑汁で服するも良し。并に薑を炙き熱して熨してからそれを傅ければ定まる。(廣川方)

#### 附 錄

天竺乾薑拾遺

藏器曰く、味辛し、溫にして毒なし。主治は冷氣寒



(二) 胡乾薑 門圖ハ印度ノ一地方チ指スモノカ。

(一) 牧野云フ、今日我邦デハ一般ニ栽培セラレテ一ノ蔬トナツテキルガ、原トハ支那カラ傳ヘタモノデアラウ、原標ハ地中海地方ノ產デアルガ、其レハ花草トシテ今日我邦デモ作ツテキル、之レヲばなしゆんさくト稱スル其業ハ蔬ノしゆんさくヨリハ細裂シテキル。

中、宿食不消、腹脹、下痢、腰背痛、疥癬氣塊、惡血積聚(一) 門圖ハ羅門國ニ生ずる。一名胡乾薑といふ 形狀は薑に似て小さく、黄色である。

(一) 同 蒿 (宋嘉祐)

和名 しゆんさく  
學名 *Chrysanthemum coronarium*, L.  
var. *spiduosum*, Bailey.  
科名 さく科(菊科)

釋名

蓬蒿 時珍曰く、形狀も氣も蓬蒿と同じだからかく名けたのだ。

集解

機曰く、本草に形狀の記述がなく、後世一般に識るものがない。

時珍曰く、同蒿は八九月に種を下し、冬、



〔蒿 同〕

春に肥えた莖を採つて食ふ。花、葉は微に白蒿に似たもので、その味は辛く甘く、蒿の臭氣があり、四月莖が起つて高さ二尺餘になり、深黄色の花を開く。その花の形狀は單瓣の菊花のやうで、一箇の花に百近くの子を結び、毬になつて地松、及び苦賣子のやうだ。最も



(二)大觀ニ水ニ作ル。

(一)牧野云フ、我邦ニ之レサキ品デアル先麗之レサやまにんじん并ニいぶきばうふうニ充テシハ誤デアリ、敎庭本草ニ邪蒿ノ圖ガアル、植物名實圖考ノ圖ハ救荒本草ノ圖ヲ基トシテ補筆シタモノデアール、其葉繁ク細裂シテ瞥見スレバくそにんじんノ如ク見ユレ

繁茂し易いものである。この菜は古からあつたもので、孫思邈は千金方の菜類に記載し、宋の嘉祐中に至つて始めて本草に補入したもので、現に一般に通常食品としてあるものだ。汪機はそれを識らずして勝手にかやうな記事を編述したのであつて、誠に笑止なことである。

氣味

【甘く辛し、平にして毒なし】禹錫曰く、多く食へば風氣を動じ、人

の心を薰<sup>くん</sup>し、人をして氣滿せしめる。

主治

【心氣を安じ、脾、胃を養ひ、痰

飲を消し、腸、胃を利す】(思邈)

(二)邪蒿 (宋嘉祐)

和名無シ  
學名未詳  
科名繖形科



〔蒿 邪〕

釋名

時珍曰く、この蒿は葉の紋がみな邪だから

かく名けたのだ。

集解

藏器曰く、邪蒿は根、莖が青蒿に似て細く

軟だ。

ド左ニハアラズ、松村氏ノ名彙ニ其品ト同定シテアルガ非デアル。

時珍曰く、三四月に苗が生え、葉は青蒿に似て色が淺く、臭くない。根、葉いづれも茹にし得る。

氣味

【辛し、溫、平にして毒なし】 詵曰く、生で食へば微し風を動ずる。

羹にして食ふが良し。胡荽と共に食つてはならぬ。汗に臭氣があるやうになる。

主治

【胸膈中の臭爛惡邪の氣。腸、胃を利し、血脈を通じ、不足の氣を續

ぐ】(孟詵)

【煮熟して醬醋を和して食へば、五臟の惡邪氣のために穀食を厭ふものを

治し、脾、胃、腸癖、大渴熱中、暴疾、惡瘡を治す】(食醫心鑑)

胡荽 (宋嘉祐)

和名 こゑんどうろ

學名 *Coriandrum sativum*, L.  
科名 繖形科

釋名

香荽 (拾遺)

胡荽 (外臺)

蘼荽

時珍曰く、荽を許氏の説文には菹と

(一) 牧野云フ、本品ハ地中海地方東部ノ原産デアルガ、今ハ諸處ニ栽培セラレテキル、支那デハ能ク香味料トシテ使用セラレテキルガ、我邦デハ餘リ顧ミラレナイ故ニ邦内ニ餘リ見ル事ガナイ、こゑんどうろハ葡語ノ coentro カラ來タモ

書いて『菹の屬であつて、口を香しからしめるものだ』といつてある。これは荽が柔く葉が細くして根に鬚が多く、綏綏然たるものだ。張騫が西域に使したとき始めて種を持ち歸つたといふので胡荽といつたのだ。今は俗に蘼荽と呼ぶ。蘼とは荽、

ノ  
デ  
ア  
ル  
○

(三) 石勒ハ晉ノ五胡

ノ一後趙ノ主ナリ。

初メ并州ニ在ツテ

トナル。

(三) 井汾ハ山西省ノ

中  
部  
地  
方

葉の布散した有様である。俗に芫花げんくわの芫の字を書くは正しくない。

藏器曰く、(三)石勒せきりくは胡の字を諱いんだところから、(三)并へい汾ぶん地方では胡荽を香荽と

呼んだ

## 集解

時珍曰く、胡荽は處處で栽培する。八月種を下す。晦日が尤も良し。

初生には莖が柔く、葉が圓く、葉に花岐があり、根は軟で白い。冬、春に採る。香

美にして食へるものだ。また麩にするも

よし、道家では五<sup>ニ</sup>革<sup>クン</sup>の一に數へてある。

立夏の後に細い花が簇むらつて開き、  
芹菜花きんさいくわ

のやうで淡紫色だ。五月に子を収める。

子は大麻子のやうで、やはり辛く香しい。

按ずるに、賈思勰の齊民要術に『六七月

に種を蒔けば冬の竟るまで食へる。春期

に子を援<sup>たす</sup>んで水を沃<sup>よく</sup>げば芽種が生えるが

それは小さいもので、食品に供するだけだ』とある。王禎の農書には『胡荽は蔬菜



〔葵 胡〕

中でも子と葉といづれも用ゐ得るもので、生、熟いづれでも食へる。甚だ世に益あるものだ。肥地に種ゑるがよし」とある。

〔正誤〕

李廷飛曰く、胡葵は蕎子である。

吳瑞曰く、胡葵は俗に蕎子と呼ぶもので、根、苗は蒜のやうだ。

時珍曰く、蕎子、即ち蕎子とは薤のことだ。李、吳二氏がいづれも胡葵としたのは誤である。

根 葉

氣味

【辛し、溫にして微毒あり】 詵曰く、平、微寒にして毒なし、

生菜に和して食へる。この物は葷菜であつて、人の精神を損ずるものだ。華佗は『胡臭、口臭、蠶齒、及び脚氣、金瘡の人はいづれも食つてはならぬ。病が更にますます甚しくなる』といつた。藏器曰く、久しく食へば人をして多く忘れしめる。根は痢疾を發する。斜蒿と共に食つてはならぬ。人をして汗臭となり、難産せしめる。時珍曰く、凡そ一切の補藥、及び藥中に白朮、牡丹のあるものを服したものはこれを食つてはならぬ。石鍾乳を伏す。

主治

【穀物を消化し、五臓を治し、不足を補し、大、小腸を利し、小腹の氣

を通じ、四肢の熱を抜き、頭痛を止め、沙藪（さく）を療ずる。豌豆瘡の出ぬものは、酒にして、飲めば立ちに出る。心瘡（しんそう）に通ずるものだ。【嘉祐】「筋脈を補し、人をして能く食せしめ、腸風を治す。熱餅で裹んで食ふが甚だ良し」【孟詵】「諸菜と合せて食へば氣が香しく、人の口を爽ならしめ、飛尸（ひし）、鬼疰（きと）、蠱毒を辟る」【吳瑞】「魚肉の毒を辟ける」【寧原】

發 明

時珍曰く、胡荽は辛く、溫にして香が竄（ざん）するもので、内には心脾に通じ、外には四肢に達し、能く一切の不正の氣を辟ける。故に痘瘡が出て爽快ならぬものを能く發する。諸瘡はみな心火に屬し、營血は内に脾に攝するもので、心、脾の氣は芳香を得れば運行し、臭惡を得れば壅滯（ようへい）するものだからである。按ずるに、楊士瀛の直指方に「痘疹の不快なるには、胡荽酒を飲ませて惡氣を辟けるが宜く、床、帳の上下、左右にみなこれを掛けて汗氣、胡臭、天癸（てんき）、淫佚（いんいつ）の氣を禦（ご）くが宜し。専ら穢惡（あふ）の必ず在るべきところに應ずるものだ。若し病兒が虛弱なる場合、及び天候が陰寒なる場合には、これを用ゐるが最も妙である。しかしその病兒が壯實である場合、及び春、夏の晴れて暖に陽氣の發越する時期に酒麴を加へては、虐を助け、

火を以て火を益し、胃中の熱が熾になり、毒血が聚畜し、ために變じて黑陷となるものだから慎重な注意を要する

附方

舊五、新四。

【癰疽の不快】胡荽二兩を切り、酒二大盞で煎沸してそ

れを沃ぎ、物で蓋定して氣の洩れぬやうにし、冷えるを候つて滓を去り、微しづつ含んで項、背から足まで悉くそれを噴く。頭、顔に噴いてはならぬ（經驗後方）

【熱氣結滯】年を経て數々發するには、胡荽半斤を五月五日に採つて陰乾し、水七升で

一升半に煮取り、滓を去つて分服する。なほ瘡えぬときは更に服す。春、夏は葉を、

秋、冬は根、莖をいづれも用ゐる（必效方）

【孩子の赤丹】胡荽汁を塗る（譚氏方）

【顔面の黑子】胡荽の煎湯で日毎に洗ふ（小說）

【産後に乳なきもの】乾胡荽の煎湯を飲

むが效がある（經驗方）

【小便不通】胡荽二兩、葵根一握、水二升を一升に煎じ、滑

石末一兩を入れて三四回に分服する（聖濟總錄）

【肛門脱出】胡荽を切つて一升を燒

き、その煙で熏ずれば入る（子母秘錄）

【蠱の中毒を解す】胡荽根の搗汁半升を酒に

和して服す。立ろに下つて神驗がある（必效方）

【蛇虺の螫傷】胡荽苗、合口椒等分

を搗いて塗る。（千金方）

（五）大觀ニ三二ノ二  
字ニ作ル。



(子) 木村(廉)曰ク、  
 こゑんどろノ果實ニ  
 ハ約二ノ精油ヲ含  
 有シ、其大部分ハ「デ  
 ルタリナロール」ニ  
 シテ其他「ビネン」、  
 「アベンチン」、「テル  
 ビネン」、「バラシモ  
 ール」及「リナロー  
 ル」、「ボルネロール」  
 等ノ醗酸「エステル」  
 等ヲ含有ス、未實果  
 實及全草ハかめむし  
 ニ類スル臭氣アリ、  
 成熟スルニ從ヒ此臭  
 氣ハ消失シ芳香ヲ有  
 ス。至ル。  
 来、英、傳藥局方ニハ  
 胡荽實ヲ健胃、驅風  
 祛痰藥トシ一日用量  
 二・六瓦煎劑トス。  
 (子) 大觀ニ味ノ字ナ  
 シ。

子 氣 味

【辛く酸し、平にして毒なし】炒つて用ゐる。主 治 【殺を  
 消し、食を能くする】(思遷) 【蠱毒、五疳、及び肉食の中毒で血を吐下するには、  
 煮汁を冷服する。又、油で煎じて小兒の禿瘡に塗る】(藏器) 【痘疹を發し、魚腥を  
 殺す】(時珍)

附 方

舊三、新四。【諸肉食の毒】血を吐下して止まず、痿黃(わう)するには、胡荽子  
 一升を煮て發裂せしめ、汁を取つて半升を冷服する。晝夜各一服すれば止まる。(食  
 療本草) 【腸風下血】胡荽子を生菜に和し、熱餅(なつぱ)で裹んで食ふ。(普濟方) 【痢、及び瀉  
 血】胡荽子一合を炒つて末に擣き、每服二錢を、赤痢には砂糖水で服し、白痢には  
 薑湯で服し、瀉血には白湯で服す。一日二回。(普濟方) 【五疳の痛むもの】胡荽子を  
 炒つて末にし、二錢づつを空心に溫酒で服す。數服で效が現れる。(海上仙方) 【痔漏  
 脱肛】胡荽子一升、栗糠一升、乳香少量を小口瓶に入れ、烟に焼いて熏する。(備門事  
 異) 【腸頭の挺出】(こゝろ) 秋、冬は胡荽子を擣いて醋で煮て熨す。甚だ效がある。(孟詵食療本  
 草) 【牙齒の疼痛】胡荽子、即ち胡荽子五升を水五升で一升に煮取つて含漱する。  
 (外藥紀事)

(二) 胡蘿蔔 (綱目)

和名 にんじん  
學名 *Daucus Carota*, L., var. *saliva*, DC.  
科名 繖形科

釋名

時珍曰く、元時代に始めて胡地から來たもので、氣味は微に蘿蔔に似てゐるところからかく名けたのだ。

集解

時珍曰く、胡蘿蔔は今は北方の地、山東で多く種ふ、(三) 淮楚でも種ふるものがある。八月に種を下し、邪蒿のやうな苗が生え、莖は肥え、白毛があり、辛臭が蒿のやうで食へない。冬期に根を掘り、それは生、熟いづれも啖へるもので、果蔬の用を兼ねる。根は黄、赤の二種あつて微に蒿の氣を帯び、長さ五六寸、太さは一握ほどのものもあり、形狀は掘つたばかりの新鮮な地黄、及び羊蹄根に似たものだ。三四月に莖の高さ二三尺になつて細かい白花を開き、それが傘のやうに攢簇して蛇牀の花に似てゐる。子もやはり蛇牀子のやうで、やや長くして毛があり、褐色だ。又、蒔蘿子のやうで、やはり食品の調和に用ゐる。按ずるに、周憲王の救荒本草に『野胡蘿蔔は苗、葉、花、實いづれも家胡蘿蔔と同じだが、ただ根が細く小

(二) 牧野云フ、にんじんハ其根形ガ彼ノ人參(おたねにんじん)ニ似テキルノデサウ云フノデアラウ元來ハ歐洲ノ原産デ同洲ニハ野生モアル栽培シタモノハ其根肥大トナツテ食用ニ適シ、久シク各地デ作ラレデキル結果種種ノ園藝品種ガアル。

(三) 淮楚ハ湖北以東揚子江北岸ノ地ヲ指ス。

(三) 交河ハ山西省寧武縣ノ西ニ源ヲ發シテ桑乾河ニ注グ。



〔胡 蘿 蔔〕

さく、味が甘い。生で食ひ蒸して食ふいづれもよし。花、子はいづれも蛇狀より大きい」とある。又、金幼孜の北征錄には「交河の北に沙蘿蔔といふがある。根の長さ二尺ばかり、大なるは徑一寸ほどあり、下に岐れて筋ほどの小さいものが生えてゐる。その色は

黄白で、氣味は辛くして微し苦い。やはり蘿蔔の氣に似てゐる」とある。これはいづれも胡蘿蔔の類のものだ。

根 (一) 氣 味 【甘く辛し、微温にして毒なし】 主 治 【氣を下し、中を補し、

胸膈、腸、胃を利し、五藏を安じ、人をして健食ならしめ、益あつて損なし】(時珍)

(五) 子 (六) 主 治 【久痢】(時珍)

(四) 本村(康)曰ク、にんじんハ歐洲原産ニシテ、久國ニ栽培セラレ品種甚ダ多シにんじんノ異實ヲ鶴

ニ出スモノアレドモ實ハ誤リニシテ、鶴誤シ「シナ花 Antemissin Chin. Hoeg. ナ正條トス。

食用植物誌ニヨレバ、にんじん根ハ太邨産水分八九・一二、蛋白質一・二五、脂肪〇・三五、無窒素物七・四一、纖維一・一〇、灰分〇・七七、歐洲産八九・七九、蛋白質一・二三、脂肪〇・三〇、無窒素物九・一六、纖維一・四九、灰分一・〇二、歐洲産ノ無窒素物九・一六中蔗糖二・

一、果糖四・〇三中含ム、ソノ橙赤色ヲ呈スルハソノ含有スル「カロチン」ニヨル。  
 (金)木村(康)曰ク、子ト云フハ果實ナリ、果實中ニハ〇・六―・六ノ揮發油ヲ含ム、該揮發油ハ微量ノ「イソプッテル」酸ト「バミルチン」酸一四%ノ右施「ビネン」及「ビタ旋」リモネン、七・九%ノ「ダウコール」及「半」テルピン類ノ香量ヲ含ム。西洋種にんじん(通稱三寸にんじん)ノ果實ノ揮發油〇・六%中「新」セスキテルベンアルコールヲ發見シ、「カロトール」ト命名ス。又舊來我國ニ栽培セラルル所謂大長種ノ果實ノ揮發油(一・六%)中「アザロニン」、「ビザボレン」及微量ノ「カロトール」ヲ發見ス。  
 (金)木村(康)曰ク、民間ニ湯火傷ニ根ヲ卸シテソノ汁ヲ數回塗レバ妙效アリトイフ。

(一)牧野云フ、本品ハ支那ト日本トが原產地デアル、我邦デハ往住之レナ水中ニ作ツテ蔬トシテ市場ニ出シテキル。

## 水 薺

音は芹(キン) (本經下品)  
 である。

和名 セリ  
 學名 *Oenanthe silionifera*, DC.  
 科名 繖形科

### 釋名

芹菜(別錄) 水英(本經) 楚葵

弘景曰く、薺の字は俗に芹の字に書


く、その主治の點から論ずれば上品に編入さるべきものである。下品に編入したのは如何なる意味か解らない。二月、三月に英となつたときには薺にし、熟してからは淪<sup>に</sup>て食ふ。故に水英と名けたのだ。

時珍曰く、薺は薺<sup>きん</sup>と書くが正しく、甲<sup>きう</sup>、薺に从ふ諧聲である。後世字劃を省いて

芹と書くは斤に从ふので、やはり諧聲だ。その性は冷、滑にして葵のやうだ。故に爾雅にはこれを楚葵といひ、呂氏春秋には「菜の美なるものに雲夢の芹あり」とあ

(二) 蕪州ハ草部陽草  
類文ノ註ヲ見ヨ。

つて、雲夢は楚の地である。楚に<sup>(三)</sup>蕪州、蕪縣なる名地があつて俱に音は洪(キ)であるが、羅願の爾雅翼に『その地に芹を多く産する。故にその文字は芹に从ふので、



〔蕪 水〕  
—— 芹 ——

蕪はやはり音芹(キン)である。徐鍇注説文に蕪の字を以、蕪に从つてあるが、諸書に蕪の字は無い。ただ説文に別に蕪の字を出して音銀(ギン)としてあるがこれは次第に誤を承けたものではないかと思ふ』とある。これに據ると、蕪の字もやはり蕪に从つて蕪の字に書

くが正しいのであらう。

〔集 解〕

別錄に曰く、水蕪は南海の池澤に生ずる。

恭曰く、水芹、即ち芹菜である。兩種あつて、荻芹は色白く、根を取る。赤芹は莖、葉を取る。いづれも茹にしまた生菜として食へる。

保井曰く、芹は水中に生ずる。葉は芎藭に似たもので、花は白色で實がない。根



もやはり白色だ。

説曰く、水芹の黒滑の地に生えたものは、食つて見て高田のもののやうに人體に宜くはない。酒、醬中に置けば香美になる。高田のものをば白芹と名ける。その他の田に生えるものにはいづれも蟲子が葉の間にゐて、視ても容易に目につかぬが、食へば患をなすものだ。

弘景曰く、また渣芹さきんといふがあつて、生菜にもなれば生でも啖へる。

時珍曰く、芹には水芹と旱芹とあつて、水芹は江湖の陂澤はたきの涯きに生え、旱芹は平地に生え、赤、白の二種ある。二月に苗が生え、その葉は節に對して生えて芎藭に似てゐる。莖は節、稜があつて中が空だ。その氣は芬芳ふんほうなものである。五月に蛇牀花のやうな細かな白花を開く。楚地方では採つて饑を濟すくふ。なかなか有用なものだ。詩に『鬻沸ひつふつたる檻泉こい、言に其の芹を采とる』とあり、杜甫の詩に『飯には煮る青泥坊底の芹』といひ、又『香芹碧澗の羹』とあるは、いづれも芹の功を賞美したものだ。而るに列子が『卿豪芹を嘗なめて口を蜚てつし腹を慘いたましむ』といったのは、蓋し芹を食ふ適當な方法を知らなかつたのだ。



(三) 木村(康)曰ク、  
(成分)内地産セリハ  
水分九三・六〇、蛋白  
質二・〇一、脂肪〇・  
一三、無窒素物三・二  
二、灰分一・〇四。  
臺灣産水分九五・四  
九三、蛋白質〇・五三  
六、脂肪〇・一四八、  
無窒素物二・六一四、  
灰分一・二〇五。

### 莖 氣 味

【甘し、平にして毒なし】思邈曰く、苦く酸し、冷、瀋にして毒なし。詵曰く、醋で和して食へば齒を損ずる。鼈猴には食つてはならぬ。李廷飛曰く、赤芹は人に害があるから食つてはならぬ。

### 主 治

【婦人の赤沃。血を止め、精を養ひ、血脈を保し、氣を益し、人體を肥健ならしめ、食を嗜ましめる】(本草) 【伏熱を去る。石藥の毒を殺すには搗汁を服す】(孟詵)

【汁を飲めば小兒の暴熱、大人の酒後の熱、鼻塞、身熱を去り、頭中風熱を去り、口齒を利し、大、小腸を利す】(岐器) 【煩渴、崩中帶下、五種の黃病を治す】(大明)

### 發 明

張仲景曰く、春、秋の二時には龍が精を帯びて芹菜中に入るものだ。

人が誤つて食へば病となり、顔が青く、手が青く、腹が妊娠のやうに滿し、痛み忍び難い。これを蛟龍病といふ。いづれも硬錫二三升を一日三回服す。蜥蜴を吐出して瘥える。

時珍曰く、芹菜は水涯に生ずるものだ。蛟龍は變化測り難いものとはいひながら、その精をこの中に入れるとは思はれない。これは大抵蜥蜴、虺、蛇の類が春、夏の頃に此の中に精を遺すものだからさうなるのだ。且つ蛇は喜んで芹を嗜むことが特

にそれを立證してゐる。別に馬芹といふがあるが、それは後章に掲げる。

【附方】

萬一、新二。

【小兒の吐瀉】芹菜を細に切つて煮て汁を飲む。多少に拘

らぬ（子母秘傳）【小便淋痛】根の白い水芹菜を葉を去り、搗いてその汁を井水に和し

て服す。（聖惠方）【小便出血】水芹の搗汁を日に六七合服す。（聖惠方）

花 氣 味

【苦し、寒にして毒なし】

【主治】【脈溢】（蘇恭）

〔〕 莖

音は勤（キン）  
てある

（唐本草）

和名 未詳  
學名 未詳  
科名 繖形科

釋 名

苦莖（爾雅）

莖葵（唐本）

旱芹（綱目）

禹錫曰く、爾雅に「藺は苦莖

なり」とあり、郭璞は「即ち莖葵である。本草に「味甘し」とあるが、此には苦莖

といつてある。古人は言葉を顛倒したもので、甘草を大苦といつたやうなものだ』

といつてある。

時珍曰く、その性は滑にして葵のやうだから葵なる名稱を呼ばれたのだ。

集 解

恭曰く、莖菜は野生のもので人が栽培するものではない。葉は藺菜に

（）牧野云フ、此莖  
即チ旱芹ハ先輩之レ  
ヲ陸生ノ芹トシ、ハ  
ナゲゼリト訓シテア  
レドモ其邊頗ル明瞭  
ヲ缺イテ居ル、私ハ  
此旱芹ハゼリチ圃ニ  
作ツタモノデナク、  
何カ別ノ種ト思ヘド  
モ其植物ハ不明デア  
ル、植物名實圖考ニ  
其圖アレドモ何ノ種  
カ判明セヌ、ゼリノ  
葉ニ似テハキレド何  
カ別種ノ者デハナイ

カト思フ、支那デ實  
地ニ就キ證索セバ分  
ル事ト思フ。集解ノ  
文中ニハすみれヲシ  
イ處モアレドモ判然  
シナイ。

(二)大觀ニ殺サ散ニ  
作ル。

似て花は紫色だ。

禹錫曰く、説文に『葦は、根は薺<sup>せ</sup>のやう、葉は細柳のやう、子は米のやうだ。蒸<sup>じょう</sup>灼<sup>しやく</sup>して食へば甘く滑かだ』とある。内則に『葦、荳<sup>かん</sup>、粉<sup>かん</sup>、榆<sup>ゆ</sup>』とあるがそれである。時珍曰く、これは旱芹のことである。その性は滑利するものだ。故に洪彛俞の賦に『烈に椒、桂あり、滑に葦、榆あり』といつたのである。黃花の一種には毒があつて人を殺す。即ち毛芹である。草部の毛茛<sup>まうこん</sup>の條を見よ。又、烏菴も葦と名ける有毒物だ。各本條下を見よ。

### 菜 氣 味

【甘し、寒にして毒なし】

### 主 治

【搗汁で馬毒瘡を洗ひ、并に

服す。又、蛇、蠍<sup>せつ</sup>の毒、及び癰腫に塗る。唐本】『久しく食へば心下の煩熱を除き、寒熱鼠瘻、癰癰生瘡、結核聚氣に主效があり、瘀血<sup>おけつ</sup>を下し、霍亂を止める。また生で搗いた汁半升を服すれば、能く鬼毒を<sup>三</sup>殺して吐出する。』(孟詵)

### 發 明

説曰く、葦葉は霍亂を止めることが香薷<sup>かうじゆ</sup>と同功だ。香薷、即ち香薷<sup>かうじゆ</sup>である。

### 附 方

舊二、新一『結核氣』葦葉を日光で乾して末にし、油で煎じて膏にし、

一日三五回摩れば瘡える。(孟詵食療) 【濕熱氣】 旱芹菜を日光で乾して末にし、糊で梧子大の丸にし、四十丸づつを空心に溫酒で服す。大いにあらゆる蟲の毒を殺す。(壽域神方) 【蛇咬瘡】 生で杵いた葦汁を塗る。(萬畢術)

紫 葦

音は芹(キン)である。

(宋圖經)

和名 未詳  
學名 未詳  
科名 繖形科

釋 名

赤芹(綱目)

蜀芹(圖經)

楚葵(同上)

苔菜(同上)

水葡萄菜

時珍曰

く、葦、蘄、芹、蘄の四字は同一意味である。左に詳記する。

集 解

頤曰く、紫葦は江南、

吳興郡に生ずる。

淮南では楚葵と名け、

晉陵郡では水葡萄菜と名ける。

春郡では蜀芹と名け、豫章郡では苔菜と名け、晉陵郡では水葡萄菜と名ける。

時珍曰く、蘇頌の説は唐の玄宗天寶單方の記載から出たもので、紫葦の形狀に就いての説明が缺けてゐる。今按ずるに、軒轅述寶藏論に『赤芹、即ち紫芹であつて、

水濱に生じ、葉の形は赤芍藥のやうで色青く、長さ三寸ばかり、葉の表面に黃斑があり、味は苦く澀い。その汁は雌を煮、汞を制し、硃砂を伏し、三黃を搗にする。


(一) 牧野云フ、植物名實圖考ニ據レバ、セリニ似テ大形ナ織形科品デアルガ何ノ種カ明ラメ難イ、又本草綱目啓蒙ニ之レヲむらさきげまん一名ヤふげまん(Corydalis, insana, Poir.)ニ充テシハ、中ニ苦心ノ跡ガ見ユルカ果シテ此種カ不明ナル。

(二) 吳興郡ハ鱗蕪龜鼈類ニ註ヲ見ヨ。

(三) 宜春郡ハ隋ニ置キ、唐ニ袁州ニ改ム、今ノ江西省宜春縣ノ地ナリ。豫章郡ハ石部石脂ノ註ヲ見ヨ。

(四) 管陵郡ハ管ニ置  
ク、今ノ江蘇省武進  
縣ソノ治ナリ。

(五) 太行山ハ石部石  
硫黄ノ註、王屋山ハ  
同部太一餘粮ノ註ヲ  
見ヨ。



〔莖 紫〕

號して起貧草といふ』とあり、又、土宿眞君の本草には『赤芹は陰厓の陂澤、水に近き石間に生え、形狀は赤芍藥に類し、その葉は深緑で背が甚だ赤く、莖、葉は蕎麥に似て、花は紅くして美しい。結實もやはり貳蕎麥ひげ蕎麥のやうだ。その根は蜘蛛に似て、嚼めば酸く苦くして澀い。江淮地方では三四月に苗を採つて蔬菜として食ふ。南方には存外稀で、五太行、王屋の諸山に最も多い』とある。

苗 氣 味

【酸く、平にして微毒あり】

花 氣 味

【酸し、微温にして毒なし】

主 治

【大人、小兒の脱肛だつこう】(蘇頌)

附 方

舊一

【脱肛】凡そ大人、小兒の脱肛は、天候の冷氣が續き、及び冷えた食物を喫つて暴痢して止まぬ結果下脱するものだ。久しく治療しても瘥えぬには、

春期中に紫莖花二斤を採收して曝乾して散にし、磁毛末七兩と和して研細し、それを肛上に塗つて納入し、別人をして冷水を顔にふ灑かせれば腸中に吸入する。毎日一



回藥を塗つて顔に喫けば六七回に過ぎずして瘥える。又、熱酒半升で散一方寸匕を和し、空腹に服す。一日再服し、漸次に二方寸匕まで増加し、瘥えるを度とする。五歳以下の小兒の場合には、杏子半箇きやうしほどを酒で和して服す。生、冷の物、陳倉米等を忌む。(天寶單方)

(二) 馬

蘄

音は芹(キン) べある。

(唐本草)

和名 しやく  
學名 *Anthriscus sylvestris*, Hoffm.  
科名 繖形科

(一) 牧野云フ、植物名實圖考ニ圖説ガアル、本草綱目啓蒙ニハ詳ナラズトシデアレドモ私ハ之レヲシヤクト判定シタ、此品ハ我邦デモ處ニヨリ食用トスル。

釋名

牛蘄(爾雅)

胡芹(通志)

野茴香(綱目)

時珍曰く、凡そ物の大なる

ものは多く馬の字を冠して呼ぶ。この草は芹に似て大きいからかく呼ばれるのだ。俗に野茴香やうわいかうと稱するはその氣味、子の形が微に似てゐるからである。金光明經三十二品香藥にこれを葉婆あふら爾にといつてある。

集解

恭曰く、馬蘄ばきんは水澤の傍に生ずる。苗は鬼針、荼菜てんさい等に似て、嫩ななめいときは食へる。花は青白色、子は黄黒色で防風子に似たものだ。食味を調へるに用ゐる。香は橘皮に似て苦味がない。



保昇<sup>〇</sup>曰く、花は芹花のやう、子は防風子のやうで扁<sup>ひらた</sup>く大きい、爾雅に「葵<sup>かう</sup>は牛薺なり」とあり、孫炎の釋に『芹に似て葉が細く鋭く、菜として食へるものだ。一名

葵、一名馬薺といひ、子は薬に入れて用ゐる』とある。



〔薺 馬〕

時珍<sup>〇</sup>曰く、馬薺と芹とは同類中の異種で、處處の卑濕の地にある。三四月に苗が生え、一本に叢生し、蒿<sup>もろじよう</sup>のやうで蒙茸<sup>もうじよう</sup>たる白毛があり、嫩<sup>じよう</sup>いときは茹<sup>じゆ</sup>にして食

へる。葉は水芹に似て微し小さく、芎藭<sup>こんきう</sup>の葉に似て色が深い。五六月に碎小な花を開き、攢<sup>さんざく</sup>簇<sup>さく</sup>して蛇牀<sup>さんざく</sup>、及び蒔蘿<sup>しきら</sup>のやうだ。色は青白である。結實もやはり蒔蘿の子に似てゐるが、ただ色が黒くして重いだけだ。その根は白色で長さは一尺ほどあり、氣はやはり香しいが堅硬で食へない。蘇恭<sup>そこう</sup>の所謂鬼針<sup>きささぎ</sup>は鬼釵草<sup>きささくさ</sup>のことで、莖は四角、極、葉、子は釵脚<sup>さしあし</sup>に似て、針のやうに人の衣服に著くものだ。これとはやや異ふ。

苗 氣味

【甘く辛し、溫にして毒なし】

主治

【脾、胃を益し、胸膈を

利し、冷氣を去る。茹にして食ふ。(時珍)

子 氣味

【甘く辛し、溫にして毒なし】

主治

【心腹脹滿。胃を開き、

氣を下し、食物を消化する。調味に用ゐる。(唐本)

【炒り研つて醋で服すれば卒心痛

を治し、人をして睡を得せしめる。(孟詵)

【中を溫め、脾を暖め、反胃を治す。(時珍)

附方

新一。

【慢脾驚風】

馬芹子、丁香、白

蠶

等分を末にし、一錢づつ

を、炙いた橘皮の煎湯で服す。これを醒脾散と名ける。(普濟方)

二 懷香

(唐本草)

和名 うめきやう  
學名 *E. officinale* vulgare, Gaertn.  
科名 繖形科

校正

草部より此に移し入る。

釋名

茴香

八月珠

頤曰く、懷香は、北方では一般に二茴香と呼ぶ。發育

が近いからだ。弘景曰く、臭肉を煮る場合に少量を投ずれば、臭氣がなくなり、醬

の臭敗したものに末を入れるとやはり香しくなる。故に茴香と名けたのだ。時珍曰

く、俚俗に多くこれを袴、衽の中に懷て咀嚼する風習がある。懷香なる名稱は或は

在ル。  
(二)大觀ニ茴上土字アリ。

種 *Illicium verum*, Hook. fil. ト云フモノデアル、我邦ヘハ未ダ其生木ガ來テキナイガ其實ハ藥鋪ニ在ル。


(三) 交廣へ交州、廣州。廣東省以南ノ地ヲ指ス。

(四) 川トハ四川省ノ地ヲ指ス。

此から出たものではないかと思ふ。

集 解

頌曰く、今は(三)交廣、諸番、及び近郡にいづれもあるが、薬用には多く諸番からの舶来品を用ゐる。或は、近い地方のものやうに功力がないともいふ。



〔香 苗〕

三月葉が生え、老胡荽らうこすゐに似て極めて疎細で叢をなし、五月になると粗い莖が出て高さ三四尺になり、七月に花が著き、その花は頭が傘蓋さんがいのやうで黄色だ。結實は麥ほどで小さく、色が青い。北方の地では土茴香と呼び、八九月に實を採つて陰乾する。

現に近道では人家の庭園や畑に種うゑゑるものが甚だ多い。(四)川地方では多くその莖、葉を煮て食ふ。

宗奭そうせき曰く、老胡荽に似てゐるといふは誤だ。胡荽の葉は蛇牀のやうで、葉とはいふもののただ散じた絲髪のやうで、特に諸草と異ふものだ。

〔五〕寧夏ハ石部馬騰ノ註ヲ見ヨ。

〔六〕左右江嗣ハ西南地方蠻族ノ部落。禽部林禽類鸚鵡ノ註參照。

〔七〕木村(庚)曰ク、果實ハ精油三—八%ヲ含有シ、其主成分ハ「アネトール」ニシテ五〇—六〇%ヲ含ム、其他「ソエンヒヨ」少量ノ右旋「ビネン」シ「ザベランテン」アニスアルデヒド」等ヲ含有ス。

〔藥用〕茴香油ヲ製ス

時珍曰く、茴香は宿根が深く、冬に苗が生えて叢になり、莖が肥え葉は絲のやうで、五六月に花を開く。その花は蛇牀の花のやうで黄色だ。結子は大きい麥粒ほどで、軽くして細稜がある。俗に大茴香と呼ぶものだ。今はただ寧夏（せいけい）の産だけを第一とし、その他の地に産する小さいものをば小茴香と呼ぶ。外國から舶來するものは、實の大きい舶實ほどあつて、裂けて八瓣となり、一瓣が一枚で、大きい豆ほど、色は黃褐だ。仁があつて味が更に甜い。俗にこれを舶茴香と呼び、また八角茴香といふ。廣西の左右江（さうかう）の嗣中にもあつて、形や色は中國の茴香と迥に別だが、ただ氣味が同じである。北方人はこれを酒のつまにして嚼む。

### 子 氣味

【辛し、平にして毒なし】思邈曰く、苦く辛し、微寒にして瀉（しやう）る。權曰く、苦く辛し、酒と配合するが良し。黃に炒つて用ゐる。好古曰く、陽であり浮であつて、手、足の少陰、太陽の經に入る。

### 主治

【諸瘕、霍亂、及び蛇傷】（唐本）【膀胱、胃間の冷氣。及び腸氣を育ひ、中を調へ、痛、嘔吐を止める】（馬志）【乾濕脚氣、腎勞、癰疽、陰疹を治し、胃を開き、氣を下す】（大明）【命門の不足を補す】（李杲）【丹田を暖める】（吳綬）

健胃、驅風、及祛痰藥  
トス、藥局方製劑ト  
シテ茴香精、アムモ  
ニア茴香精、茴香水、  
複方センナ紙劑、複  
方甘草散、センナ舍  
利別、小兒散等ヲ製  
スルニ用ワ。

## 發 明

説曰く、茴香は、國人はこれを重じて陽道を助ける功力があるものと  
いつてゐるが、その正しい使用方法を心得てゐない。

好古曰く、茴香は本來膀胱を治する藥であつて、その功力が丙を先にする。故に  
小腸といつたのだ。能く丙の燥を潤し、その功力が戊を先にする。故に丙より壬に  
至るのである。又、手、足の少陰の二經の藥であつて、上下經の通道を開く、それ  
は壬と丙と交る所以である。

時珍曰く、小茴香は性平であつて、氣を理し、胃を開き、夏期に蠅を祛き、臭を  
辟ける。食料として宜し。大茴香は性熱である。多く食へば目を傷め、瘡を發する。  
食料として過量を用ゐるは宜くない。古方にある去鈴丸は、茴香二兩、皮つきの生  
薑四兩を共に坩器に入れて一伏時淹け、慢火で炒つて鹽一兩を入れて末にし、糊で  
梧子大の丸にし、三五十丸づつを空心に鹽酒で服す。この方はもと脾、胃虛弱の病  
を治するもので、茴香は鹽を得れば腎の經に引入して邪氣を發出する。腎に邪を受  
けねば病は自ら生らぬのである。また小腸疝氣を治するにも有效だ。

## 附 方

舊四、新十六。

【胃を開き食を進める】茴香二兩、生薑四兩を共に搗き



（ハ）大觀ニ二字ナシ。  
（カ）大觀ニ温チ茶ニ  
作ル。

まぜ、淨器に入れ濕紙で蓋ふて一夜置き、翌日銀、石器で文武火で黃に炒焦して末にし、酒糊で梧子大の丸にし、十丸乃至（ハ）二十五丸を（カ）温酒で服す。（經驗方）【瘰癧（じやうすやく）發熱（はつねつ）】背、項に連るには、茴香子の搗汁を服す。（孫眞人方）【大、小便閉】鼓脹し、氣促するには、八角茴香七個、大麻仁半兩を末にし、生葱白二十一本と共に研つて湯に煎じ、一日一回、それを五苓散末（ごりやうさん）を調へて服す。（普濟）【小便頻數】茴香を多少に拘らず淘淨し、鹽少量を入れて炒つて研末し、糯米糕（じゆべいかう）を炙（や）いてその末を蘸（つ）けて食ふ。【傷寒脫陽】小便の通ぜぬには、茴香末を生薑の自然汁で調へて腹上に傅け、外に茴香末を益元散に入れて服す。（摘玄方）【腎消飲水】小便が膏油の如くなるには、茴香を炒り、苦楝子（くれんし）を炒り、等分を末にして毎食前に酒で二錢を服す。（保命集）【腎邪冷氣】力弱さには、大茴香六兩を三分し、生附子一個を皮を去つて三分し、第一回には、附子（ぶし）一分、茴香一分を共に黃に炒つて一夜火毒を出し、附子を去つて茴香を研末し、空心に一錢を鹽酒で服し、第二回には、二味各一分を同じく炒つて性を存して火毒を出し、附子を一半を去り一半を留めて茴香と共に末にし、前の如くにして服し、第三回には、各一分を共に炒つて性を存して火毒を出し、全部を研つて末



二〇字書ニ捺ハ揀ナ  
い、揀音單打ナリ、  
擊ナリ。

にし、前の如くにして服す。(朱氏集驗方) 【腎虛腰痛】茴香を炒つて研り、猪腰子を批開してその末を内に掺り入れ、濕紙で裹んで煨熟し、空心に食つて鹽酒で送下する。(戴原禮要訣) 【刺すやうに覺ゆる腰痛】簡便方では、八角茴香を炒つて研り、二錢づつを食前に鹽湯で服し、外に糯米一二升を炒り熟し、袋に盛つて患部を二〇捺する。○活人心統では、思仙散——八角茴香、杜仲を各々炒り研つて三錢、木香一錢、水一鍾、酒半鍾を煎じて服す。【腰重刺脹】八角茴香を炒つて末にし、食前に二錢を酒で服す。(直指方) 【疝氣の腎に入りたるもの】茴香を炒つて二包にし、更互に熨す。(簡便方) 【小腸氣墜】直指では、八角茴香、小茴香各三錢、乳香少量を水で服して汗を取る。○孫氏集效方では、小腸疝氣で忍び難く痛むを治す。大茴香、荔枝核を黒く炒つて各等分を研末し、一錢づつを溫酒で調へて服す。○瀕湖集簡方では、大茴香一兩、花椒五錢を炒つて研り、一錢づつを酒で服す。【膀胱疝痛】本事方では、舶來の茴香、杏仁各一兩、葱白を焙じ乾して五錢を末にし、二錢づつを酒で服して胡桃を嚼んで送下する。○集要では、疝氣、膀胱、小腸痛を治す。茴香を鹽で炒り、晚蠶沙を鹽で炒つて等分を末にし、煉蜜で彈子大の丸にし、一丸づつを溫酒で嚼ん

（二）牙猪ハ野猪ナリ。

で服す。【疝氣偏墜】大茴香末一兩、小茴香末一兩を（一）牙猪の尿胞一箇の尿の入つたまゝのものに入れて括り著け、罐に入れて酒で煮爛し、その胞共に搗いて梧子大の丸にし、五十丸づつを白湯で服す。仙方である。（鄧才筆舉難輿）【脇下刺痛】小茴香一兩を炒り、枳殼五錢を麸で炒つて末にし、二錢づつを鹽酒で調へて服す。神效がある。（袖珍方）【口臭の辟除】茴香を羹に煮、及び生で食ふ。いづれもよし。（谷殷食醫心鏡）【蛇咬の久しきに互つて潰れたるもの】小茴香を末に搗いて傳ける。（千金）

## 荳葉

氣味

子と同じ。

主治

【煮て食へば、卒然の惡心で腹中の不安

なるを治す】（寶鑑）【小腸氣で卒に腎氣が脇を衝き、刀で刺すやうに痛んで喘息し得ぬを治す。生の搗汁一合を熱酒一合に投じ和して服す】（孟詵）

## 發明

頤曰く、范汪の方に、惡毒癰腫が或は陰卵、髀間ひかへに連り、疼痛し、癢

急し、小腹に牽入して忍び難きを療ず。これは一夜にして死亡するものだ。茴香の苗、葉の搗汁一升を服す。一日三四服し、その滓を腫に貼る。冬期には根を用ゐる。これは外國の神方であつて、（二）永嘉以來これを用ゐて起死回生の神驗を現したとある。

（二）永嘉ハ晉ノ懷帝ノ年號。元年ハ西紀三〇七年ニ當ル。

(一) 牧野云フ、歐洲ノ原産デアアル、我邦ニテハ偶ニ之レヲ見ルニ過ギナイ、いのかどハ原ト西班牙語ノ *cañah* カラ來タモノト謂ハルル。

(二) 佛誓國、即チ三佛齊國。石部婆娑石ノ註ヲ見ヨ。  
(三) 波斯國ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

時 蘿 (宋開寶)

和名 いんどう  
學名 *Anethum graveolens*, L.  
科名 繖形科

校正

草部より此に移し入る。

釋名

慈謀勒(開寶)

小茴香

時珍曰く、時蘿といひ慈謀勒といふはいづれ

も外國語である。

集解

藏器曰く、時蘿は佛誓國に生ずる。實は馬芹子のやうで辛香だ。

珣曰く、按ずるに、廣州記に『波斯國に生ず』とある。馬芹子は色が黒くして重く、時蘿子は色が褐で軽い。これが相異點だ。


善く食味を滋くし、多食しても害がないが、阿

魏と共に食つてはならぬ。その味を奪ふものだ。

頤曰く、今は嶺南、及び近道のいづれにもあ

る。三月、四月に苗が生え、花、實は大いさ蛇

牀に類して簇生し、辛香である。六七月に實を



蘿 時

探る。現に一般に五味を和するに多く用ゐてゐるが、薬用にすることは聞かない。  
時珍曰く、その子は簇生し、形状は蛇牀子のやうで短く、微し黒い。氣は辛臭で  
茴香に及ばない。

嘉謨曰く、俗に蒔蘿椒と呼ぶ。内部に黒子があるが、ただ皮が薄く、色は褐で紅  
ではない。

### 苗 氣味

【辛し、溫にして毒なし】

### 主治

【氣を下し、膈を利す】(時珍)

### 子 氣味

【辛し、溫にして毒なし】

### 主治

【小兒の氣脹、霍亂嘔逆、腹

冷で食物の落つかぬもの、兩肋痞滿(藏器)【脾を健にし、胃氣を開き、腸を溫め、  
魚肉の毒を殺し、水臟を補し、腎氣を治し、筋骨を壯にする】(日華)【膈氣に主效が  
あり、食物を消化し、食味を滋くする】(李珣)

### 附 方

新三。

【閃挫腰痛】

蒔蘿を末にし、二錢匕を酒で服す。(永類鈴方)

【牙齒

含有シ、其成分ハ「カルボン」、「フェラン  
ドレン」、「テルピネ  
ン」等ナリ。  
英局方ニテハ蒔蘿水  
及蒔蘿油ヲ製造シ、

### 附 錄

蜀胡爛(拾遺)

藏器曰く、子

味辛し、平にして毒なし。主治は冷

疼痛】舶來の蒔蘿、芸薹子、白芥子等分を研末し、口中に水を含み、痛の左右に隨  
つて鼻に嚙ぐ。神效がある。(聖惠方)

驅風藥トナス。  
果實ハ西洋料理香味  
料トス。  
(五)大觀ニ肝ニ作ル。

(二)牧野云フ、從來  
之レチメバハキニ充  
テテアレドモ私ハ實  
感セヌ、本品ハ著シ

氣の心腹脹滿。腎を補し、婦人の血氣、下痢を除き、牙齒の蟲を殺す。安南に生ずる。懷香(くわいかう)に似たもので、食味を和するに用ゐ得る。

數低(拾遺) 藏器曰く、子——味甘し、溫にして毒なし。主治は冷風、冷氣、宿食不消の脹滿を下す。西番、北土に生ずる。懷香と互に似たものだ。胡人はこれを羹(かう)にして食ふ。

池得勒(拾遺) 藏器曰く、根——辛し、溫にして毒なし。冷氣を破り、食物を消化する。西國に生ずる草の根であつて、胡人は食ふ。

馬思荅吉 時珍曰く、味苦し、溫にして毒なし。邪惡の氣を去り、中を溫め、脇を利し、氣を順にし、痛を止め、津を生じ、渴を解し、人の口を香(かんばし)からしめる。元の時代には高級な膳部に用ゐ、最も力の強い香料となつてゐたといふ。如何なる形狀のものか判然せぬ。故に此に附録する。

### (二) 羅 勒

(宋嘉祐附)

和名 けめばはき(新稱)  
學名 *Ocimum cummin, Sims.?*  
科名 唇形科



下ノ學名ノ者ト思フ。

釋名

蘭香(嘉祐)

香菜(綱目)


醫子草

禹錫曰く、北方では一般に石勒せきろくの

諱を避けて羅勒を蘭香と呼ぶ。時珍曰く、按ずるに、鄴中記に「石虎は諱を勒ろくといつたので、羅勒を香菜と呼び改めた」とある。今俗間ではこれを醫子草いしそと呼び、その子で醫を治す。

集解

禹錫曰く、羅勒は處處にある。三種あつて、一種は紫蘇葉に似てゐる。一種は葉が大きく、二十歩以内なればその香が聞ける。一種は生菜にもなるものだ。



〔勒 羅〕  
—香 蘭—

冬期には乾いたものを用ゐる。子は目の中へ入れて置くと醫を去るもので、少頃しばしばして濕脹して物と俱に出る。

時珍曰く、香菜は、三月、棗の葉の生える時に種ふれば生える。さなくば生えない。常に魚腥水、米泔水、泥溝水を澆そそげば香しくなつて茂るふけ。糞水は宜くない。臞仙の神隱書に「畑の邊、水の側に廣く種ふるがよし、饑饉の際にはやはりこれも食糧になる。その子は大いさ蚤さのやうで、褐色で光らない。七月に採收する」とある。



(C) 本村(康)曰ク、  
めばうきハ「ビネ  
ン」チネオール」右  
施「カンフォル」メ  
チルカピユール」チ  
合ム、揮發油チ合有  
ス。  
Dangdu-rt: Itipl-  
anzon: 459.  
(C)大觀ニ灰ニ作ル。

○弘景曰く、術家では、羊角、馬蹄を取つて焼いて灰にして撒き、濕地に踏みならして置く、すると羅勒が生える。俗に西王母菜と呼び、これを食へば人體を益する。

### 氣味

【辛し、溫にして微毒あり】禹錫曰く、多く食つてはならぬ。關節を瘞し、營衛を澀し、人の血脈を行らざらしめ、又、風を動じ、脚氣を發する。

### 主治

【中を調へ、食物を消化し、惡氣を去り、水氣を消す。生で食ふが宜し。齒根爛瘡を療するに<sup>(C)</sup>使としてこれを用ゐるが甚だ良し。嘔嘔の患者は汁を取

つて半合を服す。冬期には乾いたものの煮汁を用ゐる。その根を灰に焼いて小兒の

黃爛瘡に傅ける】<sup>(C)</sup>禹錫【飛尸、鬼疰、蠱毒に主效がある】<sup>(C)</sup>吳瑞

### 發明

時珍曰く、按ずるに、羅天益は「蘭香は味辛く、氣は溫であつて、能く血を和し、燥を潤ほす」といつてある。然るに禹錫が「多く食へば營衛を澀し、

血脈が行らなくなる」といつたのは何故であらうか。又、東垣李氏の牙疼、口臭を

治する神功丸中に蘭香を用ゐて「無ければ藿香を代用する」といつた。これはただ

その惡氣を去る功力を取つただけのことである。故に飲膳正要に「諸菜と共に食へ

ば味辛香にして能く腥氣を辟ける」といつてある。いづれもこの意味だ。

附方

新二。

【鼻疳赤爛】蘭香葉を灰に焼いて二錢、銅青五分、輕粉二字を末

にし、一日三回傳ける。（錢、小兒方）

【反胃欬噎】（はんゐ、がいおく）生薑四兩を擣き爛して蘭香葉一兩、

椒末一錢を入れ、鹽を和した麪四兩で裹んで焼餅にし、煨熟して空心に喫ふ。二三回に過ぎずして效がある。反胃には甘蔗汁を入れて和す。（黃、方）

子主治

【目瞤、及び塵物の目に入りたるには、三五顆を目中に入れて置

く。少頃して濕服と物とが俱に出るものだ。又、風赤眇淚に主效がある。】（嘉祐）

發明

時珍曰く、按ずるに、普濟方に『昔、（同）廬州の知錄彭大辨が臨安にゐ

た頃、暴かに赤眼に罹つて後に瞤を生じたが、ある僧が蘭香子を洗ひ晒して一粒づ

つその背中（せいちゆう）に入て目を閉ぢさせたが、少頃すると膜と共に出了た。ある方では末にし

て點ける』とある。予（時珍）が嘗てこの子を試みたが水中に入れてもやはり脹大し

た。蓋しこの子は濕を得れば脹るものだから、能く眇淚、浮膜を染め込ませて惹き

出すのだ。しかし、目中には塵一つ入ることも出来ぬものだが、この子は三五顆納

れても一向に妨碍を感じない。蓋し一の特異な點だ。

附方

新二。

【目昏浮瞤】蘭香子七箇づつを就寢時に水で煎じて服す。久しく

（同）廬州ハ草部芳草類白芷ノ註、臨安ハ土部伏龍肝ノ註ヲ見ヨ。

(一) 牧野云フ、熱帶地方ノ原産デアルが今ハ廣ク各地デア見ラル、我が臺灣ナドニハ野生ノ狀態トナツテキント思フ、集解ノ文中ニ在ル黃花菜ハきほふうてうカウト云フモノデ、*Poinciana viscosa* DC. ノ學名ヲ有スル、此レモ亦廣ク暖地ニ見ル一草デア

して效がある。(海上名方) 【走馬牙疳<sup>そうまがかん</sup>】小兒が肥甘なる食物のために腎に虚熱を受け、口から臭い息を出し、次號に齒が黒くなるを崩砂と名ける。漸次に齦爛に至るを潰槽<sup>さいそう</sup>と名ける。又、或は出血するを宣露と名ける。重くなつて齒が落ちるものを腐根と名ける。蘭香子末、輕粉各一錢、蜜陀僧を醋に淬<sup>ひた</sup>し研末して半兩を和勻<sup>わきん</sup>し、少量づつを齒、及び齦に傅ければ立るに效がある。甘露飲を内服する。(活効口議)

## (二) 白花菜 (食物)



和名 ふうてふさい  
學名 *Pellaea purpurea*, Schrank.  
(*Gymnocarpus pentaphyllus*, DC.)  
科名 ふうてふさい科 (白花菜科)

### 釋名 羊角菜

### 集解

時珍曰く、白花菜は三月に

〔菜花白〕

種<sup>う</sup>ゑる。柔い莖が延蔓して一枝に五枚の

葉があり、葉の大きいさは拇指ほどである。

秋期中に小さい白色で蕊の長い花を開

き、長さ二三寸の小さい角<sup>さ</sup>を結ぶ。その

子は黒色で細く、形状は初眠の蠶沙のやうで光澤がない。菜は氣が<sup>せんとう</sup>鹽臭なもので、ただ鹽菹にして食へるだけだ。

穎曰く、一種の黄花のものを黃花菜と名ける。形状は同じでただ花が黄なだけだ。

氣味 【苦く辛し、微毒あり】 穎曰く、多く食へば風氣を動じ、臟腑に滯

り、胃中を悶滿せしめ、脾を傷<sup>いた</sup>める。主治 【氣を下す】<sup>汪穎</sup> 【煎じた水で痔

を洗ふ。搗き爛らして風濕痺痛に敷く。酒に搗つて飲めば瘡を止める】<sup>（時珍）</sup>

## 蔊菜

音は<sup>（カン）</sup>である。（綱目）和名 <sup>すかし</sup>たこはう

學名 *Nasturtium pulstro*, DC.  
科名 十字科

### 校正

草部拾遺の蔊菜を併せ入る。

### 釋名

蔊菜

音は寧<sup>（タウ）</sup>である。辣米菜

時珍曰く、蔊とは味が辛辣<sup>しんらつ</sup>で火で

焔くやうだといふ意味で名けたものだ。また蔊とも書く。陳藏器の本草に蔊菜といふがあつて『辛菜である。南方の地ではこれを食ふ』といひ、形状を説明してないが、今唐韻、玉篇を調べて見てもいづれも蔊なる文字はなく、ただ蔊の文字があつ

（二）木村（唐）曰ク、  
ドラゴンドルフ氏ノ  
書ニ芥子油ニ類似ス  
ル揮發油ヲ含有ス。

（一）牧野云フ、植物  
名實圖考ニハ之レサ  
ナレトシバニトスル  
ガ、然シ集解ニ黃花  
ヲ開キ一二分ノ角ヲ  
結ブト云フ點ヲ考ヘ  
テ、今之レヲすかし  
たこはうト定メテ見  
タ、然シ高サガ二三  
寸ハ餘リ短カスギル  
嫌ハアレドモ、其レ  
ハ芥セテ矮ナルモノ  
ト想像シテ、先ヅ疑  
チ抱キツツ上ノ如ク  
シテ見タ。

て『辛菜なり』としてある。これで見ると蔊は蔊の字の訛だ。

【集 解】

時珍曰く、蔊菜かんさいは南方の地に生ずる田畑の中の小草で、冬期に地に布ふいて叢生し、長さ二三寸、梗柔く、葉細く、二月に黄色の細花を開き、長さ一二分



【菜 蔊】  
—— 菜 米 辣 ——

の細角を結び、角の内部に細子がある。野人は根、葉の附いたまま抜いて食ふ。味が極めて辛辣らうべいさいなので辣米菜と呼ぶ。沙地に生ずるものは尤もひよろびよろしてゐる。故に洪舜俞の老圃賦に『蔊に拂土の風あり』といつたのだ。林洪の山家清供には『朱文

公は酒の後で蔊莖を蔬菜料理にして食つた。蓋し盱江くかう、建陽、嚴陵地方ではいづれも喜んで食ふ』とある。

【氣 味】

【辛し、溫にして毒なし】

李廷飛曰く、蔊菜を細に切つて生蜜で洗ひ

拌ぜ、或はあつさりと沟うけて食へば、口を爽にし、食物を消化する。多く食へば痢疾を發し、熱を生ず。

主治

【冷氣、腹内の久寒、飲食の不消化を去り、人をして能く食はしめる】

〔藏器〕

【胸膈を利し、冷痰の心腹痛を豁くわつする】〔時珍〕

〔二〕

草

豉（拾遺）

和名未詳  
學名未詳  
科名未詳

校正

草部より此に移し入る。

集解

藏器曰く、〔三〕巴は西せいの諸國に生ずる。韭きうの形狀に似た草で、豉が花中か

ら出る。彼の地の者はそれを食ふ。

氣味

【辛し、平にして毒なし】

主治

【惡氣。中を調へ、五臟を益し、

胃を開き、人をして能く食せしめる】〔藏器〕

〔二〕牧野云フ、草豉ハ未詳ノ品デアル。

〔三〕巴西ハ水部甘露蜜ノ註ヲ見ヨ。



昭和七年五月十六日印刷  
昭和七年五月二十日發行



刊行所

印刷者

發行者

監修者  
翻譯者

讀國譯本草綱目第七冊  
非賣品

白井光太郎

鈴木眞海

東京市日本橋區通三丁目八番地

和田利彦


東京市日本橋區通三丁目八番地

氣賀林一

東京市日本橋區通三丁目八番地

春陽堂

電話日本橋五一・六四一・三七八八  
振替口座東京一六一七











EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 3563



京  
出  
版

東  
春  
陽  
堂